

Allegato “B”

NORME TECNICHE DI DIFESA E DISERBO DELLA REGIONE TOSCANA

Aggiornamento alle Linee Guida Nazionali dell’8 aprile 2020

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI GENERALI

NORME COMUNI DI COLTURA.

Per ciascuna coltura di interesse produttivo per il territorio regionale sono state predisposte norme tecniche per “La difesa integrata delle colture” e “Il controllo integrato delle infestanti”. Tali norme vengono presentate in schede tecniche che sono state predisposte secondo le modalità riportate nell'allegato 1.

Le sostanze autorizzate in agricoltura biologica sono riportate in corsivo

Per tutte le colture vengono adottate le misure di seguito riportate.

1. Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione

E' consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificatamente vietato.

I trattamenti fitosanitari effettuati in vivaio non vanno considerati nel computo che si effettua sulla base dei disciplinari regionali relativo alla coltura in campo e/o in ambiente protetto.

2. Repellenti

E' consentito l'uso di “grasso di pecora” come repellente a cervi, daini, caprioli e camosci.

3. Criteri adottati nella scelta dei prodotti fitosanitari

La scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, viene effettuata tenendo conto della disponibilità di valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di difesa, limitando, per quando possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione CLP) che:

- contengono sostanze attive “candidate alla sostituzione” ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni (smi);
- sono caratterizzati dalla presenza sull'etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma “teschio con tibie incrociate” (corrispondente al pittogramma GHS06);
- sono classificati “CORROSIVI” /o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e H318 (gravi lesioni oculari).

Inoltre è favorita la limitazione di prodotti con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo che, secondo il nuovo sistema di classificazione CLP, sono:

- H350 Può provocare il cancro se inalato,
- H351 Sospettato di provocare il cancro;
- H340 Può provocare alterazioni genetiche;
- H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
- H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
 - H360D Può nuocere al feto;
 - H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
 - H360F Può nuocere alla fertilità.
 - H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
 - H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
- H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
 - H361d Sospettato di nuocere al feto.
 - H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
 - H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.

L'esclusione o la sostituzione di alcuni prodotti inclusi nella lista delle sostanze attive candidate alla sostituzione risultano particolarmente problematiche in considerazione dell'assenza di validi prodotti alternativi a base di sostanze a minore rischio. Nei casi in cui la loro inclusione nella lista

dei candidati alla sostituzione dipenda da caratteristiche di tossicità, bioaccumulo e/o persistenza nell'ambiente (PBT), nella valutazione delle sostanze ammesse per le strategie di difesa vengono considerate anche i seguenti parametri:

- estensione della coltura
- individuazione della coltura come "minore".

Nei casi in cui la coltura considerata rappresenti un impiego minore, ai sensi dell'articolo 51 del Reg. n. 1107/09, oppure interessi un'areale produttivo limitato ed in assenza di valide alternative a minore rischio, è consentito il mantenimento di sostanze attive candidate alla sostituzione in ragione della minore pressione che si determina sull'ambiente. Rientrano in tale casistica, ad esempio, numerose colture orticole sulle quali è autorizzato un limitato numero di prodotti fitosanitari.

Sono state escluse o limitate le sostanze attive classificate pericolose per l'ambiente acquatico di cui al D.Lgs n.152/06, tabelle 1A e 1B, e quelle di frequente ritrovamento nelle acque.

Le Norme Tecniche di Difesa e Diserbo per l'anno 2019 della Regione Toscana recepiscono quindi quanto stabilito con la delibera di Giunta Regionale n.348 del 3/04/2019.

4. Prodotti rameici.

Su tutte le colture l'uso dei prodotti rameici è limitato a 4 kg ad ettaro all'anno di sostanza attiva.

5. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica

Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste dall'Allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008, come modificato dal Reg. UE 2019/2164, a condizione che siano regolarmente autorizzati in Italia per la coltura e l'avversità.

6. Smaltimento scorte

E' autorizzato l'impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno, ma esclusi nell'anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Tale autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell'anno precedente.

7. Uso delle trappole


L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per giustificare l'esecuzione di un trattamento. Le aziende che non installano le trappole obbligatorie per accertare la presenza di un fitofago non potranno richiedere nessuna deroga specifica. L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali previsti nelle norme tecniche regionali. Inoltre l'installazione non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d'intervento (es. tentredine del pero e del susino).

7.1 Monitoraggio degli elateridi

Il monitoraggio degli elateridi deve essere effettuato sugli adulti. Per la cattura degli adulti occorre utilizzare le trappole YATLORF innescate con feromoni di elateridi (*Agriotes sordidus* + *A. litigiosus/A. ustulatus*).

Considerando appezzamenti agronomicamente abbastanza omogenei, in particolare per precessione colturale, posizionare una trappola ogni 10 ettari. Le informazioni che fornisce questo tipo di monitoraggio sono valide per l'anno successivo.

Il calendario del monitoraggio degli adulti deve essere realizzato secondo il seguente schema:



La soglia deve essere calcolata come sommatoria degli adulti di *Agriotes spp.* catturati complessivamente nei 4 controlli annuali (svuotamento).

I trattamenti geodisinfestanti a base di Piretroidi ed Esteri fosforici non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse sostanze attive.

8. Contaminazioni accidentali

La presenza di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari non autorizzati o non ammessi dai disciplinari, si classifica come contaminazione accidentale, qualora riscontrata in quantità uguale o inferiore al limite di 0,01 mg/Kg così come stabilito al comma 1 lettera b dell'articolo 18 del Reg CE 396/2005

9. Vincoli da etichetta

Nell'applicazione delle norme tecniche deve essere sempre rispettata la normativa nazionale sui prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ad eventuali revoche di sostanze attive o revoche di impiego che si attivano dopo la pubblicazione delle presenti schede. In nessun caso le presenti norme tecniche regionali possono prevaricare quanto normato a livello nazionale dal Ministero della Salute con propri decreti.

10. Fitoregolatori

Non è ammesso l'impiego dei fitoregolatori, ad eccezione di quelli riportati nella scheda "Fitoregolatori".

11. Trattamento

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche colturali è definito trattamento, e come tale annotato sul corrispondente registro, "ogni applicazione sulla coltura, contro una specifica avversità, di prodotti fitosanitari, singoli o in miscela".

12. Dose del Prodotto fitosanitario.

Ad esclusione dei diserbanti delle colture "Frutticole" e del p.a. Glifosate le cui dosi sono riportate nelle singole schede, per tutti gli altri prodotti fitosanitari è necessario attenersi a quanto previsto nell'etichetta del prodotto commerciale usato per il trattamento.

13. Miscele di prodotti fitosanitari

E' ammesso l'uso di miscele estemporanee o commerciali dei fitofarmaci previsti per il controllo di una determinata avversità.

Miscela commerciale o estemporanea di 2 o più prodotti fitosanitari per il controllo di una avversità: vale un trattamento per l'avversità ed un impiego per ogni singolo prodotto fitosanitario. *Esempio: un intervento su vite contro Peronospora con una miscela di Mancozeb+Cimoxanil, vale un trattamento dei 7 ammessi per la Peronospora su vite, un utilizzo dei 3 ammessi per il Mancozeb ed un utilizzo dei 3 ammessi per il Cimoxanil.*

Si ammette la seguente eccezione:

Miscele Acaricide: sono consentite miscele, estemporanee o commerciali, di due p.a. acaricidi ammessi, di cui uno ad azione ovo-larvicida e l'altro ad azione larvo-adulticida, purchè entrambi prescritti in scheda per il controllo di quel parassita. La miscela vale un trattamento.

Colture frutticole, vite e orticole: nelle miscele di **fungicidi** non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per avversità. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale. Da queste limitazioni vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, il Fosetil Al, i Fosfonati di K, il Fosfonato disodio e tutti i prodotti biologici.

I principi attivi diserbanti riportati nelle singole schede in miscela possono essere utilizzati anche singolarmente nel rispetto della percentuale (%) di principio attivo indicato nella scheda.

I principi attivi fungicidi riportati per i cereali sono elencati per singole sostanze attive e sono utilizzabili singolarmente o in miscela rispettando le limitazioni previste per tali sostanze.

14. Antidoti, sinergizzanti, coadiuvanti, bagnanti, adesivanti, antideriva.

E' ammesso l'uso di antidoti agronomici, sinergizzanti, coadiuvanti, bagnanti, antideriva, adesivanti purchè appositamente registrati per l'uso e nel rispetto delle specifiche indicazioni di etichetta.

15. Interventi di difesa/diserbo Agronomici, Biologici, Fisici, ect... ad esclusione dei Mezzi Chimici.

Se non diversamente indicato nelle singole schede colturali tutti gli interventi agronomici, biologici, fisici, ect... ad esclusione dei mezzi chimici, sono liberi e non sottoposti a vincoli.

16. Colture/coltivazioni senza scheda tecnica.

Per le colture/coltivazioni non riconducibili alle schede tecniche di Difesa e di Diserbo dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Toscana, non è ammesso nessun intervento chimico di difesa e di diserbo ad esclusione dei prodotti biologici esplicitamente autorizzati.

ALLEGATO 1

SCHEDE DIFESA

Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti modalità (colonne):

- Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei confronti delle quali si propongono le strategie di difesa.
- Numero Trattamenti Ammessi: viene indicato per ogni avversità, ad esclusione della scheda “Floricole ed ornamentali”, il numero di trattamenti massimo realizzabile con prodotti chimici. In questo numero non rientrano i trattamenti effettuati con gli agrofarmaci ammessi in agricoltura biologica ai sensi dell’Allegato II Reg. CE N. 889/2008, come modificato dal Reg. UE 2019/2164, a condizione che siano regolarmente autorizzati in Italia per la coltura e l’avversità e non sia riportato un numero massimo di interventi.
- Principi Attivi e Ausiliari: per ciascuna avversità vengono indicati: mezzi di difesa da utilizzare tra cui gli ausiliari, esche proteiche, sistemi di disorientamento e confusione sessuale e agrofarmaci.
- Soglie e Criteri d’Intervento: per le avversità per le quali sono state scientificamente definite delle soglie economiche d’intervento, queste vengono evidenziate. Inoltre possono essere presenti indicazioni per una corretta applicazione della difesa integrata.
- Limitazioni d’Uso: vengono riportate eventuali limitazioni d’uso dei mezzi di difesa richiamati nella colonna Principi Attivi e Ausiliari.

Con l’eccezione degli agrofarmaci “biologici” per i quali si rimanda al punto 5 -“Prodotti autorizzati in agricoltura biologica” del capitolo AVVERTENZE E PRESCRIZIONI GENERALI, è ammesso l’uso dei soli principi attivi chimici indicati nella colonna Principi Attivi e Ausiliari.

Nella colonna Principi Attivi e Ausiliari i numeri o gli asterischi (*) riportati a fianco di alcune sostanze attive, indicano la presenza di un riferimento nella colonna Limitazioni d’Uso.

Nelle colonne Soglie e Criteri d’Intervento e Limitazioni d’Uso le scritte **in grassetto evidenziate in grigio chiaro** costituiscono un **obbligo e/o vincolo**.

SCHEDE DISERBO

Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti modalità (colonne):

- Epoca: viene riportata la fase fenologica alla quale si riferisce la strategia di controllo delle infestanti **consigliata** (pre semina, pre emergenza della coltura, post emergenza della coltura, pre trapianto della coltura, post trapianto della coltura). Nelle colture arboree questa colonna è assente.
- Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti nei confronti delle quali viene impostata la strategia di controllo proposta.
- Numero Trattamenti Ammessi: viene indicato, ad esclusione della scheda “Floricole ed ornamentali”, il numero di trattamenti ammessi realizzabile con quello specifico gruppo di diserbanti. Per vite e olivo questa colonna è sostituita da Attività.
- Principio attivo: per ciascuna infestante o gruppo di infestanti vengono indicati i principi attivi utilizzabili.
- % di p.a.: viene indicata la percentuale di principio attivo sulla base della quale viene impostata la dose di intervento; questa indicazione viene individuata tenendo come riferimento uno dei formulati commerciali contenenti il p.a. in oggetto e normalmente utilizzati. Sono ammesse anche tutte le altre formulazioni commerciali del p.a. con diversa concentrazione.

l o kg/ha: in relazione alla colonna precedente viene indicata la dose di utilizzo alla quale possono essere impiegati i p.a. per ciascuna applicazione;

- **Limitazioni:** vengono riportate indicazioni e limitazioni d'uso dei mezzi di difesa richiamati nelle colonne precedenti. In generale questa colonna è presente solo nel diserbo delle colture arboree.

ATTENZIONE: moltiplicando la % di p.a. per litro o kg/ha si ottiene la quantità massima di quel p.a. diserbante che può essere applicata in un anno su quella coltura. Un p.a. diserbante inserito nella scheda può essere utilizzato indipendentemente dalla % di p.a. che contiene, sia singolo che in miscela commerciale o estemporanea, a condizione che la dose di impiego non superi quella massima sopra detta.

Esempio: se un p.a. diserbante è inserito nella scheda con la percentuale del 25% e la dose di 1,5 kg/ha, ed il prodotto commerciale che voglio utilizzare di quel p.a. ha una percentuale del 50%, la dose ad ettaro che posso utilizzare di questo prodotto commerciale è pari:

- *quantità massima di p.a. utilizzabile: $25/100 \times 1,5 = 0,375 \text{ kg/ha}$;*
- *dose ad ettaro del prodotto commerciale a disposizione: $0,375 \text{ kg/ha}/0,50 = 0,75 \text{ kg/ha}$*

FITOREGOLATORI

Fitoregolatori Orticole

Coltura	Attività	s.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso	Alternativa agronomica
Aglio	Antigermogliante	Idrazide maleica		
Cipolla	Antigermogliante	Idrazide maleica		
Zucchini	Allegante	Acido gibberellico NAA - NAD	In serra nei periodi di basse o alte temperature	Utilizzo di bombi
Melanzana	Allegante	Acido gibberellico NAA -	In serra nei periodi di basse o alte temperature	Utilizzo di bombi
Pomodoro pieno campo	Maturante	Etefon	In condizioni climatiche avverse nei 30 gg precedenti la raccolta. Solo pomodoro destinato per l'industria	
		NAA	In condizioni climatiche avverse nei 30 gg precedente la raccolta. Solo pomodoro destinato per l'industria	
Pomodoro pieno campo e serra.	Allegante	Acido gibberellico	Ammesso solo per destinazione come consumo fresco	Utilizzo di bombi
		NAA	Ammesso solo per destinazione come consumo fresco	Utilizzo di bombi
Carciofo	Allegante	Acido gibberellico		

Fitoregolatori Frutticole

Coltura	Attività	s.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso	Alternativa agronomica (proposta)	
Actinidia	Allegante	NAA + Acido gibberellico (GA3)		Utilizzo di bombi e api	
	Aumenta la pezzatura	Forchlorfenuron		Diradamento manuale	
	Diradamento fiori	NAA + Acido gibberellico (GA3)		Integrazione con diradamento manuale	
Fragola	Superamento stress da trapianto	NAA			
	Anticipo fioritura	NAA		Utilizzo di idonee coperture	
Melo	Allegante	Acido gibberellico (GA3) e Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina	Impiego limitato in caso di rischio di danno da freddo	Utilizzo di bombi e api	
	Anticascia	NAA	Si raccomanda di utilizzarli solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (Cvs, andamento climatico e/o parametri di maturazione)		
	Antiruggine	Acido gibberellico (GA3) e Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina			
	Contenimento della vigoria (Regolatore dei processi di crescita della pianta)	Prohexadione calcium			
		NAA			
	Diradante	6-Benziladenina			Integrazione con diradamento manuale
		Metamitron			
		NAA			
NAD					
Etefon					
Uniformità pezzatura dei frutti	Acido gibberellico (GA3) e Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina			Integrazione con diradamento manuale	

segue Fitoregolatori Frutticole

Coltura	Attività	s.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso (proposta)	Alternativa agronomica (proposta)
Pera	Allegante	Acido gibberellico (GA3) e Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina		Utilizzo di bombi e api
	Anticascola	NAA	Vincolante al riscontro oggettivo degli indici di maturazione (durezza e grado brix)	
	Contenimento della vigoria (Regolatore dei processi di crescita della pianta)	Prohexadione calcio		
Gibberelline (A4 - A7) + 6-Benziladenina		Impiegare in impianti con densità superiore a 3000 piante ettaro		
Pesco	Anticascola	NAA	Solo per percoche	
Vite	Allungamento rachide	Acido gibberellico		

Floricole e ornamentali

COLTURA	TIPO DI IMPIEGO	S.A. IMPIEGABILE	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Floreali e ornamentali	Allegante	acido gibberellico	Verificare specifiche autorizzazioni
Floreali e ornamentali	Aumenta la fioritura	NAA + Acido gibberellico	Verificare specifiche autorizzazioni
Floreali e ornamentali	Aumenta la fotosintesi	NAA	Verificare specifiche autorizzazioni
Floreali e ornamentali	Aumento pezzatura	NAA	Verificare specifiche autorizzazioni
Floreali e ornamentali	Brachizzante	Clormequat	Verificare specifiche autorizzazioni
Floreali e ornamentali	Brachizzante	Daminozide	Verificare specifiche autorizzazioni
Floreali e ornamentali	Radicante	NAA	Verificare specifiche autorizzazioni
Floreali e ornamentali	Stimolante - Semenzai e piante da vivaio	NAA	Verificare specifiche autorizzazioni
Floreali e ornamentali	Maturante	NAA	Verificare specifiche autorizzazioni
Ornamentali	Brachizzante	Clormequat	Verificare specifiche autorizzazioni
Ornamentali	Brachizzante	Daminozide	Verificare specifiche autorizzazioni
Tappeti erbosi	Regolatore di crescita	Trimexapacethyl	Verificare specifiche autorizzazioni

Tabacco

TIPO DI IMPIEGO	S.A. IMPIEGABILE
Antigermogliante	Idrazide maleica
Antigermogliante	N-decanolo
Maturante	Etefon

COLTURE CEREALICOLE DA GRANELLA E DA FORAGGIO

- 1 - Frumento tenero e Frumento duro
- 2 - Orzo
- 3 - Avena, Segale e Triticale
- 4 - Farro
- 5 - Mais
- 6 - Sorgo
- 7 - Riso

SCHEDA DIFES A N°1 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Carbone e Carie (<i>Tilletia spp., Ustilago tritici</i>)			Consigliata concia sementi	
Fusariosi (<i>Fusarium spp.</i>)	2	Tebuconazolo (CS) (IBE) Procloraz (CS) (IBE) (7) Pyraclostrobin (Strobilurine) Difeconazolo (CS) (IBE) (3) Protioconazolo (IBE) Benzovindiflupyr (SDHI)(CS) (4) Metconazolo (IBE) (CS) Tetraconazolo (IBE) Bixafen (SDHI) (2) Spiroxamina (6)	Evitare semine fitte Concimazioni azotate equilibrate	CS (Candidati sostituzione): in 1 anno possono essere usati max 2 prodotti CS. (2) SDHI (Bixafen, Fluxapyroxad, Benzovindiflupyr, Isopyrazam): max 1 trattamento all'anno fra tutti gli SDHI indipendentemente dall'avversità; Bixafen ammesso solo in miscela; Isopyrazam ammesso solo in miscela con Protioconazolo.
Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>)		Tebuconazolo (CS) (IBE) Procloraz (CS) (IBE) (7) Ciproconazolo (CS) (IBE) Azoxystrobin Tetraconazolo (IBE) Flutriafol (IBE) Pyraclostrobin Protioconazolo (IBE) Metconazolo (CS) (IBE) Bixafen (SDHI) (2) Fluxapyroxad (SDHI) (2) Spiroxamina (6) Fenprodin (8)	Evitare semine fitte Concimazioni azotate equilibrate Varietà resistenti o tolleranti	(3) Difenconazolo (CS) (IBE): ammesso solo in miscela con Tebuconazolo. (4) Benzovindiflupyr (SDHI): ammesso solo in miscela con Protioconazolo. (5) Difenconazolo (CS) (IBE): ammesso solo contro la ruggine bruna (<i>Puccinia recondita</i>). (6) Spiroxamina: ammesso solo in miscela.
Ruggini (<i>Puccinia graminis</i>) (<i>Puccinia recondita</i>) (<i>Puccinia striiformis</i>)		Tebuconazolo (CS) (IBE) Ciproconazolo (CS) (IBE) Azoxystrobin Tetraconazolo (IBE) Flutriafol (IBE) Pyraclostrobin Difeconazolo (CS) (IBE) (5) (3) Protioconazolo (IBE) Metconazolo (CS) (IBE) Benzovindiflupyr (SDHI)(CS) (4) Bixafen (SDHI) (2) Fluxayroxad (SDHI) (2) Spiroxamina (6) Isopyrazam (SDHI) (2) Procloraz (CS) (IBE) (7) Fenprodin (8) (*) Zolfo Prodotti rameici	Evitare semine fitte Concimazioni azotate equilibrate Varietà resistenti o tolleranti	(7) Procloraz (CS) (IBE): ammesso solo in miscela (8) Fenprodin: ammesso solo in miscela. (*) Autorizzato solo contro Ruggine gialla (<i>Puccinia striiformis</i>) e Ruggine bruna (<i>Puccinia recondita</i>)

Septoria (<i>Staganospora nodorum</i>) (<i>Septoria tritici</i>)		Tetraconazolo (IBE) Ciproconazolo (CS) (IBE) Pyraclostrobin Azoxystrobin Bixafen (SDHI) (2) Difeconazolo (CS) (IBE) (3) Protioconazolo (IBE) Metconazolo (CS) (IBE) Benzovindiflupyr (SDHI)(CS) (4) Flutriafol (IBE) Fluxapyroxad (SDHI) (2) Spiroxamina (6) Tebuconazolo (CS) (IBE) Ciproconazolo (CS) (IBE) Procloraz (CS) (IBE) (7) Isopyrazam (SDHI) (2) Fenprodin (8) Zolfo Prodotti rameici	Evitare semine fitte Concimazioni azotate equilibrate	
---	--	---	--	--

Segue Scheda Difesa N° 1 – Frumento tenero e Frumento duro

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Concia delle sementi con insetticidi	NON AMMESSA			
Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i>) (<i>Metopolosiphum dirhodum</i>) (<i>Sitobion avenae</i>)	1	Pirimicarb Fluvalinate	Evitare semine fitte Concimazioni azotate equilibrate	

SCHEDA DISERBO N°1 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a. (g/l)	l. o Kg / ha	LIMITAZIONI D'USO
PRE-SEMINA	Preparazione del letto di semina Graminacee e Dicotiledoni		Glifosate (1)	30,4 (360 g/l)		
PRE EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Flufenacet (3) Diflufenican (4) Triallate (5) Prosulfocarb Bifenox (2) Pendimetalin (2)			<p>Il diserbo di pre-emergenza è consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.</p> <p><u>(2) Bifenox:</u> dicotiledonicida; max 1 volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.</p> <p><u>(3) Flufenacet, Pendimetalin:</u> non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente.</p> <p><u>(4) Diflufenican:</u> dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee.</p> <p><u>(5) Triallate:</u> graminicida.</p>
POST-EMERGENZA PRECOCE	Dicotiledoni e graminacee	1	Flufenacet (3) Prosulfocarb Bifenox (2) Diflufenican (4) Clortoluron (6) Pendimetalin (3)			<p><u>(2) Bifenox:</u> dicotiledonicida; max 1 volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.</p> <p><u>(3) Flufenacet, Pendimetalin:</u> non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente.</p> <p><u>(4) Diflufenican:</u> dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee.</p> <p><u>(6) Clortoluron.</u> Ammesso solo nelle zone con sospetta presenza di Lolium resistente: provincie di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto, Arezzo, Firenze. Ammesso solo sugli appezzamenti in cui sia stata effettuata la lavorazione del terreno con ARATURA (NO minima lavorazione o simili).</p>

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a. (g/l)	l. o Kg / ha	LIMITAZIONI D'USO
POST EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Iodosulfuron metil-sodium (8) MCPA (10) Mecoprop-P (11) Diclorprop-P (10) (11) Halauxifen-methyl (11) Florasulam (11) Metsulfuron metile (11) Tifensulfuron- methyl (7) (11) Tribenuron-metile (11) Clorpiralid (11) Fluroxipyr (11) Amidosulfuron (11) Mesosulfuron-metil (12) Pyroxsulam (13) Tritosulfuron (11) Propoxicarbazone Na (14) Cloquintocet-mexyl (Antidoto agronomico) Mefenpir-dietile (Antidoto agronomico) Thiencarbazone methyl (*)			(7) <u>Tifensulfuron- methyl</u> : ammesso esclusivamente in miscela. (8) <u>Iodosulfuron metil-sodium</u> : ammesso esclusivamente in miscela; formulato con antidoto; (9) <u>Fenoxaprop-p-etil</u> : formulato con antidoto, non efficace su Lolium. (10) <u>Diclorprop-P</u> : impiegabile come erbicida solo in miscela. (11) <u>MCPA, Mecoprop-P, Diclorprop-P, Halauxifen methyl, Florasulam, Metsulfuron-methyl, Tifensulfuron-methyl, Tribenuron-metile, Clorpiralid, Fluroxipyr, Amidosulfuron, Tritosulfuron</u> : dicotiledonicida. (12) <u>Mesosulfuron-metil</u> : ammesso esclusivamente in miscela; formulato con antidoto; (13) <u>Pyroxsulam</u> : formulato con antidoto; (14) <u>Propoxicarbazone Na</u> : ammesso esclusivamente in miscela; formulato con antidoto; (*) Solo in miscela
	Graminacee	1	Fenoxaprop-p-ethyl (9) Diclofop-metil Clodinafop-Propargyl +Cloquintocet-mexyl (antidoto agronomico) Pinoxaden +Cloquintocet-mexyl (antidoto agronomico)			

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°2 - ORZO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i>) (<i>Metopolosiphum dirhodum</i>) (<i>Sitobion avenae</i>)			Semine tardive, non troppo fitte e limitate concimazioni azotate	
MALATTIE FUNGINE				
Carbone (<i>Ustilago tritici</i>)			Consigliata concia sementi	
Maculatura reticolare (<i>Drechslera teres</i>) Striatura fogliare (<i>Drechslera graminea</i>)			Consigliata concia sementi	
Virosi dei cereali Virus del nanismo giallo			Evitare ristoppi Varietà resistenti Semine ritardate	
Oidio (<i>Erysiphe graminis</i> sp. <i>hordei</i>)	1	Protioconazolo + bixafen (1)		(1) max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Ruggine (<i>Puccinia hordei</i>)		Protioconazolo + bixafen (1) Benzovindiflupyr + Protioconazolo (1)		(1) max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium</i> spp., <i>Pyrenophora teres</i>) Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		Azoxystrobin Bixafen+Tebuconazolo Protioconazolo Pyraclostrobin Protioconazolo + bixafen (1) Benzovindiflupyr (CS) + Protioconazolo (1)		(1) max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (CS) Candidati Sostituzione

SCHEDE DISERBO N°2 - ORZO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a. (g/l)	l. o Kg / ha	LIMITAZIONI D'USO
PRE-SEMINA	Preparazione del letto di semina Graminacee e Dicotiledoni		Glifosate (1)	30,4 (360 g/l)		
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Flufenacet (3) Diflufenican (4) Triallate (5) Prosulfocarb Bifenox (2) Pendimetalin (3)			Il diserbo in pre-emergenza è consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. (2) Bifenox: dicotiledonica; max 1 volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato. (3) Flufenacet, Pendimetalin: non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente. (4) Diflufenican: dicotiledonica con azione secondaria su graminacee. (5) Triallate: graminicida.
POST EMERGENZA PRECOCE	Dicotiledoni e graminacee	1	Flufenacet (3) Prosulfocarb Bifenox (2) Diflufenican (4) Clortoluron (6) Pendimetalin (3)			(2) Bifenox: dicotiledonica; max 1 volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato. (3) Flufenacet, Pendimetalin: non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente. (4) Diflufenican: dicotiledonica con azione secondaria su graminacee. (6) Clortoluron. Ammesso solo nelle zone con sospetta presenza di Lolium resistente: provincie di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto, Arezzo, Firenze. Ammesso solo sugli appezzamenti in cui sia stata effettuata la lavorazione del terreno con ARATURA (NO minima lavorazione o simili).
EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a. (g/l)	l. o Kg / ha	LIMITAZIONI D'USO

POST EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Iodosulfuron metal-sodium (7) Florasulam (8) Mecoprop-P (8) Diclorpop-P (9) (8) MCPA (8) Halauxifen-methyl (8) Metsulfuron metile (8) Tifensulfuron- methyl (8) Tribenuron-metile (8) Clopiralid (8) Amidosulfuron (8) Fluroxipyr (8) Tribenuron-metil (8) Tritosulfuron (8) Cloquintocet-mexyl (antidoto agronomico)		(7) Iodosulfuron metil-sodium: ammesso esclusivamente in miscela; formulato con antidoto; (8) Mecoprop -p, Diclorpop-p, MCPA, Halauxifen-methyl, Clopiralid, Amidosulfuron, Fluroxipyr, Tribenuron-metile, Tritosulfuron, Florasulam, Metsulfuron-etile, Tifensulfuron-methyl: dicotiledonicida. (9) Diclorpop-P: impiegabile come erbicida solo in miscela.
	Graminacee	1	Fenoxaprop-p-ethyl (10) Diclofop metile Pinoxaden + Cloquintocet-mexyl (antidoto agronomico)		(10): Fenoxaprop-p-ethyl: non efficace su Lolium; formulato con antidoto.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°3 – AVENA, SEGALE, TRITICALE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Carbone (<i>Ustilago spp.</i>)			Consigliata concia sementi	
Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>)	1		Evitare semine fitte Concimazioni azotate equilibrate Varietà resistenti e tolleranti	
Ruggini (<i>Puccinia spp.</i>)			Evitare semine fitte Concimazioni azotate equilibrate Varietà resistenti e tolleranti	
Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium spp.</i> , <i>Pyrenophora tritici r.</i>)			Consigliata concia sementi Evitare ristoppio	
Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Fusariosi (<i>Fusarium spp</i>)		Protoconazolo + bixafen (1) (2) (4) Benzovindiflupyr (CS) + Protoconazolo (1) (3)		(1) indipendentemente dall'avversità, max 1 intervento all'anno (2) Utilizzabile solo per Segale (3) Utilizzabile solo per Segale e Triticale contro Rincosporiosi (4) utilizzabile solo per Triticale contro Fusariosi (CS) Candidati Sostituzione
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i>) (<i>Metopolosiphum dirhodum</i>) (<i>Sitobion avenae</i>)			Evitare semine fitte Concimazioni equilibrate	

SCHEDA DISERBO N°3 – AVENA – SEGALÉ - TRITICALE

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a. (g/l)	l. o Kg / ha	LIMITAZIONI D'USO
PRE-SEMINA	Preparazione del letto di semina Graminacee e Dicotiledoni		Glifosate (1)	30,4 (360 g/l)		
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee		Pendimetalin Prosulfocarb (solo per Segale e Triticale) Flufenacet (solo per Segale e Triticale) (2) Diflufenican			Il diserbo in pre-emergenza è consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. (2) Flufenacet: non impiegabile su avena, segale e triticale se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente.
POST - EMERGENZA PRECOCE	Dicotiledoni e Graminacee		Prosulfocarb (solo per Segale e Triticale) Pendimetalin Flufenacet (solo per Segale e Triticale) (2) Diflufenican			(2) Flufenacet: non impiegabile su avena, segale e triticale se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente.
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Iodosulfuron metil-sodium (solo per Segale e Triticale) (4) Clodinafop-Propargyl (solo per Segale e Triticale) Fluroxipyr Clopiralid olamine (5) Florasulam (6) (5) Tribenuron metile (5) Halauxifen-methyl (5) Propoxycarbazone-sodium (solo per Triticale) (8) Mesosulfuron-metile (solo per Segale e Triticale) (11) Metsulfuron-metile Amidosulfuron (10) (5) Fluroxipyr (5) Mecoprop -P (5) Diclorpop-P (3) (5) Tifensulfuron metile (5) (7) Pyroxulam (solo per segale e triticale) (12) Bifenox (1) (5) MCPA (5) Cloquintocet-mexyl (Antidoto agronomico) Mefenpyr-diethyl (Antidoto agronomico)			(1) Bifenox: max 1 volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato; ammesso esclusivamente in miscela. (3) Diclorpop-p: ammesso esclusivamente in miscela. (4) Iodosulfuron metil-sodium: ammesso esclusivamente in miscela; formulato con antidoto; (5) Mecoprop -p, Diclorpop-p, MCPA, Florasulam, Clopiralid olamine, Tribenuron metile, Tifensulfuron metile, Halauxifen-methyl, Amidosulfuron, Fluroxipir, Bifenox: dicotiledonicida. (6) Florasulam: da solo non ammesso su avena. (7) Tifensulfuron metile: ammesso solo in miscela. (8) Propoxycarbazone-sodium: ammesso esclusivamente in miscela; formulato con antidoto; (10) Amidosulfuron: da solo impiegabile esclusivamente su segale ed avena. (11) Mesosulfuron-metile: ammesso esclusivamente in miscela; formulato con antidoto; (12) Pyroxulam: ammesso esclusivamente in miscela; formulato con antidoto;

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°4 – FARRO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVE AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Carbone (<i>Ustilago tritici</i>)				
Carie (<i>Tilletia spp.</i>)				
Fusariosi (<i>Fusarium spp.</i>)				
Nerume (<i>Alternaria spp.</i>) (<i>Cladosporium herbarum</i>) (<i>Epicoccum nigrum</i>)				
Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>)		Zolfo		
Ruggini (<i>Puccinia spp.</i>)				
Septoria (<i>Septoria spp.</i>)				
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i>) (<i>Metopolosiphum dirhodum</i>) (<i>Sitobion avenae</i>)		Piretrine pure		

SCHEDA DISERBO N°4 – FARRO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
<u>DISERBO CHIMICO NON AMMESSO</u>					

SCHEDA DIFESA N°5 – MAIS

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Carbone comune (<i>Ustilago maydis</i>)			Ampie rotazioni e concimazione equilibrata	
Marciume del fusto (<i>Gibberella zeae</i>)			Evitare semine fitte Concimazione equilibrata Ibridi resistenti o tolleranti	
BATTERIOSI				
Batteriosi (<i>Erwinia spp.</i>)				
Cervi, Daini, Caprioli, Camosci	4	Grasso di pecora		

Scheda Difesa N°5 - MAIS

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Concia delle sementi	NON è ammessa la concia delle sementi di mais con INSETTICIDI			
Elateridi (<i>Agrotis spp.</i>)	1	Teflutrin granulare (1) Zeta-cipermetrina granulare (1) Cipermetrina (1) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (6)	Soglia: presenza accertata	(1) Interventi sempre localizzati. Tranne che nei terreni in cui il mais segue se stesso, l'erba medica e la patata la geodisinfestazione può essere eseguita solo alle seguenti condizioni : - la geodisinfestazione non può essere applicata su più del 30% dell'intera superficie aziendale. Tale superficie può essere aumentata al 50% nel seguente caso: - monitoraggio adulti con trappole cattura cumulativa di 1000 individui. (6) <i>Spinosad</i> : insetticida granulare pronto all'uso per interventi al terreno contro larve di elateridi.
Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	1	<i>Bacillus thuringiensis</i> Sub. <i>Kurstachi</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Sub. <i>Aizawai</i> Olio minerale paraffinico <i>Spinosad</i> (5) Indoxacarb (3) Chlorantraniliprole (2)	Soglia: presenza accertata e solo sulla II° e III° generazione	(2) <i>Chlorantraniliprole</i> : max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (3) <i>Indoxacarb</i> : max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (5) <i>Spinosad</i> : max 1 intervento in pre-fioritura all'anno indipendentemente avversità.
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	1	Olio minerale paraffinico Alfacipermetrina (Piretroide) (1) Beta--ciflutrin (Piretroide) (1) Cipermetrina (Piretroide) (1) Deltametrina (Piretroide) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (1)	Soglia: presenza diffusa di attacchi iniziali	(1) <i>Piretroidi</i> al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità

<p>Nottue (<i>Heliothis armigera</i>, <i>Spodoptera spp</i>)</p>	<p>1</p>	<p>Chlorantraniliprole (2) Betacyflutrin (Piretroide) (1) Olio minerale paraffinico</p>		<p>(2) Chlorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>
<p>Diabrotica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)</p>	<p>1</p>	<p>Alfacipermetrina (Piretroide) (1) Beta-ciflutrin (Piretroide) (1) Deltametrina (Piretroide) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Indoxacarb (3) Olio minerale paraffinico</p>	<p>Obbligo trappole cromotropiche. Soglia vincolante: 50 adulti settimanali per 2 settimane consecutive. Solo su terreni su cui si prevede mais per l'anno successivo. Divieto trattamenti in fioritura. Possibilità di deroghe da parte del Servizio Fitosanitario Regionale per obblighi previsti dal DM 8 aprile 2009.</p>	<p>(1) Piretroidi al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità (3) Indoxacarb: max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità.</p>

SCHEDA DISERBO N°5 – MAIS

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE SEMINA	Graminacee e Dicotiledoni	1	Glifosate (1)	30,40 (360g/l)	
PRE - EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1 Si raccomandano interventi localizzati utilizzando i prodotti e le dosi di etichetta (di fatto per ogni ettaro si ha una riduzione del 50%). In alternativa interventi a pieno campo a dosi piene sul 50% della superficie aziendale coltivata a mais. Sul resto interventi solo in post emergenza	Dimetenamide-p Pendimetalin s-Metolachlor (2) Aclonifen (3) Isoxaflutole Flufenacet Petoxamide Isoxaflutolo + Thiencarbazone-metil + Cyprosulfamide Terbutilazina (5) Isoxaflutole + Cyprosulfamide Mesotrione + s-Metolaclor (2) Clomazone		
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni Sorghetta giovane, ecc.	1	Rimsulfuron Piridate Nicosulfuron Foramsulfuron + Isoxadifen-ethyl Mesotrione Prosulfuron (4) Sulcotrione Clopiralid Dicamba Fluroxipir Florasulam+Fluroxipir Thifensulfuron-methyl Mesotrione + s-Metolaclor (2) Isoxaflutole Tritosulfuron Dimetenamid-P Pendimetalin Tembotrione + Isoxadifen-ethyl MCPA Terbutilazina (5) Halosulfuron metile (Dicotiledoni e ciperacee)		

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) S-Metolaclor: impiegabile localizzato sulla fila di semina o sul 50% della superficie a mais oppure impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole, Soia.

(3) Aclonifen: impiegabile localizzato sulla fila di semina o ad anni alterni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Girasole, Pomodoro e Patata.

(4) Prosulforon: ammessa una sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

(5) Terbutilazina: impiegato localizzato sulla fila di semina o al massimo sul 50% della superficie coltivata; ammesso solo in miscela con altre sostanze attive; in un anno al massimo 750 g/ha di sostanza attiva;

SCHEDA DIFESA N°6 – SORGO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Rizoctonia				
Elimintosporiosi				
VIROSI				
(MDMV, BYDV)				
PARASSITI ANIMALI				
Afidi dei cereali		Piretrine		

SCHEDA DISERBO N°6 – SORGO

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE- SEMINA		1	Glifosate (2)	30,40 (360g/L)	
PRE EMERGENZA	Graminacee e Dicotiledoni	1	Aclonifen (4)		
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni	1	s-Metolachlor (3) +Terbutilazina (1) 2.4 D + MCPA Dicamba+Prosulfuron Fluroxipir		
	Dicotiledoni e Graminacee		Mesotrione		

(1) Terbutilazina: impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.

(3) S- Metolachlor: impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole, Soia.

(4) Aclonifen: impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Girasole, Pomodoro, Patata.

(2) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEMA DIFESA N°7 – RISO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Elimintosporiosi (<i>Bipolaris oryzae</i>) Brusone delle foglie (<i>Pyricularia grisea</i>)	1	Azoxystrobin (Strobilurine) (1) +Difeconazolo (IBS) Azoxystrobin (Strobilurine) Trifloxystrobin (Strobilurine) (1) Flutriafol (IBS) Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) Procloraz (IBS)		(1) Strobilurine (Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin): max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
PARASSITI ANIMALI				
Lepidotteri defogliatori		<i>Bacillus thuringensis</i>		
Coppette (<i>Triops cancriformis</i>), Ditteri Chironominidi (<i>Chironomus spp. e Cricotopus spp.</i>), Efidridi (<i>Hydrellia griseola</i>), Vermi di risaia (<i>Brachiura</i>)				

SCHEDA DISERBO N°7 – RISO

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
DISERBO ARGINI		1	Pendimetalin		

Semina in acqua

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE- SEMINA	Graminacee Dicotiledoni	1	Glifosate (1)	30.4	3
ALTRE FASI	Alghe, Riso crodo, Eterentera, Giavone, Graminacee, Ciperacee, Alismatacee, Butomacee, ect...	2	Imazamox (Giavone ed alter infestanti) utilizzabile per varietà Clearfield Clethodim (Graminacee) Triclophir (Ciperacee, Alismatacee, Butomacee) (2) Azimsulfuron Bensulfuron -methyl Bensulfuron -methyl+ Metsulfuron -methyl Bispyribac-sodium Penoxsulam Flufenacet Ciclossidim Propaquizafop Cyalofop-butile Profoxidim Imazosulfuron MCPA Prodotti rameici Glifosate (3) (1) Halosulfuron Bromoxynil		

(3) Per il controllo del Riso crodo: interventi soprachioma con prodotti specificamente registrati

(2) Triclophir: impiegabile al max sul 50% della risaia

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DISERBO N°7 – RISO

Semina in asciutta

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - EMERGENZA	Graminacee e Dicotiledoni	1	Pendimetalin Clomazone		
DALLA PRIMA FOGLIA		2	Pendimetalin Triclophir (Ciperacee, Alismatacee, Butomacee) (3) Bensulfuron -methyl Penoxsulam Cyalofop-butile Profoxidim (2) Imazosulfuron MCPA Halosulfuron Clomazone		

(2) Al massimo un intervento all'anno solo sul 50% della superficie investita a riso.

(3) Triclophir: impiegabile al max sul 50% della risaia

COLTURE INDUSTRIALI

Scheda

- 1 - Barbabietola da zucchero
- 2 - Tabacco
- 3 - Girasole
- 4 - Soia
- 5 - Colza
- 6 - Canapa
- 7 - Iperico perforato
- 8 - Lino
- 9 - Guado (Isatis tintoria)
- 10 - Brassica carinata, Brassica juncea, Altre colture industriali

SCHEDA DIFESA N°1 – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	3	Prodotti rameici <i>Bacillus subtilis</i> Ciproconazolo (IBE) (1) Procloraz (IBE) (1) Tetraconazolo (IBE) (1)		(1) IBE: al max 1 trattamento anno, indipendentemente dall'avversità.
Mal bianco (<i>Erysiphe betae</i>)	-	Zolfo <i>Bacillus subtilis</i>		
Virosi (<i>Rizomania</i>)	-		Ricorre a cultivar tolleranti nei terreni rizomani Lunghe rotazioni colturali	
PARASSITI ANIMALI				
Su Barbabietola da zucchero sono ammessi al max 3 trattamenti insetticidi all'anno.				
Elateridi (<i>Agritotes spp</i>)	1 geodisin- festante localizzato alla semina	Teflutrin (Piretroidi) Zeta-cipermetrina granulare (1) Lambda-cialotrina (1) I trattamenti geodisin- festanti a base di piretroidi e di fosfor- ganici non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse sostanze attive	Soglia: presenza accertata (con vasetti 1 larva per trappola, con carotaggi 15 larve/mq)	(3) In alternativa fra loro (1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Altiche (<i>Chaetocnema tibialis, Longitarsus spp, Phyllotreta vittula</i>)	1	Alfa-cipermetrina (Piretroide) (1) Deltametrina (Piretroide) (1) Cipermetrina (Piretroide) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (1)	Soglia: Fori su foglie cotiledonari (2 fori / foglia su piante con 2 foglie; 4 fori / foglia su piante con 4 foglie)	(1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Cleono (<i>Conoffhynchus mendicus</i>)	2	Deltametrina (Piretroide) (1) Cipermetrina (Piretroide) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Tau-fluvalinate (Piretroide) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroide) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (1)	Erosione fogliare causata da adulti sul 10% delle piante delle file più esterne, a partire dalla metà di Aprile. Superamento di 2 adulti per vaso/settimana	(1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.

segue **SCHEDA DIFESA N°1 – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Atomaria (<i>Atomaria linearis</i>)		Beta-cyflutrin (Piretroide) (1)		(1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Mamestra (<i>Mamestra brassicae</i>)	1	<i>Bacillus thuringensis</i> Deltametrina (Piretroide) (1) Cipermetrina (Piretroide) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Etofenprox (Piretroide) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (1)	Soglia: 2-3 larve/pianta, con distruzione del 10% dell'apparato fogliare	(1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Afide nero (<i>Aphis fabae</i>)	1	Deltametrina (Piretroide) (1) Esfenvalerate (Piretroide) (1)	Soglia: 30% delle piante con colonie in rapido accrescimento e con mancanza di ausiliari.	(1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Nottua Fogliare (<i>Spodoptera exigua</i>)	1	<i>Bacillus thuringensis</i> Cipermetrina (Piretroide) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (1)	Soglia: presenza accertata	(1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	1	Alfa-cipermetrina (Piretroide) (1) Deltametrina (Piretroide) (1) Cipermetrina (Piretroide) (1)	Soglia: 1-2 larve di terza o quarta età o 1-2 piante danneggiate per mq fino allo stadio di 8 foglie	(1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Casside (<i>Cassida vittata, Cassida nobilis</i>)	1	Alfa-cipermetrina (Piretroide) (1) Cipermetrina (Piretroide) (1) Fluvalinate (Piretroide) (1) Deltametrina (Piretroide) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (1)		(1) Piretroidi: al massimo 3 trattamenti per anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Nematode a cisti (<i>Heterodera schachtii</i>)			Effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia o liliace. Utilizzare colture intercalari di piante esca di <i>Raphanus sativus</i> o <i>Sinapis alba</i> da trinciare e poi interrare. Utilizzare varietà di barbabietola tolleranti ai nematodi	

SCHEDE DISERBO N°1 – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE-SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1)	30,4 (360 g/l)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Metamitron Ethofumesate Clomazone		
POST-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	3-4 microdosi (DMR)	Fenmedifam Ethofumesate Metamitron Foramsulfuron + Thiencarbazone (2) Lenacil Clopiralid Triflusaluron-methyl		
	Graminacee	1	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop etile isomero D Quizalofop-p-etile Cletodim		
	<i>Cuscuta</i>		Propizamide		
	<i>Cirsium</i>		Clopiralid		
	<i>Abutilon, Ammy, Girasole, Crucifere</i>		Triflusaluron-methyl (sconsigliata la miscela con graminicidi e clopiralid)		
	<i>Polygonum aviculare</i>		Lenacil		

(2) Utilizzarlo con varietà di Barbabietole resistenti a erbicidi sulfonilureici inibitori dell'acetolattato-sintasi

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate

nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°2 – TABACCO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	3	Cimoxanil (2) Metalaxil (Fenilammidi) (1) Metalaxil-M (Fenilammidi) (1) + Acibenzolar-S-methyl Mancozeb (3) Cyazofamid (4) Cimoxanil (2)+ Zoxamide (5)	<u>Interventi agronomici:</u> - scegliere cultivar resistenti - limitare l'impiego di fertilizzanti azotati - evitare investimenti eccessivamente fitti - assicurare un buon drenaggio del terreno <u>Interventi chimici:</u> -in primavera con condizioni climatiche predisponenti, piogge e temperature inferiori alle medie stagionali, intervenire preventivamente con prodotti di copertura in miscela con prodotti sistemici, alla comparsa dei primi sintomi usare prodotti citotropici o sistemici.	(1) Fenilammidi al max 2 trattamenti l'anno. Con Metalaxil max 1 intervento in miscela con Mancozeb. (2) Cimoxanil al max 3 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Mancozeb al max 2 trattamenti l'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Cyazofamid al max 2 trattamenti l'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Zoxamide: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Alternaria (<i>Alternaria tenuis</i>)	1	Cyprodinil + Fludioxonil (6)	<u>Interventi chimici:</u> -intervenire alla comparsa sintomi	(6) Cyprodinil + Fludioxonil: max 1 intervento all'anno.
Oidio (<i>Erysiphe tabacina</i> , <i>Oidium tabaci</i>)	2	Zolfo Olio essenziale di arancio Penconazolo	<u>Interventi agronomici:</u> -adottare opportuni sestri d'impianto -eliminare le erbe infestanti e i residui della coltura precedente -effettuare la sbranciolatura <u>Interventi chimici:</u> -intervenire alla comparsa dei primi sintomi	
Virosi CMV (<i>virus del mosaico del cetriolo</i>) TMV (<i>virus del mosaico del tabacco</i>) TNV (<i>virus della necrosi del tabacco</i>)			<u>Interventi agronomici:</u> - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente - eliminare dal campo le piantine malate - eliminare i residui infetti - effettuare rotazioni colturali adeguate Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: - frangivento, siepi, reti antiafidiche, pacciamatura.	

segue SCHEDA DIFESA N°2 – TABACCO

AVVERSAITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	1	Teflutrin (Piretroide terreno) (3) Zeta-cipermetrina granulare (Piretroide terreno) (3) Lambda-cialotrina (Piretroide terreno) (3) Cipermetrina	Interventi agronomici: - con infestazioni in atto eseguire sarchiature ripetute per creare un ambiente sfavorevole alle larve - avvicendamento colturale - lavorazioni del terreno in primavera per rompere le ovature Interventi chimici: intervenire solo in presenza generalizzata delle larve	(3) Piretroide terreno al max un trattamento l'anno da usare esclusivamente in maniera localizzata. I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi e di fosfororganici non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse sostanze attive
Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	1	<i>Azadiractina</i> <i>Bacillus Thuringensis</i> Zeta-Cipermetrina (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (1)	Interventi chimici: -utilizzare delle piante "esca" per il rilevamento delle prime infestazioni - intervenire se viene evidenziata la presenza di larve nel terreno con piante esca - effettuare trattamenti localizzati Presenza di attacchi	(1) Piretroidi al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina e max 1 con Lambdacialotrina.
Nottue fogliari (<i>Mamestra</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp., <i>Autografa</i> spp.)	1	Lambdacialotrina (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1)	Soglia: solo in presenza di attacchi	(1) Piretroidi al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina e max 1 con Lambdacialotrina.
Pulce del Tabacco (<i>Epithrix hirtipennis</i>)	2	Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) <i>Piretrine pure</i>	Soglia: alla comparsa dei primi danni o in presenza di 0,5 – 1 adulto/pianta previo controllo di almeno 100 piante/ha scelte a caso.	(1) Piretroidi al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina e max 1 con Lambdacialotrina. (2) Neonicotinoidi: al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Afidi (<i>Myzus</i> spp., <i>Aphis</i> spp., ect...)	1	Zeta- Cipermetrina (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (1) Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (1) Cipermetrina (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Flupyradifurone (5) <i>Piretrine pure</i>	Interventi chimici: - in fase di pre-cimatura intervenire alla comparsa delle prime colonie -in fase di post-cimatura intervenire solo in presenza di infestazioni consistenti	(1) Piretroidi al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina e max 1 con Lambdacialotrina . (2) Neonicotinoidi al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno.

<p>Nematodi Galligeni (<i>Meloidogyne spp</i>)</p>	<p>1</p>	<p><i>Solarizzazione</i> <i>Vapore d'acqua</i> <i>Pannelli di semi di Brassica (1)</i> <i>Paecilomyces lilacinus 251</i> Oxamil (3) Fluopyram</p>	<p><u>Interventi agronomici:</u> - si consiglia l'utilizzo di varietà Tolleranti/resistenti - effettuare ampie rotazioni - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) - sovesci intercalari con colture quali rafano, etc. <u>Interventi fisici:</u> - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni</p>	<p>(3) Oxamil: distribuzione localizzata sulla fila in pre-trapianto una volta all'anno. (1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva.</p>
---	----------	---	--	--

SCHEDA DISERBO N°2 – TABACCO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - TRAPIANTO (INTERRATO)	Graminacee e Dicotiledoni annuali	1	Napropamide (non controlla <i>Solanum nigrum</i>) Benfluralin	41.85 19,2	3 l/ha 6,5 l/ha
PRE-TRAPIANTO/POST-TRAPIANTO (IN SUPERFICIE, LOCALIZZATO SULLA FILA)	Dicotiledoni e Graminacee	1	Aclonifen (1) Pendimetalin Clomazone Ethofumesate Metobromuron (3) Benfluralin	49 40 30.9 44,25 33.78 19,2	3 l/ha 3 l/ha 0.5 l/ha 2 l/ha 3.75 l/ha 6,5 l/ha
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Piridate	45	1 kg/ha
POST - EMERGENZA	Graminacee	1	Propaquizafop Quizalofop isomero D (2) Quizalofop-p-etile (2) Fluazifop-p-butile	9.6 5 5,4 13.4	2 l/ha 1,5 l/ha 3 l/ha 2 l/ha

- (1) Aclonifen: sullo stesso appezzamento 1 intervento ogni 2 anni.
(2) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali
(3) Prima del trapianto.

SCHEDE DIFESA N°3 – GIRASOLE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora <i>(Plasmopara helianthi)</i>		Obbligo di utilizzare seme conciato a meno che non provenga da zone indenni.		
Marciume carbonioso <i>(Sclerotium bataticola)</i>				
Sclerotinia <i>(Sclerotinia sclerotiorum)</i>				
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>				
PARASSITI ANIMALI				
Elateridi <i>(Agrotis spp)</i> e altri insetti terricoli				
Nottue terricole <i>(Agrotis spp.)</i>		<i>Bacillus Thuringensis sub Kurstaki</i>		
Cervi, Daini, Caprioli, Camosci	4	<i>Grasso di pecora</i>		

SCHEDA DISERBO N°3 – GIRASOLE

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina		Glifosate (1)	30,4 (360 g/l)	
PRE - EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Aclonifen (3) Pendimetalin Oxifluorfen s-Metolachlor (2) Metobromuron		
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Aclonifen (3) Imazamox (Solo su cv. di Girasole resistenti) Tribenuron metile (Solo su cv. di Girasole resistenti) Tribenuron metile + Tifensulfuron (Solo su cv. di Girasole resistenti)		
	Graminacee	1	Ciclossidim Propaquizafop Cletodim Quizalofop etile isomero D Quizalofop-p-etile		

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole, Soia.

(3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole, Patata.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°4 – SOIA

AVVERSITA'	N° TRATTa AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Cancro dello stelo (<i>Diaporthe phaseolorum var. scaulivora</i>) Avvizzimento dello stelo (<i>Diaporthe phaseolorum var. sojae</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium var truncatum</i>) Phytophthora (<i>Phytophthora megasperma var. sojae</i>) Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Peronospora (<i>Peronospora manshurica</i>) Rizottoniosi (<i>Rhizoctonia solani</i>)		<i>Trichoderma harzianum</i>		
MALATTIE BATTERICHE				
Maculatura batterica (<i>Pseudomonas syringae pv. glycinea</i>)				
PARASSITI ANIMALI				
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	Exitiazox	Soglia: 2 forme mobili per foglia su un campione di 100 foglie/ettaro	
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	1	Lambdacialotrina (Piretroidi) (1)	Interventi chimici: - intervenire a partire dalla fase fenologica di riempimento dei semi; - intervenire al superamento di soglie di ca. 10 individui / metro lineare; - limitare il trattamento alle porzioni perimetrali degli appezzamenti (fascia di 10 - 15 metri).	(1) Lambdacialotrina (Piretroidi): max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Cervi, Daini, Caprioli, Camosci	4	<i>Grasso di pecora</i>		

SCHEDA DISERBO N°4 – SOIA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1)	30,4 (360g/l)	
PRE - EMERGENZA (3)	Dicotiledoni e Graminacee	1	s-Metolachlor (2) Metribuzin Pendimetalin Clomazone Pethoxamide Flufenacet+Metribuzin Metribuzin + Clomazone Bifenox Metobromuron		
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Tifensulfuron–methyl Bentazone (4) Imazamox Clomazone Bifenox (in post-emergenza precoce)		
	Graminacee	1	Cicloxydim Propaquizafop Quizalofop etile isomero D Quizalofop-p-etile Cletodim		

(3) Gli interventi in pre-emergenza prevengono la selezione di popolazioni di amaranto resistenti agli erbicidi ALS

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole, Soia.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Sorgo, Soia, Erba medica.

SCHEDA DIFESA N°5 – COLZA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Plasmopara helianthi</i>)				
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)				
Sclerotinia o muffa bianca (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)		<i>Bacillus subtilis</i>		
Phoma (<i>Phoma spp</i>)				
PARASSITI ANIMALI	Al max su colza si possono effettuare 2 interventi insetticidi all'anno.			
Meligete (<i>Meligetes aeneus</i>)	1	Tau-fluvalinate (Piretroidi) (2) Acetamiprid (Neonicotinoide) (1) Cipermetrina (Piretroidi) (1)	Soglia: 3 individui per pianta. Intervenire prima dell'apertura dei fiori	(1) Neonicotinoidi : al max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità. (2) Piretroidi : al max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità. Lambdacialotrina e Esfenvalerate in alternativa fra loro.
Afidi	1	Tau-fluvalinate (Piretroide) (2) Lambdacialotrina (Piretroide) (2) Deltametrina (Piretroide) (2) Cipermetrina (Piretroide) (2) Esfenvalerate (Piretroide) (2)	Soglia: 2 colonie/mq	(2) Piretroidi : al max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità. Lambdacialotrina e Esfenvalerate in alternativa fra loro.
Altiche	1	Lambdacialotrina (Piretroide) (2) Deltametrina (Piretroide) (2) Acetamiprid (Neonicotinoide) (1)	Soglia: presenza accertata	(1) Neonicotinoidi : al max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità.
Punteruolo del fusto Ceutorrinchi	1	Deltametrina (Piretroide) (2) Acetamiprid (Neonicotinoide) (1)		(2) Piretroidi : al max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità. Lambdacialotrina e Esfenvalerate in alternativa fra loro. (1) Neonicotinoidi : al max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue defogliatrici	1	Lambdacialotrina (Piretroide) (2) <i>Bacillus Thuringensis</i> Sub <i>Kurstaki</i> <i>Bacillus Thuringensis</i> Sub <i>Aizawai</i>		(2) Piretroidi : al max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità. Lambdacialotrina e Esfenvalerate in alternativa fra loro.
Cervi, Daini, Caprioli, Camosci	4	<i>Grasso di pecora</i>		

SCHEDA DISERBO N°5 – COLZA

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Metazaclor Clomazone + Pendimetalin		
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Clopiralid Metazaclor Imazamox+Metazaclor (Ammesso 1 volta ogni 3 anni)		
	Graminacee	1	Cicloxidim Propaquizafop Quizalofop etile isomero D Quizalofop p-etile		

SCHEDA DIFESA N°6 – CANAPA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N°6 – CANAPA

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N°7 – IPERICO PERFORATO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N°7 – IPERICO PERFORATO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N°8 – LINO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N°8 – LINO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Bromoxynil		

SCHEDA DIFESA N°9 – GUADO (*Isatis tintoria*)

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N°9 – GUADO (*Isatis tintoria*)

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N°10 – BRASSICA CARINATA, BRASSICA JUNCEA, ALTRE COLTURE INDUSTRIALI

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DIFESA N°10 – BRASSICA CARINATA, BRASSICA JUNCEA, ALTRE COLTURE INDUSTRIALI

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

COLTURE ORTICOLE

NOTA VALIDA PER TUTTE LE COLTURE ORTICOLE: i trattamenti geodisinfestanti a base di Piretroidi e Esteri fosforici non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse sostanze attive.

Scheda

- Solanacee

- 1 - Patata
- 2 - Pomodoro da industria
- 3 - Pomodoro da mensa
- 4 - Peperone
- 5 - Melanzana

- Cucurbitacee

- 6 - Melone
- 7 - Cocomero
- 8 - Zucchini
- 9 - Zucca
- 10 - Cetriolo

- Leguminose

- 11 - Fava
- 12 - Cece
- 13 - Lupino
- 14 - Pisello (fresco, da industria e proteico)
- 15 - Fagiolo
- 16 - Fagiolino
- 17 - Lenticchia
- **Cavoli**
 - 18 - Cavoli a infiorescenza
 - 19 - Cavoli a testa
 - 20 - Cavoli a foglia
- **Altre ortive**
 - 21 - Spinacio
 - 22 - Bietola da coste e da foglia
 - 22/A – Bietola rossa o da orto
 - 23 – Bietola da foglia (Produzione in coltura protetta e baby leaf)
 - 24 - Asparago
 - 25 - Cipolla
 - 26 - Porro
 - 27 - Aglio

28 - Scalogno

29 - Carciofo

30 - Cardo

31 – Radicchi

32 – Indivia Riccia

33 – Indivia Scarola

34 – Cicoria (Pan di zucchero)

35 – Lattuga

36 - Carota

37 - Finocchio

38 - Sedano

39 - Prezzemolo

40 - Basilico

41 - Fungo prataiolo o champignon

42 - Altre orticole

SCHEDA DIFESA N°1 – PATATA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	4	Benalaxyl (Fenilammidi) (2) Benalaxil-M (Fenilammidi) (2) Metalaxyl-M (Fenilammidi) (2) Cimoxanil (1) Dimetomorf (CAA) (4) Mandipropamide (CAA) (4) Fosetil-Al Fluazinam (3) Zoxamide (5) Flupicolide (7) Pyraclostrobin (Strobilurina) (8) +Dimetomorf (CAA) (4) Propamocarb (9) Cyazofamid (10) Famoxadone (Strobilurina) (8) Ametoctradina (11) + Dimetomorf (CAA) (4) Metiram (Ditiocarbammati) (6) Almisulbron (10) Dimetomorf (CAA) (4)+ Metiram (Ditiocarbammati) (6) Zoxamide+Dimetomorf (CAA) (4) (12) Oxathiapiprolin (14) (solo in pieno campo) Ametoctradina (11) <i>Prodotti rameici</i>	<u>Interventi agronomici:</u> - impiego di tuberi-seme sicuramente sani - scelta di varietà poco suscettibili - eliminazione delle piante nate da tuberi rimasti nel terreno nelle annate precedenti - ampie rotazioni - concimazione equilibrata - opportuna distanza di semina al fine di evitare una eccessiva densità di piante e di sviluppo dell'apparato aereo <u>Interventi chimici:</u> Ove disponibili attenersi alle indicazioni dei bollettini fitosanitari	(1) Cimoxanil: ammessi 3 trattamenti. (2) Fenilammidi: al max 2 interventi l'anno. (3) Fluazinam: max 2 trattamenti l'anno. (5) Zoxamide: ammessi 4 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (4) CAA (Dimetomorf, Mandipropamide): max di 4 interventi all'anno. (7) Flupicolide: solo in miscela con Propamocarb, max 1 intervento. (8) Strobilurine: max 2 trattamenti anno indipendentemente avversità di cui max 1 con Famoxadone. (9) Propamocarb: max 3 interventi anno indipendentemente avversità. (10) Cyazofamid, Almisulbron: max 3 interventi anno indipendentemente avversità e in alternativa fra loro. (11) Ametoctradina: max 3 interventi anno indipendentemente avversità (6) Ditiocarbammati: max 3 interventi all'anno indipendentemente avversità fino a 21 giorni dalla raccolta. (12) Zoxamide+Dimetomorf: max 3 interventi anno indipendentemente avversità (14) Oxathiapiprolin: max 3 interventi all'anno
Antracnosi (<i>Colletotrichum coccodes</i>)			<u>Interventi agronomici:</u> - impiego di seme sano - ampie rotazioni colturali - evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata	
Alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Pyraclostrobin (Strobilurina) (8)+Dimetomorf (CAA) (4) Zoxamide (5)	<u>Interventi agronomici:</u> - ampie rotazioni - impiego di tuberi-seme sani <u>Interventi chimici:</u> - interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in caso di infezioni su piante giovani, poichè i prodotti antiperonosporici usualmente impiegati sono efficaci anche contro l'alternariosi	(4) CAA (Dimetomorf, Mandipropamide): max di 4 interventi all'anno. (8) Strobilurine: max 2 trattamenti anno indipendentemente avversità di cui max 1 con Famoxadone. (5) Zoxamide: ammessi 4 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Marciume secco (<i>Fusarium solani</i>)		<i>Tricoderma harzianum</i>	<u>Interventi agronomici:</u> - usare precauzioni per evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta - mantenere i locali di conservazione freschi e aerati - non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti	
Cancrena secca (<i>Phoma exigua</i>)			<u>Interventi agronomici:</u> - limitare le lesioni al tubero - distruzione tempestiva dei residui contaminati - porre i tuberi-seme appena raccolti per 2 settimane in ambienti caldi (18-20°C) al fine di favorire la cicatrizzazione delle ferite - in zone ad alto rischio si consiglia di ricorrere a varietà poco suscettibili	
Rizotoniosi (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Tricoderma harzianum</i> . <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Bacillus subtilis</i> Azoxystrobin (Strobilurina) (8) Pencicuron (11) Flutolanil (13) Fluxapiroxad (SDHI) (14) Tolclofos-methy (15)	<u>Interventi agronomici:</u> - impiego di tuberi-seme sani - ampie rotazioni in modo che la patata o altre colture altamente recettive non tornino sullo stesso terreno prima di 4 o 5 anni - ricorso al pregermogliamenti e a semine poco profonde per accelerare lo sviluppo della pianta nelle prime fasi di accrescimento - eliminare e distruggere le piante infette	(8) Strobilurine: max 2 trattamenti anno indipendentemente avversità di cui max 1 con Famoxadone. (11) Pencicuron: ammesso solo per la concia dei tuberi. (13) Flutolanil: max 1 intervento all'anno in presemina dei tuberi o spray nel solco durante la semina. (14) SDHI (Fluxapiroxad, Fluopiram): complessivamente al max 2 interventi. (15) Tolclofos-methy: concia dei tuberi. Max 1 trattamento all'anno.
BATTERIOSI Avvizzimento batterico delle solanacee o marciume bruno (<i>Ralstonia solanacearum</i>)			In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria contro <i>R. solanacearum</i> , segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale l'eventuale presenza di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme nonché sulla coltura in campo e sui tuberi raccolti, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio.	
Marciumi batterici (<i>Erwinia spp.</i>)			<u>Interventi agronomici</u> - effettuare avvicendamenti colturali ampi - evitare di provocare lesioni alle piante - allontanare e distruggere le piante infette	

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
VIROSI (PVX, PVY, PLRV)			<ul style="list-style-type: none"> - Uso di tuberi seme qualificati sanitariamente (seme certificato con basso livello di infezione virale) - Nella coltura per il consumo fresco, normalmente attuata in zone di pianura con favorevoli condizioni di diffusione virale tramite afidi, rinnovare annualmente il seme da utilizzare - Anticipare o ritardare la semina per sfasare il ciclo colturale rispetto al momento di massima presenza di afidi vettori - Eliminazione delle piante originarie da tuberi residui di colture precedenti - Eliminazione delle piante spontanee - Rotazioni colturali 	

segue SCHEDA DIFESA N°1 – PATATA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	1	Teflutrin (Piretroidi terreno) (3) Lambda-cialotrina (Piretroidi terreno) (3) <i>Beauveria bassiana</i>	<u>Interventi agronomici:</u> Evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la risalita degli elateridi. <u>Interventi chimici:</u> Soglia alla semina: presenza accertata di larve nel terreno o infestazione rilevata nell'anno precedente. Distribuzione localizzata	(3) Piretroidi terreno da impiegare alla semina o alla rincalzatura
Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	2	Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Azadiractina Metaflumizone (1) Chlorantraniliprole (7) Deltametrina (Piretroidi) (5) Lambdacialotrina (Piretroidi) (5) <i>Spinosad</i> (3) <i>Bacillus thuringiensis var. tenebrionis</i>	Soglia: infestazione generalizzata	(2) Neonicotinoidi al max una sola volta l'anno indipendentemente dall'avversità (1) Metaflumizone al max 2 interventi l'anno indipendentemente dell'avversità. (3) Spinosad: max 3 trattamenti all'anno indipendentemente avversità (7) Chlorantraniliprole: max 2 trattamenti all'anno indipendentemente avversità. (5) Piretroidi: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina.

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	1	Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (5) Deltametrina (Piretroidi) (5) Zeta-Cipermetrina (Piretroidi) (5) Cipermetrina (Piretroidi) (5) Etofenprox (Piretroidi) (5)	Soglia: presenza diffusa delle prime giovani larve.	(5) Piretroidi: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina.
Tignola della patata (<i>Phthorimaea operculella</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (5) Betacyflutrin (Piretroidi) (5) Lambdacialotrina (Piretroidi) (5) (6) Cipermetrina (Piretroidi) (5) Etofenprox (Piretroidi) (5) Thiacloprid (Neonicotenoide) (2) Chlorantraniliprole (7) Emamectina (8) <i>Spinosad</i> (3)	Soglia: presenza accertata <u>Interventi agronomici</u> Utilizzare tuberi sani per la semina Effettuare frequenti rincalzature distruggere subito dopo la raccolta i residui colturali Trasportare in tempi brevi i tuberi nei locali di conservazione	(5) Piretroidi: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina. (6) Lambdacialotrina (Piretroidi): max 1 trattamento all'anno indipendentemente avversità fra il max di 2 interventi con Piretroidi. (3) Spinosad: max 3 trattamenti all'anno indipendentemente avversità. (7) Chlorantraniliprole: max 2 trattamenti all'anno indipendentemente avversità. (8) Emamectina: max 3 trattamenti all'anno indipendentemente avversità. (2) Neonicotinoidi al max una sola volta l'anno indipendentemente dall'avversità.

segue **SCHEDA DIFESA N°1 – PATATA**

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Afidione verde della patata <i>(Macrosiphum euphorbiae)</i> , Afide verde del pesco <i>(Myzus persicae)</i> Afide del ramno <i>(Aphis nasturtii)</i> Afide nero della fava <i>(Aphis fabae)</i> Afide grande della rosa <i>(Aphis gossypii)</i> Afide a macchie verdi della patata <i>(Aulacorthum solani)</i>	1	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Sulfoxaflor (9) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: infestazione generalizzata	(2) Neonicotinoidi al max una sola volta l'anno indipendentemente dall'avversità; (solo afidone verde della patata). (5) Piretroidi: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina. (9) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nematodi a cisti <i>(Globodera rostochiensis,</i> <i>Globodera pallida)</i>	1	<i>Paecilomyces lilacinus</i> Fluopyram (SDHI) (14) Oxamil (Carbammato) (11)	Interventi agronomici: - coltivare la patata in larghe rotazioni con piante non ospiti (cereali, leguminose, composite, liliacee, ombrellifere) - evitare di coltivare la patata in rotazioni con melanzana e pomodoro (piante ospiti) - evitare i ristagni idrici - effettuare la raccolta prima della maturazione delle cisti - impiegare varietà di patata resistenti al biotipo Ro2 di <i>G. rostochiensis</i> - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) - utilizzo di colture intercalari, Brassicacee nematocide, e relativo sovescio Interventi chimici: - presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni. - localizzati prima della semina solo ad anni alterni - utilizzare formulati granulari	(14) SDHI (Fluxapiroxad, Fluopiram): complessivamente al max 2 interventi. (11) Oxamil: max 1 intervento all'anno.

SCHEDA DISERBO N°1 – PATATA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
DISSECCANTE PRE-RACCOLTA	Applicare il prodotto in pre-raccolta	-	Carfentrazone Ethyl Pyraflufen-ethile Acido pelargonico*		
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico*	30,4 (360 gr/L)	
PRE EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Clomazone Flufenacet Aclonifen (2) Pendimetalin Metribuzin Flufenacet + Metribuzin (impiegabile sullo stesso terreno 1 volta ogni 3 anni) Napropamide Metribuzin+Clomazone Metobromuron Prosulfocarb Acido pelargonico *		
POST EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Metribuzin Rimsulfuron Acido pelargonico *		
	Graminacee	1	Propaquizafop Ciclofidim Cletodim Quizalofop-P-Etile		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente che venga applicato su Mais, Sorgho, Girasole, Pomodoro e Patata.

SCHEDE DIFESA N°2 – POMODORO DA INDUSTRIA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE: nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di 2 sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, il Fosetil Al, i Fosfonati di K, il Fosfonato disodio e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale;				
Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	9	Metalaxyl-M (Fenilammidi) (1) Benalaxyl (Fenilammidi) (1) Fosetil-Al Cimoxanil (2) Dimetomorf (CAA) (5) (11) Mandipropamide (CAA) (5) Azoxystrobin (Strobilurine) (3) Famoxadone (Strobilurine) (3) Metiram (Ditiocarbammati) (7) Propamocarb (4) Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) Zoxamide (6) (11) Cyazofamid (9) Ametoctradina (10) + Dimetomorf (CAA) (5) Ametoctradina (10)+Metiram (Ditiocarbam) (7) Almisulbrom (9) Fluazinam (12) Oxathiapiprolin (17) Ametoctradina (10) <i>Prodotti rameici</i>	Interventi chimici: "al verificarsi delle condizioni favorevoli per lo sviluppo delle infezioni intervenire con prodotti di copertura ad azione preventiva di contatto In condizioni di elevata umidità e ad infezione avvenuta (massimo tre giorni) impiegare prodotti ad azione preventiva antisporulante e curativa o con attività curativa e persistenza prolungata "	(1) Fenilammidi: ammessi non più di 3 volte all'anno indipendentemente dalle avversità. (2) Cimoxanil: ammesso non più di 3 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità; da usare preferibilmente con altre sostanze attive. (3) Strobilurine: ammessi non più di 3 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità, di cui max 1 con Famoxadone; (4) Propamocarb: solo in miscela con cimoxanil. (5) CAA (Dimetomorf, Mandipropamide): max di 4 interventi all'anno. (6) Zoxamide: ammessi 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (7) Ditiocarbammati: ammessi 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (9) Cyazofamid e Almisulbron: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità, in alternativa fra di loro. (10) Ametoctradina: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (11) Zoxamide+Dimetomorf: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (12) Fluazinam: max 2 interventi per anno. (17) Oxathiapiprolin: max 3 interventi all'anno

Segue SCHEDA DIFESA N°2 – POMODORO DA INDUSTRIA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Alternariosi (<i>Alternaria alternata</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum coccodes</i>) Septoriosi (<i>Septoria lycopersici</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus subtilis</i> Azoxystrobin (solo Alternaria) (Strobilurine) (3) Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) +Metiram (Ditiocarbammati) (7) Difeconazolo (IBE) (CS) (8) Zoxamide (6) (Solo Alternaria) Fluxapiroxad (SDHI) + Difenconazolo (IBE) (17) Metiram (Ditiocarbammati) (7)	<u>Interventi agronomici:</u> - impiego di seme sano - ampie rotazioni colturali - evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata <u>Interventi chimici</u> Solitamente non sono necessari interventi specifici poiché gli antiperonosporici di contatto sono attivi anche verso queste avversità. Per attacchi gravi e in zone particolarmente umide è consigliabile un trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario, da un altro dopo 8-10 giorni	(3) Strobilurine: ammessi non più di 3 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità. (6) Zoxamide: ammessi 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (7) Ditiocarbammati: ammessi 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (8) IBE: max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con CS (Candidati alla sostituzione). (6) Zoxamide: ammessi 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (17) Fluxapiroxad + Difenconazolo (IBE): ammesso solo per Alternariosi, max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa al Difenconazolo.
Oidio (<i>Leveillula taurica</i>) (<i>Erysiphe spp</i>)	2	Zolfo <i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus pumilis</i> Azoxystrobin (Strobilurine) (3) Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) +Metiram (Ditiocarbammati) (7) Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) +Boscalid (9) Difeconazolo (IBE) (CS) (8) Miclobutanil (IBE) (CS) (8) Penconazolo (IBE) (8) Tebuconazolo (IBE) (CS) (8) Tetraconazolo (IBE) (8) Cyflufenamid (1) Metrafenone (2)	Soglia: ad esclusione dello zolfo e dei prodotti biologici, intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi.	(3) Strobilurine: ammessi non più di 3 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità. (7) Ditiocarbammati: ammessi 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (8) IBE: max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con CS (Candidati alla sostituzione). (9) Boscalid: max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (1) Cyflufenamid: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (2) Metrafenone: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>) Marciume del colletto (<i>Sclerotinia spp.</i>)		<i>Pythium oligandrum M1</i> (16) <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 (solo contro Botrite)	<u>Interventi agronomici:</u> - ridurre eccessi di umidità - preferire metodi d'irrigazione a goccia.	(16) <i>Pythium oligandrum M1</i>: max 4 interventi indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Patogeni tellurici: <i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	-	<i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (15)	<u>Interventi agronomici:</u> - impiego di seme sano; - adottare ampie rotazioni; - ridurre eccessi di umidità; preferire metodi d'irrigazione a goccia.	(15) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11): max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia.
BATTERIOSI				
(<i>Pseudomonas</i> spp, <i>Xanthomonas</i> spp. <i>Clavibacter michiganensis</i>),	4	<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus subtilis</i> Acibenzolar-s-metile (1)	<u>Interventi agronomici:</u> • Impiegare seme sano • Impiegare piantine sane • Evitare eccessi di umidità e metodi di irrigazione ad aspersione. • Effettuare rotazioni di almeno 2-3 anni. • Eliminare erbe infestanti • Bruciare i residui colturali <u>Interventi chimici:</u> Dopo la comparsa dei primi sintomi intervenire chimicamente ogni 7-10 giorni fino alla fioritura.	(1) Al max 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.

SCHEDA DIFESA N°2 – POMODORO DA INDUSTRIA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp)	1 Interventi localizzati	Teflutrin Zeta-cipermetrina (Piretroidi) granulare Cipermetrina (Piretroidi)	Soglia: intervenire in modo localizzato solo in presenza accertata di larve o infestazioni rilevata nell'anno precedente	I Piretroidi applicati al terreno non vanno considerati nel complesso dei piretroidi applicati alla coltura.
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afidone verde della patata (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	2	<i>Olio Minerale</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Flonicamid (10) Spirotetramat (11) Sulfoxaflor (14) <i>Maltodestrina</i> Flupyradifurone (15)	Le infestazioni possono essere controllate dagli ausiliari presenti in natura Soglia: 1) Zone ad alto rischio per le virosi: comparsa delle prime colonie 2) Zone a basso rischio di virosi: 10 % di piante infestate sparse lungo la diagonale dell'appezzamento.	(3) Neonicotinoidi: max 1 trattamento all'anno indipendentemente dalle avversità. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (11) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (14) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa al trattamento con neonicotenoide. (15) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra.

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Tignola del pomodoro (<i>Tuta absoluta</i>)	3	<i>Spinosad (Spinosine) (5)</i> <i>Confusione sessuale</i> <i>Azadiractina</i> Indoxacarb (8) Metaflumizone (6) Emamectina (9) Abamectina (9) Chlorantraniliprole (11) Etofenprox (Piretroidi) (2) (solo pieno campo) Spinetoram (Spinosine) (5)	<u>Interventi biotecnici:</u> - Impiegare trappole a feromone per monitorare la presenza del parassita. - si raccomanda l'utilizzo di reti antinsetto <u>Interventi biologici:</u> Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori <i>Macrolophus caliginosus</i> e <i>Nesidiocoris tenuis</i> e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (<i>Tricogramma</i> spp.) Soglia di intervento Presenza del fitofago <u>Interventi chimici:</u> - Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie - Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni - Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza	(5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (8) Indoxacarb max 4 per anno indipendentemente avversità (6) Metaflumizone al massimo 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (9) Abamectina, Emamectina: complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Chlorantraniliprole al massimo 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (2) Piretroidi al massimo 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 fra Lambda-cialotrina, Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Etofenprox.
Cimici (<i>Nezara viridula</i>) Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)		<i>Piretrine pure</i> Acetamiprid (Neonicotenoide) (3) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2) * Deltametrina (Piretroidi) (2) Etofenprox (Piretroidi) (2)	Limitare l'intervento alle sole coltivazioni ove è stata rilevata una presenza diffusa e significativa di cimici	(3) Neonicotinoidi: max 1 trattamento all'anno indipendentemente dalle avversità. (2) Piretroidi al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 fra Lambda-cialotrina, Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Etofenprox. * Solo contro cimice asiatica
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	1	Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (2) Deltametrina (Piretroidi) (2) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2) <i>Piretrine pure</i>	Soglia: 1 larva ogni 5 metri lineari di fila, osservando 4 punti di 5 metri lungo la diagonale dell'appezzamento.	(2) Piretroidi al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 fra Lambda-cialotrina, Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Etofenprox.
Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina biologica</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°2 – POMODORO DA INDUSTRIA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ragno rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	2	Abamectina Clofentezine Exitiazox Fenpyroximate Tebufenpirad (13) Etoxazole (12) Bifenazate Acequinocyl Cyflumetofen (14) <i>Olio Minerale</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Beauveria bassiana</i>	Soglia: Presenza di consistenti focolai precoci d'infestazione con inizio di decolorazione fogliare e assenza di predatori. <u>Interventi biologici</u> - Utilizzare <i>Phytoseiulus persimilis</i> - Intervenire con 3- 4 acari per foglie - Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale,	(12) Etoxazole al max 1 trattamento anno. (13) Tebufenpirad al max 1 trattamento anno. (14) Cyflumetofen: max 1 intervento all'anno.
Tripidi (<i>Frankliniella spp</i>)	1	<i>Spinosad (Spinosine) (5)</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Beuveria bassiana</i> <i>Spinetoram (Spinosine) (5)</i>	Soglia: Comparsa dei primi adulti .	(5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum,</i> <i>Bemisia tabaci</i>)		<i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Piretrine</i>	Interventi Nelle aree a forte rischio di virosi intervenire all'inizio delle infestazioni. Nelle altre aree intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia.	

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Plusia gamma</i> , <i>Spodoptera spp.</i>)	2	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>SpliNPV</i> <i>Spinosad</i> (5) Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (2) Deltametrina (Piretroidi) (2) Etofenprox (Piretroidi) (2) (solo pieno campo) Indoxacarb (8) Metaflumizone (6) Emamectina (9) Clorantraniliprole (10) Metoxifenozone (11) Spinetoram (Spinosine) (5)	Soglia: 2 piante con presenza di uova o larve su 30 piante controllate per appezzamento. Si consiglia di controllare il volo con trappole a feromoni	(5) <u>Spinosine (Spinosad, Spinetoram)</u> al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (2) <u>Piretroidi</u> al massimo 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 fra Lambda-cialotrina, Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Etofenprox. (6) <u>Metaflumizone</u> al massimo 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (8) <u>Indoxacarb</u> max 4 per anno indipendentemente avversità (9) <u>Abamectina, Emamectina</u> : complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) <u>Clorantraniliprole</u> : massimo 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (11) <u>Metoxifenozone</u> : massimo 1 intervento all'anno in pieno campo indipendentemente dall'avversità. Non ammesso contro <i>Plusia</i> .
Nematodi galligeni		<i>Paecilomyces lilacinus</i> Solarizzazione Pannelli di semi di Brassica Vapore d'acqua Estratto d'aglio	<u>Interventi agronomici:</u> - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici - impiegare varietà e portinnesti tolleranti/resistenti - utilizzo di pannelli di semi di brassica <u>Interventi fisici:</u> - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	

SCHEDE DISERBO N°2 – POMODORO DA INDUSTRIA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE – SEMINA E TRAPIANTO	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Napropamide Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE - EMERGENZA Localizzato sulla fila: l'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie	Dicotiledoni e Graminacee	1	Aclonifen (3) Acido pelargonico *		
PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Aclonifen (3) Metribuzin Flufenacet s-Metolachlor (2) Pendimetalin Flufenacet + Metribuzin (impiegabile sullo stesso terreno 1 volta ogni 3 anni) Acido pelargonico *		
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni	3	Metribuzin Rimsulfuron Acido pelargonico *		
	Graminacee		Cicloxidim Propaquizafop Quizalofop etile isomero D Quizalofop p etile Cletodim Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole e Soia.

(3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole e Patata.

SCHEDA DIFESA N°3 – POMODORO DA MENSA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
MALATTIE FUNGINE: nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di 2 sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, Fosetil Al, Fosfonato di K, Fosfonato di disodio e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva utilizzabile solo un formulato commerciale;				
Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	5	Cimoxanil (1) Dimetomorf (CAA) (6) (13) Mandipropamide (CAA) (6) Fosetil-Al Azoxystrobin (Strobilurine) (5) Pyraclostrobin (Strobilurine) (5) Famoxadone (Strobilurine) (5) Metiram (Ditiocarbammati) (2) Metalaxil-M (Fenilammidi) (4) Benalaxil (Fenilammidi) (4) Propamocarb (7) Zoxamide (8) (13) Ametoctradina (10) + Dimetomorf (CAA) (5) Ametoctradina (10) +Metiram (Ditiocarbam) (7) Almisulbron (11) Metiram (Ditiocarbammati) (12) Cyazofamid (11) Ametoctradina (10) <i>Prodotti rameici</i>		(1) Cymoxanil: ammesso non più di 3 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità. (2) Ditiocarbammati: ammessi non più di 2 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità. (4) Fenilammidi max 2 interventi l'anno. (5) Strobilurine: ammesse non più di 2 volte per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità di cui max 1 Famoxadone. (6) CAA (Dimetomorf, Mandipropamide): max di 4 interventi all'anno. (7) Propamocarb: ammessi 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (8) Zoxamide: ammessi 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (10) Ametoctradina: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (11) Almisulbrom e cyazofamid: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa fra di loro. (12) Ditiocarbammati: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (13) Zoxamide+Dimetomorf: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Alternariosi (<i>Altrenaria solani, Alternaria sp.</i>) Septoriosi (<i>Septoria lycopersici</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus subtilis (solo pieno campo)</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZB24 (solo serra) * Azoxystrobin (Strobilurine) (5) (NO <i>Septoria</i>) Pyraclostrobin (Strobilurine) (5) + Metiram (Ditiocarbammati) (2) Difeconazolo (IBE) (9) Fluxapiroxad (SDHI) (18) + Difeconazolo (IBE) (16) Isopyrazam (17) Metiram (Ditiocarbammati) (2)		(5) Strobilurine: ammessi non più di 2 volte per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (8) Zoxamide: ammessi 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (2) Ditiocarbammati: ammessi non più di 2 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità. (9) IBE: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (16) Fluxapiroxad (SDHI) + Difeconazolo (IBE): solo contro alternariosi in alternativa al Difeconazolo. (18) SDHI (Fluxapiroxad, Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (17) Isopyrazam: solo contro alternariosi in alternativa al Difeconazolo. * Autorizzato solo contro Alternariosi

Segue SCHEDE DIFESA N°3 – POMODORO DA MENSA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	<i>Tricoderma harzianum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum</i> , D747 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Pythium oligandrum</i> M1 (13) <i>Cerevisane</i> (solo serra) <i>Bacillus subtilis</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> Pyrimenthanil Fenhexamid Cyprodinil+Fludioxonil (19) Boscalid (SDHI) (18) + Piraclostrobin (Strobilurine) (5) Fenpyrazamine (11) Penthiopirad (SDHI) (18) Fludioxonil (solo in serra) (19)		(5) Strobilurine: ammessi non più di 2 volte per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) SDHI (Fluxapiroxad, Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Fenpyrazamine: max 1 trattamenti l'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Pythium oligandrum M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità. (19) Fludioxonil: da solo o in serra max 1 intervento indipendentemente dall'avversità.
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia</i> spp.)		<i>Pythium oligandrum</i> M1 (13)		(13) Pythium oligandrum M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità.
Cladosporiosi (<i>Cladosporium fulvum</i>)	3	Azoxystrobin (Strobilurine) (5) Boscalid (SDHI) (18) + Piraclostrobin (Strobilurine) (5) Difeconazolo (IBE) (9) Metiram (Ditiocarbammati) (2)	Interventi agronomici: - arieggiare bene e costantemente le serre - non adottare sestri di impianto troppo fitti Interventi chimici: - disinfezione delle strutture in legno della serra - trattare alla comparsa dei primi sintomi - effettuare un altro intervento a distanza di 10 giorni solo se c'è ripresa della malattia	(5) Strobilurine: ammessi non più di 2 volte per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) SDHI (Fluxapiroxad, Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Ditiocarbammati: ammessi non più di 2 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità. (9) IBE: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.
Fusariosi radicolare e verticillosi (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i> , <i>Verticillium</i> spp.)		<i>Tricoderma viride</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i>		
Patogeni tellurici : <i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	2	<i>Trichoderma asperellum</i> (15) <i>Trichoderma gamsii</i> (15) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (14) Propamocarb (Ditiocarbammati)+Fosetil-Al (1) (15)		(1) Propamocarb+Fosetil: solo impianti a goccia o con distribuzione localizzata. (15) contro <i>Pythium</i> spp. (14) Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11) contro tutti i patogeni tellurici mediante l'impianto d'irrigazione a goccia.

Segue SCHEDE DIFESA N°3 – POMODORO DA MENSA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI		SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Oidio (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Leveillula taurica</i>)	1	Zolfo <i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus pumilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZB24 (solo serra) * Azoxyastrobin (Strobilurine) (5) Pyraclostrobin (Strobilurine) (5) + Metiram (Ditiocarbammati) (2) Difeconazolo (IBE) (9) Miclobutanil (IBE) (9) Penconazolo (IBE) (9) Tetraconazolo (IBE) (9) Tebuconazolo (IBE) (9) Cyflufenamid (1) Metrafenone (3) Bupirimate Tryfloxystrobin (Strobilurine) (5) + Tebuconazolo (IBE) (9) (COS+OGA) (14) Fluxapiraxad (SDHI) (18) + Difeconazolo (IBE) (9) (16) Pyraclostrobin (Strobilurine) (5) + Boscalid (SDHI) (18) (Flutriafol (IBE) (9)	Soglia: ad esclusione dello zolfo e dei prodotti biologici, intervenire solo alla comparsa B primi sintomi.	(5) Strobilurine: ammessi non più di 2 volte per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (2) Ditiocarbammati: ammessi non più di 3 volte per ciclo colturale indipendentemente dalle avversità. (9) IBE: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (1) Cyflufenamid: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (3) Metrafenone: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (14) (COS+OGA): max 5 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (16) Fluxapiraxad (SDHI) + Difeconazolo (IBE): in alternativa al difeconazolo. (18) SDHI (Fluxapiraxad, Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (19) Triadimenol (IBE) + Fluopyram (SDHI): ammesso solo in coltura protetta.
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Clavibacter michiganensis</i>)	4	Acibenzolar-s-metil (1) Prodotti rameici <i>Bacillus subtilis</i>		(1) Acibenzolar-s-metil: max 4 interventi per anno, ammesso solo in pieno campo.
VIROSI (<i>CMV</i> , <i>PVY</i> , <i>ToMV</i> , <i>TSWV</i>)				

Segue SCHEDE DIFESA N°3 – POMODORO DA MENSA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afidone verde della patata (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	2	<i>Olio Minerale</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Flonicamid (10) Spirotetramat (4) Sulfoxaflor (13) <i>Maltodestrina</i> Flupyradifurone (15)	Le infestazioni possono essere controllate dagli ausiliari presenti in natura Soglia: 1) Zone ad alto rischio per le virosi: comparsa delle prime colonie 2) Zone a basso rischio di virosi: 10 % di piante infestate sparse lungo la diagonale dell'appezzamento.	(1) Neonicotinoidi: ammessi una sola volta nel corso dell'anno indipendentemente dalle avversità. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (4) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (13) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa al trattamento con neonicotenoide. (15) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra.
Aleurodidi (<i>T.vaporarium</i> , <i>B.tabaci</i>)	2	<i>Piretrine pure</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus (Solo serra)</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Thiacloprid (Neonicotinoidi) (1) Pyriproxyfen (3) Flonicamid (10) Spirotetramat (6) Spiromesifen (solo serra) (6) Sulfoxaflor (13) <i>Maltodestrina</i> Flupyradifurone (15) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra)	Soglia: 10 stadi giovanili vitali per foglia o comparsa dei primi adulti.	(1) Neonicotinoidi: ammessi una sola volta nel corso dell'anno indipendentemente dalle avversità. (3) Pyriproxyfen max una volta all'anno. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (2) Piretroidi: massimo 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (6) Spirotetramat, Spiromesifen: complessivamente max 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (13) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa al trattamento con neonicotenoide. (15) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Cloraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
<p>Tignola del pomodoro (<i>Tuta Absoluta</i>)</p>	<p>3</p>	<p><i>Spinosad</i> (5) <i>Confusione sessuale</i> Indoxacarb (8) Azadiractina Metaflumizone (9) Emamectina (10) Abamectina (10) Chlorantraniliprole (Diamidi) (11) Etofenprox (Piretroidi) (2) (solo pieno campo) Tebufenozide (14) (solo in serra) Spinetoram (Spinosine) (5) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra)</p>	<p><u>Interventi biotecnici:</u> - Impiegare trappole a feromone per monitorare la presenza del parassita. - Raccomandato l'uso di reti antinsetto</p> <p><u>Interventi biologici:</u> - Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori <i>Macrolophus caliginosus</i> e <i>Nesidiocoris tenuis</i> e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (<i>Tricogramma</i> spp.)</p> <p>Soglia di intervento Presenza del fitofago</p> <p><u>Interventi chimici:</u> - Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie - Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni - Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza</p>	<p>(5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (8) Indoxacarb max 4 per anno indipendentemente avversità (9) Metaflumizone: massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Abamectina, Emamectina: complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Chlorantraniliprole (Diamidi): al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Piretroidi: massimo 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (14) Tebufenozide: max 2 interventi all'anno in alternativa al metoxifenozide indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>

Segue SCHEDA DIFESA N°3 – POMODORO DA MENSA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Minatori fogliari (<i>Liriomyza spp</i>)	1	Abamectina (10) Ciromazina (solo serra) Spinosad (5)	Soglia: Presenza di mine e/o ovodeposizioni sulle foglie o comparsa delle prime mine	(5) <u>Spinosad</u> al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità (10) <u>Abamectina, Emamectina</u> : complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue fogliari (<i>Heliothis armigera, Plusia gamma, Spodoptera spp.</i>)	2	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>SpliNPV</i> Spinosad (5) Indoxacarb (8) Lambdacialotrina (Piretroidi) (2) Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (2) Deltametrina (Piretroidi) (2) Etofenprox (Piretroidi) (2) (solo pieno campo) Metaflumizone (9) Emamectina (10) Clorantraniliprole (11) Metoxifenozide (12) Tebufenozide (14) (solo in serra) Spinetoram (Spinosine) (5)	Inizio comparsa giovani larve.	(2) <u>Piretroidi</u> : massimo 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (5) <u>Spinosine (Spinosad, Spinetoram)</u> al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (9) <u>Metaflumizone</u> : massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) <u>Indoxacarb</u> max 4 per anno indipendentemente avversità (10) <u>Abamectina, Emamectina</u> : complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) <u>Clorantraniliprole</u> : massimo 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (12) <u>Metoxifenozide</u> : massimo 2 interventi l'anno in serra indipendentemente dall'avversità. (14) <u>Tebufenozide</u> : max 2 interventi all'anno in alternativa al metoxifenozide indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°3 – POMODORO DA MENSA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ragno_rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	<i>Olio minerale</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Clofentezine Exitiazox Fenpyroximate (15) Tebufenpirad Etoxazole Pyridaben Acequinocyl Spiromesifen (solo serra) (5) Abamectina (10) Cyflumetofen (15) (solo pieno campo) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra)	Soglia: Presenza di consistenti focolai precoci d'infestazione con inizio di decolorazione fogliare e assenza di predatori.	(5) Spiromesifen: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (15) Fenpyroximate: autorizzato solo in pieno campo. (10) Abamectina, Emamectina: complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (15) Cyflumetofen: max 1 intervento all'anno. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Frankliniella spp</i>)	1	Spinetoram (Spinosine) (5) Abamectina (10) Formentanate (1) Acrinatrina (Piretroidi) (2) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) <i>Spinosad</i> (5) <i>Beauveria bassiana</i>	Soglia: prime fasi dell'infestazione.	(5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (1) Formentanate max 1 trattamento anno indipendentemente dall'avversità. (10) Abamectina, Emamectina: complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Piretroidi: massimo 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantiraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	1	Alfacipermetrina (Piretroidi) (2) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (2) Deltametrina (Piretroidi) (2) <i>Piretrine pure</i>	Soglia: 1 larve ogni 5 metri lineari di fila, osservando 4 punti di 5 metri lungo la diagonale dell'appezzamento.	(2) Piretroidi: massimo 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Eriofide (<i>Aculops lycopersici</i>)		<i>Amblyseius andersoni</i> Zolfo <i>Sali potassici di acidi grassi</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°3 – POMODORO DA MENSA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
<p>Patogeni tellurici</p> <p>Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)</p> <p>Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)</p> <p>Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)</p>	1	<p><i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i></p> <p>Metam Na (2) (3) Metam K (2) (3) Dazomet (2) (4)</p> <p><i>Trichoderma harzianum</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1</p>		<p>(2) Metam Na, Metam K, Dazomet: disinfezione del terreno in assenza di coltura.</p> <p>(3) Metam Na, Metam K: impiegabili solo una volta ogni 3 anni; Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno.</p> <p>(4) Dazonet: da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato). Impiegabile solo una volta ogni 3 anni;</p>
<p>Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)</p>	-	<p>Fenamifos (1) (solo serra) Fosthiazate (1) (solo serra) Oxamyl (1) (solo in serra) Fluopyram (SDHI) (4) (18) (solo pieno campo) Abamectina (13) (10) Solarizzazione Pannelli di semi di brassica Vapore d'acqua <i>Paecilomyces lilacinus</i> Estratto d'aglio</p>	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici - impiegare portinnesti tolleranti/resistenti - utilizzo di pannelli di semi di brassica <p>Interventi fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni <p>Interventi chimici:</p> <p>Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare o liquido e successivamente 20-30 giorni dopo con un prodotto liquido di copertura 	<p>(1) Nell'arco di un'anno può essere utilizzato solo uno di questi prodotti in alternativa fra di loro. Oxamyl: con la coltura in atto intervenire in modo localizzato tramite impianti di irrigazione con formulati liquidi.</p> <p>(4) Fluopyram: max 2 interventi anno.</p> <p>(13) Abamectina: utilizzo ammesso solo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette ed in alternativa alle altre sostanze attive.</p> <p>(10) Abamectina, Emamectina: complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(18) SDHI (Fluxapiroxad, Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>

SCHEDE DISERBO N°3 – POMODORO DA MENSA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - TRAPIANTO	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDE DIFESA N°4 – PEPPERONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Cancrena pedale (<i>Phytophthora capsici</i>)	2	<i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Tricoderma viride</i> <i>Prodotti rameici</i> Metalaxyl-M (Fenilammidi) (1) Propamocarb		(1) Fenilammidi max 1 trattamento l'anno indipendentemente dall'avversità.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	Pyrimetanil (solo coltura protetta) Ciprodinil+Fludioxonil Boscalid (SDHI) (16) + Pyraclostrobin (QOI Strobilurine) (3) Fenpyrazamine (IBS Class III) (15) Fenhexamide (IBS Class III) (15) <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Pythium oligandrum M1</i> (13) Fludioxonil (solo serra) Penthiopyrad (SDHI) (16)		(3) QOI (Strobilurine) max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) <i>Pythium oligandrum M1</i> : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (15) Fenpyrazamine, Fenhexamide (IBS Class III) : max 2 interventi complessivi. (16) SDHI (Penthiopyrad, Boscalid) : complessivamente max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia</i> spp.)		<i>Pythium oligandrum M1</i> (13)		(13) <i>Pythium oligandrum M1</i> : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra.

Segue SCHEDA DIFESA N°4 – PEPERONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	2	Zolfo <i>Ampelomyces quisqualis</i> Azoxistrobin (QOI Strobilurine) (3) Boscalid (SDHI) (16) + Pyraclostrobin (QOI Strobilurine) (3) Miclobutanil (IBE) (CS) (4) Tebuconazolo (IBE) (CS) (4) Penconazolo (IBE) (4) Tetraconazolo (IBE) (4) Bupirimate Cyflufenamid (1) Azoxistrobin (QOI Strobilurine) (3) + Difenconazolo (IBE) (4) Metrafenone (2) (COS+OGA) (5) Flutriafol (IBE) (4)		(1) Cyflufenamid : max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (3) QOI (Strobilurine) max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) IBE max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione). (2) Metrafenone : max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (5) (COS+OGA) : max 5 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (16) SDHI (Penthiopyrad, Boscalid) : complessivamente max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.
BATTERIOSI (<i>Xanthomonas campestris</i> , <i>pv.vesicatoria</i>)		<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus subtilis</i>		
MARCIUME MOLLE (<i>Erwinia carotovora</i>)			Interventi agronomici: - assicurare un ambiente di coltivazione arieggiato e ben drenato.	I trattamenti con prodotti rameici eseguiti contro <i>Xanthomonas campestris</i> possono aiutare a contenere e/o prevenire la malattia

Segue SCHEDA DIFESA N°4 – PEPERONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	2	Deltametrina (Piretroide) (1) Etofenprox (Piretroide) (1) Lambda-cialotrina (Piretroide) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroide) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (1) Indoxacarb (3) Metaflumizone (8) Emamectina (9) <i>Spinosad</i> (4) <i>Bacillus thuringiensis</i> (<i>E</i>)-11-Tetradecen-1-yl acetate (<i>Feromone</i>) (solo in serra) (14)	Soglia: presenza di adulti nelle trappole o in alternativa di ovodeposizioni o fori larvali.	(1) Piretroidi : al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Indoxacarb : al max 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (4) Spinosad : al max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (8) Metaflumizone : al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (9) Emamectina : al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, 3 in presenza di <i>Tuta</i> . (14) Feromone per la lotta con il metodo della confusione sessuale.
Nottue fogliari (<i>Plusia gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Agrotis</i> spp. <i>Spodoptera</i> spp., etc..)	1	Spinetoram (Spinosine) (4) Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (1) Indoxacarb (3) Metaflumizone (8) Emamectina (9) Clorantraniliprole (Diamidi)(10) Metoxifenozone (Diacilidrazine) (11) Etofenprox (Piretroide) (1) Tebufenozide (Diacilidrazine) (11) (solo in serra) <i>Azadiractina</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>SpliNPV</i> <i>Spinosad</i> (Spinosine) (4)	Soglia: presenza generalizzata	(1) Piretroidi : al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Indoxacarb : al max 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (8) Metaflumizone : al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (9) Emamectina : al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, 3 in presenza di <i>Tuta</i> . (10) Clorantraniliprole (Diamidi) : al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Diacilidrazine (Metoxifenozone, Tebufenozide) : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide verde della patata (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio minerale</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (5) Pirimicarb (6) Spirotetramat (4) Sulfoxaflor (12) <i>Maltodestrina</i> Flupyradifurone (13)	Soglia: presenza generalizzata	(5) Neonicotinoidi : al max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (4) Spirotetramat : al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (6) Pirimicarb : al max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (12) Sulfoxaflor : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Flupyradifurone : max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra.

Segue SCHEDA DIFESA N°4 – PEPPERONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Sali di potassio degli acidi grassi</i> <i>Spinosad (Spinosine) (4)</i> <i>Azadiractina</i> Acrinatrina (Piretroidi) (1) Spinetoram (Spinosine) (4) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra)	Soglia: inizio infestazione	(4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (1) Piretroidi: al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci</i>)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus (Solo serra)</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Maltodestrina</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (5) Thiacloprid (Neonicotinoidi) (5) Pyriproxyfen (7) Spirotetramat (solo serra) (4) Spiromesifen (solo serra) (10) Sulfoxaflo (12) (pieno campo e serra) Flupyradifurone (13) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra)	Soglia: 10 stadi giovanili/foglia	(5) Neonicotinoidi: al max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (7) Pyriproxyfen: al max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (4) Spirotetramat: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (10) Spiromesifen: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (12) Sulfoxaflo: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Tignola del pomodoro (<i>Tuta absoluta</i>)	3	Metaflumizone (8) Emamectina (9) <i>Spinosad (Spinosine) (4)</i> Indoxacarb (3) Etofenprox (Piretroide) (1) Tebufenozide (Diacilidrazine) (11) (solo in serra) Spinetoram (Spinosine) (4) <i>Azadiractina</i> <i>Confusione sessuale (solo serra)</i>	Soglia: Presenza accertata. Raccomandato l'uso delle reti antinsetto (solo in serra)	(8) Metaflumizone: al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (9) Emamectina: al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, 3 in presenza di <i>Tuta</i> . (3) Indoxacarb: al max 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (1) Piretroidi: al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Diacilidrazine (Metoxifenozone, Tebufenozone): complessivamente max massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°4 – PEPERONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	1 (solo interventi localizzati sulla fila)	Deltametrina (Piretroide) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroide) (1) Lambdacialotrina (solo formulati granulari)	Soglia: Presenza accertata.	(1) Piretroidi: al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. L'uso dei Piretroidi come geodisindestanti è indipendente dalle altre limitazioni previste per i piretroidi utilizzati contro altre avversità.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus spp.</i>)	1 in pieno campo 2 in serra	Spiromesifen (solo serra) (10) Exitiazox Tebufenpirad (1) Fenpiroximate (solo serra) (2) Bifenazate Abamectina Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio minerale</i>	Soglia: Presenza accertata di infestazione con foglie decolorate.	(1) Tebufenpirad: al max 1 intervento all'anno (2) Fenpiroximate: al max 1 intervento all'anno (10) Spiromesifen: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (14) Pyridaben: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°4 – PEPPERONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Moria delle piantine (<i>Pythium spp.</i>) Patogeni tellurici <i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>	1	Metam Na (2) (3) Metam K (2) (3) Dazomet (2) Flutolanil (17) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (12) <i>Tricoderma asperellum</i>		<u>(2) Metam Na, Metam K, Dazomet:</u> utilizzo ammesso solo in serra per la disinfezione del terreno in assenza di coltura. Nell'intervento con Metam Na o Metam K la dose max è di 1000 litri/ettaro/anno. Il loro uso è alternativo all'impiego di Fenamifos, Oxamyl. Dazomet una volta ogni 3 anni <u>(3) Metam Na, Metam K:</u> impiegabili solo una volta ogni 3 anni <u>(12) Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11):</u> max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia contro tutti i patogeni tellurici. <u>(17) Flutolanil:</u> contro Rhizoctonia e altri patogeni basidiomiceti; max 1 intervento all'anno in immediato post-trapianto utilizzando l'irrigazione a goccia.
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	-	Fenamifos (1) Oxamyl (1) Fluopyram (2) (solo pieno campo) Abamectina (14) Solarizzazione Pannelli di semi di brassica Vapore d'acqua <i>Paecilomyces lilacinus</i> Estratto d'aglio		<u>(1) Utilizzo ammesso solo in serra.</u> Nell'arco di un'anno può essere utilizzato solo uno di questi prodotti in alternativa fra di loro. Il loro uso è alternativo alla disinfezione del terreno con Dazomet, Metam Na, Metam K. <u>Oxamyl:</u> max 30 litri/ettaro di formulato commerciale per ciclo. <u>(2) Fluopyram:</u> max 2 interventi anno. <u>(14) Abamectina:</u> solo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette.

SCHEDE DISERBO N°4 – PEPPERONE

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1)	30,4 (360 g/l)	
PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Aclonifen (2)		
POST - TRAPIANTO	Graminacee e Dicotiledoni	1	Clomazone		
	Graminacee	1	Fenoxaprop-P-ethyl Cycloxydim		

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEDA DIFESA N°5 – MELANZANA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	<i>Tricoderma harzianum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Pythium oligandrum</i> M1 (14) <i>Cerevisane</i> (solo serra) <i>Aureobasidium pullulans</i> Fenhexamid (15) Ciprodinil (Anilinopirimidine) (2)+Fludioxonil Fenpyrazamine (15) Penthiopirad (SDHI) (3) Pyrimetanil (Anilinopirimidine) (2)		(15) Fenhexamid, Fenpyrazamine: max 2 interventi complessivi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Anilinopirimidine max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) SDHI: max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Pythium oligandrum M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra.
Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	2	Ametoctradina (16) (solo in serra)		(16)Ametoctradina: max 2 trattamenti all'anno
Tracheoverticillosi (<i>Verticillium spp</i>)		<i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Tricoderma viride</i>		
Marciumi basali (<i>Sclerotinia spp., Phoma lycopersici</i>)	1	Penthiopirad (SDHI) (3) <i>Pythium oligandrum</i> M1 (14) (15) <i>Prodotti rameici</i> <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Tricoderma viride</i>		(3) SDHI: max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Pythium oligandrum M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra . (15) solo contro Sclerotinia spp.

Segue SCHEDA DIFESA N°5 – MELANZANA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)	2	<i>Zolfo</i> <i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> Azoxystrobin (Strobilurine) (1) Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) +Boscalid (SDHI) (14) Cyflufenamid (2) Azoxystrobin (Strobilurine) (1) +Difeconazolo (IBE) (CS) (4) Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) +Dimetomorf Metrafenone (3) (COS+OGA) (5) Tetraconazolo (IBE) (2) Flutriafol (IBE) (4)		(1) Strobilurine : max 2 trattamenti per anno indipendentemente avversità (2) Cyflufenamid : max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (4) IBE : max 2 trattamenti per ciclo colturale, di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione). (3) Metrafenone : max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (5) (COS+OGA) : max 5 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (14) SDHI (Boscalid) : complessivamente max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.
Marciume pedale (<i>Phytophthora capsici</i>)	2	Propamocarb Propamocarb + Fosetil Al (15) <i>Prodotti rameici</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asperellum Trichoderma gamsii</i>		(15) Propamocarb + Fosetil Al : da applicare con irrigazioni localizzate
Patogeni tellurici: <i>Pythium spp.</i> <i>Phytophthora spp.</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>		<i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (13) <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1		(13) Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11) : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia .
VIROSI (<i>CMV, AMV, TSWV</i>)				
PARASSITI ANIMALI				
Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	2	Azadiractina Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Metaflumizone (7) Deltametrina (Piretroidi) (4) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (4)	Soglia: Presenza di giovani larve.	(2) Neonicotinoidi : massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Metaflumizone : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Piretroidi : complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina.

Segue SCHEDE DIFESA N°5 – MELANZANA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afidone verde della patata (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	2	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Pirimicarb (3) Spirotetramat (5) Sulfoxaflor (13) (pieno campo e serra) <i>Maltodestrina</i> Flupyradifurone (14)	Soglia. In pieno campo più del 50% di piante con colonie di <i>Aphis gossypii</i> e più del 10% di piante infestate da altri afidi. In serra ai primi focolai di infestazione	(3) Pirimicarb: al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi: massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Spirotetramat: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (13) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra.
Aleurodidi (<i>T. vaporiorum</i> , <i>B. tabaci</i>)	2	Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Thiacloprid (Neonicotinoide) (2) Pyriproxyfen (6) Spirotetramat (solo serra) (5) Spiromesifen (solo serra) (10) Sulfoxaflor (13) Flupyradifurone (14) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra) <i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Paecilomyces funosorozeus</i> <i>Maltodestrina</i>	Soglia: 5- 10 stadi giovanili vitali/ foglia.	(2) Neonicotinoidi: massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Pyriproxyfen: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Spirotetramat: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (10) Spiromesifen: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (13) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	1 (solo interventi localizzati sulla fila)	Deltametrina (Piretroidi) (4) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (4) Cipermetrina (Piretroidi) (4)		(4) Piretroidi: complessivamente al max 3 un interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina.

Segue SCHEDE DIFESA N°5 – MELANZANA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Heliothis armigera</i>)	1	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>SpliNPV</i> Indoxacarb (8) <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (6) Metaflumizone (7) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (4) Emamectina (9) Clorantniliprole (Diamidi)(3) Metoxifenozone (11) Deltametrina (Piretroidi) (4) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (6)	Soglia: presenza accertata	(6) <u>Spinosine (<i>Spinosad</i>, <i>Spinetoram</i>)</u> al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con <i>Spinetoram</i> . (7) <u>Metaflumizone</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) <u>Piretroidi</u> : complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina. (8) <u>Indoxacarb</u> max 4 interventi all'anno indipendentemente avversità (9) <u>Emamectina</u> max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità, 3 in presenza di <i>Tuta</i> . (3) <u>Clorantniliprole (Diamidi)</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (11) <u>Metoxifenozone</u> : massimo 2 interventi l'anno in serra e 1 in pieno campo indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	2	Acrinatrina (Piretroidi) (4) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (4) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (6) Formetanate (8) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra) <i>Beauveria bassiana</i> <i>Spinosad</i> (6) <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i>	Soglia: presenza accertata	(5) <u>Spinosine (<i>Spinosad</i>, <i>Spinetoram</i>)</u> al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con <i>Spinetoram</i> . (8) <u>Formetanate</u> : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (4) <u>Piretroidi</u> : al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina e max 2 interventi con Tau-Fluvalinate. (17) <u>Terpenoid blend QRD 460</u> : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) <u>Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl</u> : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Tignola del pomodoro (<i>Tuta absoluta</i>)	3	<i>Spinosad</i> (6) <i>Azadiractina</i> <i>Confusione sessuale</i> in coltura protetta Indoxacarb (8) Metaflumizone (7) Emamectina (9) Etofenprox (Piretroidi) (4) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (6)	Soglia: presenza fitofago Raccomandato l'uso di reti antinsetto in coltura protetta	(6) <u>Spinosine (<i>Spinosad</i>, <i>Spinetoram</i>)</u> al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con <i>Spinetoram</i> . (8) <u>Indoxacarb</u> max 4 interventi all'anno indipendentemente avversità (7) <u>Metaflumizone</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (9) <u>Emamectina</u> max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità, 3 in presenza di <i>Tuta</i> . (4) <u>Piretroidi</u> : complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra i quali max 1 intervento tra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina, Zeta-cipermetrina.

Segue SCHEDA DIFESA N°5 – MELANZANA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ragno rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	2	<i>Olio minerale</i> Spiromesifen (solo serra) (10) Exitiazox Tebufenpirad (12) Fenpyroximate (solo in pieno campo) Abamectina Etoxazole (11) Bifenazate Pyridaben (solo serra) Acequinocyl Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) <i>Sali potassici di acidi grassi</i>	Soglia. Presenza di focolai d'infestazione con foglie decolorate.	(10) Spiromesifen: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (11) Etoxazole: al max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (12) Tebufenpirad: al max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Tarsonemide (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)		Zolfo		

Segue SCHEDA DIFESA N°5 – MELANZANA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Liriomiza (<i>Liriomyza spp</i>)	1	Ciromazina (solo serra) Azadiractina Spinosad (6) Acetamiprid (Neonicotinoide) (2)	<i>Presenza delle prime mine, punture di nutrizione e/o ovodeposizioni.</i>	(6) Spinosad al max 3 volte l'anno indipendentemente dall'avversità (2) Neonicotinoidi: massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Patogeni tellurici (<i>Fusarium spp.</i>) Sclerotinia (<i>Sclerotinia spp.</i>) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1	Metam Na (2) (3) Metam K (2) (3) Dazomet (2) <i>Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride</i>		(2) Metam Na, Metam K, Dazomet: utilizzo ammesso solo in serra per la disinfezione del terreno in assenza di coltura. Nell'intervento con Metam Na o Metam K la dose max è di 1000 litri/ettaro/anno. Dazomet una volta ogni 3 anni e da impiegare a dosi ridotte (40-50 g/metro quadrato). (3) Metam Na, Metam K: impiegabili solo una volta ogni 3 anni
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	1	Fenamifos (1) (solo serra) Oxamyl (1) Foxthiazate (1) Fluopyram (2) (solo in serra) Abamectina (16) <i>Solarizzazione</i> <i>Pannelli di semi di brassica</i> <i>Vapore d'acqua</i> <i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>		(1) Utilizzo ammesso solo in serra. Nell'arco di un'anno può essere utilizzato solo uno di questi prodotti in alternativa fra di loro. (2) Fluopyram: al max 2 interventi anno, solo serra. (16) Abamectina: solo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette.

SCHEDA DISERBO N°5 – MELANZANA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Napropamide Acido pelargonico *		
POST - TRAPIANTO	Graminacee	1	Cicloxidim Quizalofop P Etile Propaquizafop Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare a pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°6 – MELONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	5	<i>Prodotti rameici</i> Phosetil-Al Propamocarb Metalaxil-M (1) Cymoxanil (2) Dimetomorf (CAA) (4) Mandipropamide (CAA) (4) Azoxystrobin (QOI) (3) Famoxadone (QOI) (3) Cyazofamid (6) Pyraclostrobin (QOI) (3)+ Dimetomorf(CAA) (4) Ametoctradina (10) + Dimetomorf (CAA) (4) (solo pieno campo) Ametoctradina (10)+Metiram (Ditiocarbammati) (7) Metiram (Ditiocarbammati) (7) Flupicolide+Propamocarb (8) Zoxamide + Dimetomorf (CAA) (4) Ametoctradina (15) (solo pieno campo)		(1) Metalaxil-M: ammesso 2 volte per anno. (2) Cymoxanil: max 2 interventi per ciclo colturale. (3) QOI: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 Famoxadone. (4) CAA (Dimetomorf, Mandipropamide): al max 2 volte all'anno. (6) Cyazofamid: al max 2 volte all'anno. (7) Ditiocarbammati: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Ametoctradina: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) Flupicolide+Propamocarb: al max 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) IBE: al max 3 interventi all'anno di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione). (15) Ametoctradina: max 2 interventi all'anno.
Mal bianco (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	3	<i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Cerevisane</i> <i>Bacillus pumilis</i> Bupirimate (13) Azoxystrobin (QOI Strobilurine) (3) Trifloxystrobin (QOI Strobilurine) (3) Fenbuconazolo (IBE) (4) Myclobutanil (IBE) (CS) (4) Penconazolo (IBE) (4) Tetraconazolo (IBE) (4) Tebuconazolo (IBE) (CS) (4) Meptyldinocap (6) Cyflufenamid (1) Metrafenone (2) (COS+OGA) (9) Cyflufenamid (1) + Difenconazolo (IBE) (CS) (4)		(3) QOI, STROBILURINE: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) IBE: al max 3 interventi all'anno di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione) (6) Meptyldinocap al max 2 interventi all'anno (1) Cyflufenamid: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (2) Metrafenone: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (9) (COS+OGA): max 5 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (13) Bupirimate: max 2 interventi all'anno (14) SDHI (Fluopyram, Fluxapyroxad, Isopyram): max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°6 – MELONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cancro gommoso (<i>Didymella bryoniae</i>)	1	Azoxystrobin (QOI Strobilurine) (3) Fluxapiraxad (SDHI) (14) + Difenconazolo (IBE) (CS) (4) Cyflufenamid (1) + Difenconazolo (IBE) (CS) (4)		(3) QOI, STROBILURINE : al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) SDHI (Fluopyram, Fluxapyroxad, Isopyram) : max 2 interventi indipendentemente dall'avversità. (4) IBE : al max 3 interventi all'anno di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione) (1) Cyflufenamid : max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità
Sclerotinia (<i>Sclerotinia spp.</i>)		<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma viride</i>		
Patogeni tellurici : <i>Pythium spp.</i> <i>Phytophthora spp.</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>		<i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (12)		(12) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia .
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Erwinia spp.</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°6 – MELONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide del ramno (<i>Aphis nasturtii</i>) Afide nero della fava (<i>Aphis fabae</i>)	2	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Azadiractina Tau-fluvalinate (2) Acetamiprid (Neonicotinoide) (3) Flonicamid (10) Spirotetramat (5) Sulfoxaflor (12) (in pieno campo e serra) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: 50% delle piante con colonie	(2) Fluvalinate: al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Neonicotinoidi: massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (12) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Aleurodide delle serre (<i>Trialeurodes vaporarium</i>) Aleurodide del tabacco (<i>Bemisia tabaci</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (Solo serra) <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Maltodestrina</i> Thiacloprid (Neonicotinoide) (3) Acetamiprid (Neonicotinoide) (3) Flonicamid (10) Spirotetramat (solo serra) (5) Spyromesifen (11) (solo serra) Sulfoxaflor (12) (in pieno campo e serra) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra)	Soglia: presenza di 10 stadi giovanili per foglia.	(3) Neonicotinoidi: massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (11) Spyromesifen: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (12) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	1	<i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (5) <i>Azadiractina</i> Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (5) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra)	Soglia: Presenza accertata	(5) Spinosad: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Minatori fogliari (<i>Liriomyza spp.</i>)	1	<i>Spinosad</i> (5) <i>Azadiractina</i> Ciromazina (solo serra) (6)	Soglia: 2-3 mine per foglia.	(5) Spinosad: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Ciromazina: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°6 – MELONE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Bauveria bassiana</i> Tebufenpirad Exitiazox Abamectina Clofentazine Etoxazole Spyromesifen (11) (solo serra) Bifenazate Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra)	Soglia: presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate	(11) Spyromesifen: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Elateridi (<i>Agriotes spp etc...</i>)	1 (localizzato alla semina o al trapianto)	Teflutrin Zeta-cipermetrina granulare Lambdacialotrina (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2)	Soglia: presenza accertata mediante specifici monitoraggi	(2) Piretroidi: al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma, Mamaestra brassicae, etc...</i>)	1	Lambdacialotrina (Piretroidi) (2) Cipermetrina (NO serra) (Piretroidi) (2) Indoxacarb (6) Clorantraniliprole (Diamidi) (7) Emamectina (3) Spinetoram (Spinosine) (5) <i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad (Spinosine) (5)</i>	Soglia: presenza accertata mediante specifici monitoraggi	(2) Piretroidi: al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Indoxacarb: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Clorantraniliprole (Diamidi): al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Emamectina: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Patogeni tellurici (<i>Fusarium spp., ect...</i>)	1	Metam Na (2) (3) Metam K (2) (3) Dazomet (2)		(2) Metam Na, Metam K, Dazomet: utilizzo ammesso solo in serra per la disinfezione del terreno in assenza di coltura. Nell'intervento con Metam Na o Metam K la dose max è di 1000 litri/ettaro/anno. Il loro uso è alternativo all'impiego di Fenamifos, Oxamyl. Dazomet una volta ogni 3 anni (3) Metam Na, Metam K: impiegabili solo una volta ogni 3 anni.
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp</i>)	1	Fenamifos (1) Oxamyl (1) Fluopyram (4) Abamectina (14) <i>Solarizzazione</i> <i>Pannelli di semi di brassica</i> <i>Vapore d'acqua</i> <i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>		(1) Utilizzo ammesso solo in serra. Nell'arco di un'anno può essere utilizzato solo uno di questi prodotti in alternativa fra di loro. Il loro uso è alternativo alla disinfezione del terreno con Dazomet, Metam Na, Metam K. Oxamyl: max 30 litri/ettaro di formulato commerciale per ciclo. Dazomet una volta ogni 3 anni. (4) Fluopyram: al max 2 interventi all'anno tramite irrigazione a goccia con manichetta forata. (14) Abamectina: solo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette.

SCHEDA DISERBO N°6 – MELONE

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE-SEMINA O PRE-TRAPIANTO	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
POST TRAPIANTO O EMERGENZA	Graminacee	1 Interventi ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici.	Quizalofop-p-etile Propaquizafop Quizalofop etile isomero D Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare a pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEMA DIFESA N°7 – COCOMERO

AVVERSITA'	N° TRATT AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	4	<i>Prodotti rameici</i> Phosetil-Al Propamocarb Metalaxil-M (2) Azoxystrobin (Strobilurine) (3) Cyazofamid (4) Ametoctradina (5) +Metiram (Ditiocarbamati) (7) Flupicolide+Propamocarb (8) Metiram (Ditiocarbamati) (7) Cymoxanil (13) Mandipropamid (14) Ametoctradin (15) (solo in pieno campo)		(2) Metalaxil-M: max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (3) QOI: max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità (4) Cyazofamid: max 3 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità (7) Ditiocarbammati: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Ametoctradina: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) Flupicolide+Propamocarb: al max 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Cymoxanil: max 2 interventi all'anno. (14) Mandipropamid (CAA): max 2 interventi all'anno. (15) Ametoctradin: max 3 interventi all'anno.
Mal bianco (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	2	<i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo <i>Cerevisane</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Bacillus pumilis</i> (COS+OGA) (9) Azoxystrobin (Strobilurine) (3) Trifloxystrobin (QOI) (3) Fenbuconazolo (IBE) (4) Tetraconazolo (IBE) (4) Myclobutanil (IBE) (CS) (4) Tebuconazolo (IBE) (CS) (4) Penconazolo (IBE) (4) Bupirimate Meptyldinocap (6) Cyflufenamid (1) Metrafenone (2) Cyflufenamid (1) + Difenconazolo (IBE) (CS) (10)		(3) QOI: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) IBE: al max 2 interventi all'anno di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione). (6) Meptyldinocap al max 2 interventi all'anno (1) Cyflufenamid: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (2) Metrafenone: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (9) (COS+OGA): max 5 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (10) Fluxapiroxad (SDH I) + Difenconazolo (IBE) (CS): max 1 intervento all'anno con Difenconazolo indipendentemente dall'avversità.
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum.</i>)	1	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma harzianum</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°7 – COCOMERO

AVVERSITA'	N° TRATT AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cancro gommoso (<i>Didymella bryoniae</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Azoxistrobin (QOI) (3) Fluxapiroxad (SDHI) + Difenconazolo (IBE) (CS) (10) (solo pieno campo) Cyflufenamid (1) + Difenconazolo (IBE) (CS) (10)		(3) QOI: max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (10) Fluxapiroxad (SDHI) + Difenconazolo (IBE) (CS): max 1 intervento all'anno con Difenconazolo indipendentemente dall'avversità. (1) Cyflufenamid: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.
Patogeni tellurici : <i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>		<i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (13)		(13) Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11): max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia .
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Erwinia</i> spp.)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	1 (localizzato alla semina o al trapianto)	Teflutrin (Piretroidi) Lambdacialotrina (Piretroidi) (1)	Soglia: presenza accertata delle larve.	(1) Piretroidi: al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide del ramno (<i>Aphis nasturtii</i>) Afide nero della fava (<i>Aphis fabae</i>)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Imidacloprid (Neonicotinoide) (2) (solo serra) Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Flonicamid (10) Spirotetramat (solo pieno campo) (5) Sulfoxaflor (13) <i>Maltodestrina</i> Flupyradifurone (15)	Soglia. Comparsa delle prime forme alate o colonie iniziali	(1) Piretroidi: al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi: massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (13) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (15) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°7 – COCOMERO

AVVERSITA'	N° TRATT AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	2	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Tebufenpirad (11) Exitiazox Abamectina Etoxazole (12) Spyromesifen (Solo serra) Bifenazate Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra)	Soglia. Presenza di focolai d'infestazione con inizio decolorazione foglie.	(11) Tebufenpyrad: al max 1 intervento all'anno. (12) Etoxazole: al max 1 intervento all'anno. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	1	Flupyradifurone (15) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) <u>Cyantraniliprole (Diamide)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra)</u>	Interventi chimici : - Infestazioni diffuse ed insufficiente presenza di predatori (Miridi) e parassitoidi (<i>Encarsia</i> spp. e <i>Eretmocerus</i> spp.) - Nei singoli appezzamenti gli interventi sono ammessi solo ad anni alterni	(15) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra indipendentemente dall'avversità. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , etc...)	1	Indoxacarb (3) Clorraniliprole (Diamidi) (4) Cipermetrina (Piretroidi) (1) Emamectina (6) Spinetoram (Spinosine) (16)	Soglia: presenza accertata mediante specifici monitoraggi	(3) Indoxacarb: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (4) Clorraniliprole (Diamidi): al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (1) Piretroidi: al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Emamectina: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (16) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.

Segue SCHEDE DIFESA N°7 – COCOMERO

AVVERSITA'	N° TRATT AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Patogeni tellurici (<i>Fusarium spp., ect...</i>)	1	Metam Na (2) (3) Metam K (2) (3) Dazomet (2)		(2) Metam Na, Metam K, Dazomet: utilizzo ammesso solo in serra per la disinfezione del terreno in assenza di coltura. Nell'intervento con Metam Na o Metam K la dose max è di 1000 litri/ettaro/anno. Il loro uso è alternativo all'impiego di Fenamifos, Oxamyl. Dazomet una volta ogni 3 anni (3) Metam Na, Metam K: impiegabili solo una volta ogni 3 anni
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp</i>)	1	Fenamifos (1) Oxamyl (1) Fluopyram (SDHI) (4) <i>Solarizzazione</i> <i>Pannelli di semi di brassica</i> Vapore d'acqua <i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i> Abamectina (12)	Interventi agronomici: - effettuare rotazioni con specie poco sensibili. - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente. - evitare ristagni idrici - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) - utilizzo di ammendanti (2) Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di 0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni. Interventi chimici: Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni In coltura protetta tale indicazione è vincolante	(1) Utilizzo ammesso solo in serra. Nell'arco di un'anno può essere utilizzato solo uno di questi prodotti in alternativa fra di loro. Il loro uso è alternativo alla disinfezione del terreno con Dazomet, Metam Na, Metam K. Oxamyl: max 30 litri/ettaro di formulato commerciale per ciclo. (4) Fluopyram: al max 2 intervento all'anno tramite irrigazione a goccia con manichetta forata. (12) Abamectina : solo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette.

SCHEDA DISERBO N°7 – COCOMERO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
POST - EMERGENZA	GRAMINACEE	1	Propaquizafop		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°8 – ZUCCHINO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE Mal bianco (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	2	<i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo Bicarbonato di Potassio <i>Pythium oligandrum</i> M1 (12) Cerevisane <i>Bacillus pumilis</i> Olio essenziale di arancio dolce Bupirimate Myclobutanil (IBE) (CS) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Fenbuconazolo (IBE) (1) Penconazolo (IBE) (1) Tetraconazolo (IBE) (1) Azoxystrobin (QOI Strobilurine) (2) Trifloxystrobin (QOI Strobilurine) (2) Meptyldinocap (7) Cyflufenamid (3) Metrafenone (4) (COS+OGA) (9) Cyflufenamid (3) + Difenconazolo (IBE) (CS) (1)		(1) IBE: al max 2 interventi all'anno di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione). (2) QOI Strobilurine: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Meptyldinocap: al max 2 interventi all'anno (3) Cyflufenamid: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (4) Metrafenone: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (9) (COS+OGA): max 5 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (12) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra.
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Cimoxanil (4) Propamocarb Azoxystrobin (QOI Strobilurine) (2) Famoxadone (QOI Strobilurine) (solo in serra) (2) Cyazofamid (5) Mandipropamide (CAA) (6) Pyraclostrobin (QOI Strobilurine) (2) + Dimetomorf (CAA) (6) Ametoctradina (10) + Dimetomorf (CAA) (6) Ametoctradina (10) + Metiram (Ditiocarbammati) (7) Metiram (Ditiocarbammati) (7) Zoxamide+Dimetomorf (CAA) (6) Ametoctradina (10) (solo in serra)		(2) QOI: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 Famoxadone. (4) Cimoxanil: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Cyazofamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) CAA (Dimetomorf, Mandipropamide): al max 2 volte all'anno. (10) Ametoctradina: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Ditiocarbammati: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Marciume molle (<i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp</i>)	1	Propamocarb <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Tricoderma viride</i>	Soglia: presenza primi sintomi.	

Segue SCHEDA DIFESA N°8 – ZUCCHINO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2	<i>Pythium oligandrum</i> M1 (12) Fenexamid (IBS Class III)(13) Fenpyrazamine (IBS Class III) (13) (solo in serra) Fludioxonil (solo serra) (14) Ciprodinil + Fludioxonil (14)		(12) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (13) Fenexamid, Fenpyrazamine, (IBS ClasIII) : complessivamente al max 2 interventi all'anno; (14) Fludioxonil, Ciprodinil + Fludioxonil : complessivamente max 1 intervento all'anno
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia</i> spp.)		<i>Pythium oligandrum</i> M1 (12)		(12) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra.
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> .)	4	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Tricoderma asperellum</i> + <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Tricoderma</i> spp		
Patogeni tellurici : <i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>		<i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (11)		(11) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia .
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Erwinia</i> spp.)		Prodotti rameici		
PARASSITI ANIMALI				
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide del ramno (<i>Aphis nasturtii</i>) Afide nero della fava (<i>Aphis fabae</i>)	2	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Flonicamid (10) Spirotetramat (5) Sulfoxaflor (15) Flupyradifurone (14) Cyantraniliprole (Diamide)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra)	Soglia. Presenza delle prime forme alate o delle colonie iniziali.	(1) Piretroidi : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi : massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid : al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spirotetramat : al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (13) Sulfoxaflor : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Flupyradifurone : max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clortraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°8 – ZUCCHINO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Aleurodide delle serre (<i>Trialeurodes vaporarum</i>) Aleurodide del tabacco (<i>Bemisia tabaci</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Pyriproxyfen (4) Flonicamid (10) Spirotetramat (solo serra) (5) Spiromesifen (solo serra) (10) Azadiractina Beauveria bassiana Paecilomyces fumosoroseus (Solo serra) Olio essenziale di arancio dolce Sali potassici degli acidi grassi Maltodestrina Sulfoxaflor (13) Flupyradifurone (14) Cyantraniliprole (Diamide)+ Acibenzolar-S-methyl (18) (solo serra) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra)	Soglia: presenza	(2) Neonicotinoidi: massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Pyriproxyfen: massimo un intervento all'anno e solo in coltura protetta. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (10) Spiromesifen: al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (13) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra. (17) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (18) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°8 – ZUCCHINO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	2	Spiromesifen (solo serra) (10) Fenproxiimate (14) (solo in serra) Exitiazox Bifenazate Abamectina Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra) <i>Bauveria bassiana</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i>	Soglia. Presenza di focolai d'infestazione con inizio decolorazione foglie.	<u>(10) Spiromesifen</u> : al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. <u>(14) Fenproxiimate</u> : max 1 intervento all'anno. <u>(17) Terpenoid blend QRD 460</u> : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (6) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (6) Acrinatrina (<i>Piretroidi</i>) (1) (solo in serra) Cyantranilprole (<i>Diamidi</i>)+ <i>Acibenzolar-S-methyl</i> (18) (solo serra) Terpenoid blend QRD 460 (17) (solo serra)	Soglia: presenza	<u>(6) Spinosine (Spinosad, Spinetoram)</u> : massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. <u>(1) Piretroidi</u> : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. <u>(17) Terpenoid blend QRD 460</u> : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. <u>(18) Cyantranilprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl</u> : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantranilprole e Clorantilanilprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Patogeni tellurici (<i>Fusarium spp., ect...</i>)	1	Metam Na (2) (3) Metam K (2) (3) Dazomet (2)		<u>(2) Metam Na, Metam K, Dazomet</u> : utilizzo ammesso solo in serra per la disinfezione del terreno in assenza di coltura. Nell'intervento con Metam Na o Metam K la dose max è di 1000 litri/ettaro/anno. Il loro uso è alternativo all'impiego di Fenamifos, Oxamyl. Dazomet una volta ogni 3 anni <u>(3) Metam Na, Metam K</u> : impiegabili solo una volta ogni 3 anni
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma, Eliotis armigera, ect.</i>)	1	Clorantilanilprole (<i>Diamidi</i>) (3) (18) Emamectina (7) Indoxacarb (8) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (6) <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (6)		<u>(3) Clorantilanilprole (Diamidi)</u> : max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. <u>(7) Emamectina</u> : max 2 per ciclo colturale indipendentemente avversità <u>(8) Indoxcarb</u> : max 3 per anno indipendentemente avversità <u>(6) Spinosine (Spinosad, Spinetoram)</u> : massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp</i>)	1	Fenamifos (1) Oxamyl (1) Fluopyram (SDHI) (4) Abamectina (solo serra) (14) <i>Solarizzazione</i> <i>Pannelli di semi di brassica</i> <i>Vapore d'acqua</i> <i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio (in serra e in pieno campo)</i>		<u>(1) Utilizzo ammesso solo in serra. Nell'arco di un'anno può essere utilizzato solo uno di questi prodotti in alternativa fra di loro. Oxamyl</u> : max 20 litri/ettaro di formulato commerciale per ciclo. <u>(4) Fluopyram</u> : max 2 interventi anno tramite irrigazione a goccia con manichetta forata. <u>(14) Abamectina</u> : solo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette.

SCHEDA DISERBO N°8 – ZUCCHINO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% DI P.A.	L. O KG / HA
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Clomazone Acido pelargonico *		
PRE-TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Clomazone Acido pelargonico *		
POST-TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Clomazone Acido pelargonico *		
POST EMERGENZA	Graminacee	1	Quizalofop etile isomero D Quizalofop-p-etile Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°9 - ZUCCA

AVVERSAITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Cyazofamid (3) Flupicolide+Propamocarb (4) Metiram (Ditiocarbammati) (5) Cymoxanil (9) Dimetomorf Mandipropamid (CAA) (10) Ametoctradina (11) (solo pieno campo)		(3) Cyazofamid: max 3 trattamenti anno, indipendentemente avversità (4) Flupicolide+Propamocarb: al max 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (1) QOI: max 2 trattamenti anno, indipendentemente avversità (5) Ditiocarbammati: max 3 trattamenti anno, indipendentemente avversità (9) Cymoxanil: max 2 interventi all'anno. (10) Mandipropamid (CAA): max 1 intervento all'anno. (11) Ametoctradina: max 2 trattamenti all'anno.
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	3	<i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Cerevisiane</i> <i>Bacillus pumilis</i> Azoxystrobin (QOI, Strobilurine) (1) Penconazolo (IBE) (2) Tebuconazolo (IBE) (CS) (2) Miclobutanil (IBE) (CS) (2) Bupirimate (8) Cyflufenamid (3) Tryfloxystrobin (QOI) (1)+Tebuconazolo (IBE) (CS) (2) (COS+OGA) (6)		(1) QOI, Strobilurine: max 2 trattamenti anno, indipendentemente avversità (2) IBE: max 2 trattamenti anno, indipendentemente avversità, di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione). (3) Cyflufenamid: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (6) (COS+OGA): max 5 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (8) Bupirimate: al max 2 interventi. all'anno
Moria delle piantina (<i>Pythium spp.</i>)	1	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS Plantarum 747		
Patogeni tellurici : <i>Pythium spp.</i> <i>Phytophthora spp.</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>		<i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (7)		(7) <u>Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11):</u> max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia .
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas syringae pv. Lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora subsp. Carotovora</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°9 – ZUCCA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide del ramno (<i>Aphis nasturtii</i>) Afide nero della fava (<i>Aphis fabae</i>)	2	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina (solo in serra)</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> Flonicamid (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Sulfoxaflor (10)		(1) Flonicamid: max 1 per ciclo colturale indipendentemente avversità (2) Neonicotinoidi: max 1 per ciclo colturale indipendentemente avversità (10) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Eliotis armigera</i> , ecc..)	1	<i>Azadiractina (solo in serra)</i> Clorantraniliprole (3) Indoxacarb (4) Emamectina (5) Spinetoram (Spinosine) (13)		(3) Clorantraniliprole: max 2 per ciclo colturale indipendentemente avversità (4) Indoxacarb: max 3 per ciclo colturale indipendentemente avversità (5) Emamectina: max 2 per ciclo colturale indipendentemente avversità (11) Etofenprox (Piretroidi): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Aleurodide delle serre (<i>Trialetodes vaporarium</i>) Aleurodide del tabacco (<i>Bemisia tabaci</i>)	1	<i>Azadiractina (solo in serra)</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> Sulfoxaflor (10)		(10) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Tripidi, Minatori fogliari		<i>Azadiractina (solo in serra)</i> Spinetoram (Spinosine) (13)		(13) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	2	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Clofentezine (9) Etozazole Exitiazox Spyromesifen (solo serra) Bifenazate Abamectina		(9) Clofentezine: max 1 intervento all'anno

Segue SCHEDA DIFESA N°9 – ZUCCA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nematodi galligeni	1	<i>Estratto d'aglio</i> <i>Paecilomyces lilacinus</i> 251 Clorantraniliprole (3) Indoxacarb (4) Emamectina (5) Fluopyram (SDHI) (12)		(3) Clorantraniliprole: max 2 per ciclo colturale indipendentemente avversità (4) Indoxacarb: max 3 per ciclo colturale indipendentemente avversità (5) Emamectina: max 2 per ciclo colturale indipendentemente avversità (12) Fluopyram (SDHI): max 2 interventi all'anno tramite irrigazione a goccia con manichetta forata.

SCHEDA DISERBO N°9 – ZUCCA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Graminacee e Dicotiledoni	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
POST - EMERGENZA	GRAMINACEE	1	Propaquizafop		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°10 – CETRIOLO

AVVERSA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	3	<i>Prodotti rameici</i> <i>Cerevisane</i> (solo serra) Azoxystrobin (QOI) (1) Famoxadone (QOI) (1) + Cimoxanil (11) Propamocarb Phosetil-Al Cyazofamid (3) Flupicolide (4) Pyraclostrobin (QOI) (1) + Dimetomorf (CAA) Ametoctradina (10) + Dimetomorf (CAA) (5) Ametoctradina (10) + Metiram (Ditiocarbammati) (7) Metiram (Ditiocarbammati) (7) Zoxamide+Dimetomorf (8) Cymoxanil Metalaxil-M (15) Ametoctradin (16) (solo in serra)		(1) QOI, S TROBILURINE: al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 Famoxadone. (3) Cyazofamid: al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Flupicolide: al max 1 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (5) CAA: al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Ametoctradina: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Ditiocarbammati: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) Zoxamide+Dimetomorf: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Famoxadone + Cymoxanil: autorizzato solo in serra (15) Metalaxil-M: max 2 interventi all'anno. (16) Ametoctradin: max 3 interventi all'anno.
Mal bianco (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>sphaerotheca fuliginea</i>)	2	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di Potassio</i> <i>Pythium oligandrum M1</i> (9) <i>Cerevisane</i> (solo serra) <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Bacillus pumilis</i> Difeconazolo (IBE) (CS) (2) Fenbuconazolo (IBE) (2) Myclobutanil (IBE) (CS) (2) Penconazolo (IBE) (2) Tebuconazolo (IBE) (CS) (2) Tetraconazolo (IBE) (2) Azoxystrobin (QOI) (1) Trifloxystrobin (QOI) (1) Bupirimate Meptyldinocap (5) Cyflufenamid (3) Metrafenone (4) (COS+OGA) (6)		(1) QOI al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (2) IBE al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con CS (Candidati sostituzione). (5) Meptyldinocap: al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Cyflufenamid: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (4) Metrafenone: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (6) (COS+OGA): max 5 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (9) Pythium oligandrum M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra.

Segue SCHEDA DIFESA N°10 – CETRIOLO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Tricoderma viride</i> <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma gamsii</i> Penthiopirad		
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2	<i>Pythium oligandrum</i> M1 (9) Bacillus subtilis (solo in serra) Fenexamid (10) Fenpyrazamine (10) Fludioxonil (14) Ciprodinil + Fludioxonil (14)		(9) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (10) Fenexamid, Fenpyrazamine : complessivamente al max 2 interventi. (14) Fludioxonil, Ciprodinil + Fludioxonil : complessivamente max 1 intervento all'anno.
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia</i> spp.)		<i>Pythium oligandrum</i> M1 (9)		(9) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra.
Patogeni tellurici : <i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>		<i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (7)		(7) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia.
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Erwinia</i> spp.)		Prodotti rameici		
VIROSI (CMV , ZYMV , WMV ₂)				

Segue SCHEDA DIFESA N°10 – CETRIOLO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide del ramno (<i>Aphis nasturtii</i>) Afide nero della fava (<i>Aphis fabae</i>)	2	Tau-fluvalinate (solo pieno campo) (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (11) Lambdacialotrina (Piretroidi) (11) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (11) Betacyflutrin (Piretroidi) (11) Acetamiprid (solo serra) (Neonicotinoidi) (3) Flonicamid (10) Spirotetramat (5) Sulfoxaflor (13) <i>Maltodestrina</i> Flupyradifurone (14) Deltametrina (11) <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Chrisoperla carnea</i> <i>Lysiphlebus testaceipes</i> (da preferire per lanci nel periodo estivo<9 <i>Aphydius colemani</i> (da preferire per lanci nel periodo primaverile)	Soglia: presenza di focolai di infestazione	(11) Piretroidi al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 con Deltametrina, max 1 con Lambdacialotrina e max 1 fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (3) Neonicotinoidi al max 1 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (13) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra indipendentemente dall'avversità.
Aleurodide delle serre (<i>Trialeurodes vaporarium</i>) Aleurodide del tabacco (<i>Bemisia tabaci</i>)	3	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> Acetamiprid (solo serra) (Neonicotinoide) (3) Pyriproxyfen (solo serra) Flonicamid (10) Deltametrina (Piretroidi) (11) Beta-cyflutrin (Piretroidi) (11) Spirotetramat (solo serra) (5) Spiromesifen (solo serra) (6) Sulfoxaflor (13) <i>Maltodestrina</i> Flupyradifurone (14) Terpenoid blend QRD 460 (15) (solo serra) Cyantraniliprole (Diamidi) + Acibenzolar-S-methyl (16) (solo serra)	Soglia: 20 adulti/trappola a settimana (una trappola cromotropica gialla ogni 100mq)	(3) Neonicotinoidi al max 1 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid: al max 2 interventi all'anno non consecutivi indipendentemente dalle avversità. (5) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (6) Spiromesifen: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (13) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Piretroidi al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Lambdacialotrina e max 1 fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (14) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno in pieno campo e max 2 interventi in serra. (15) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (16) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°10 – CETRIOLO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Trips tabaci</i>)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (4) <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Abamectina (2) Acrinatrina (Piretroidi) (11) (solo pieno campo) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (4) Terpenoid blend QRD 460 (15) (solo serra) Cyantraniliprole (<i>Diamidi</i>) + <i>Acibenzolar-S-methyl</i> (16) (solo serra)	Soglia: presenza accertata.	(1) Spinosad : al max 3 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Abamectina al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Piretroidi : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Lambda-cialotrina e max 1 fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (15) Terpenoid blend QRD 460 : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (16) Cyantraniliprole (Diamidi)+ Acibenzolar-S-methyl : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, complessivamente fra Cyantraniliprole e Clorantilaniliprole max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	1	<i>Estratto d'aglio</i> <i>Paecilomices lilacinus</i> Abamectina (12)		(12) Abamectina : solo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Exitiazox Fenpiroximate Bifenazate Pyridaben (solo serra) Spiromesifen (solo serra) (6) Abamectina (2) Clofentezine Terpenoid blend QRD 460 (15) (solo serra)	Soglia: presenza accertata.	(6) Spiromesifen : al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (2) Abamectina al max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (15) Terpenoid blend QRD 460 : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)		Teflutrin (Piretroidi) Cipermetrina (Piretroidi) L'uso di questi prodotti come geodisinfestanti non incide sul numero massimo dei trattamenti.	Soglia: In caso di presenza accertata di larve o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente intervenire in modo localizzato. Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila, per modificare le condizioni igrometriche e per favorire l'approfondimento delle larve nel terreno.	
Limacce e Lumache (<i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Arion</i> spp.)	Esche avvelenate	Metaldaide esca	Soglia: presenza accertata.	

Segue SCHEDA DIFESA N°10 – CETRIOLO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , ect.)	1	Lambda-cialotrina (solo pieno campo) (Piretroidi) (11) Beta-cyflutrin (Piretroidi) (11) Indoxacarb (4) Clorantraniliprole (Diamidi) (3) Emamectina (7) Spinetoram (Spinosine) (4) <i>Bacillus thuringensis</i>	Soglia: presenza accertata.	(11) Piretroidi al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Lambdacialotrina e max 1 fra Cipermetrina , Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina . (4) Indoxacarb al max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Clorantraniliprole (Diamidi) : max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Emamectina al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : massimo 3 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram .
Patogeni tellurici (<i>Fusarium spp.</i> , ect...)	1	Metam Na (2) (3) Metam K (2) (3) Dazomet (2)		(2) Metam Na, Metam K, Dazomet : utilizzo ammesso solo in serra per la disinfezione del terreno in assenza di coltura. Nell'intervento con Metam Na o Metam K la dose max è di 1000 litri/ettaro/anno. Il loro uso è alternativo all'impiego di Fenamifos, Oxamyl . Dazomet una volta ogni 3 anni (3) Metam Na, Metam K : impiegabili solo una volta ogni 3 anni
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp</i>)	-	Fenamifos (1) Oxamyl (1) Fluopyram (4) <i>Solarizzazione</i> <i>Pannelli di semi di brassica</i> <i>Vapore d'acqua</i> <i>Paecilomyces lilacinus</i>		(1) Utilizzo ammesso solo in serra. Nell'arco di un'anno può essere utilizzato solo uno di questi prodotti in alternativa fra di loro. Il loro uso è alternativo alla disinfezione del terreno con Dazomet, Metam Na, Metam K, Oxamyl : max 20 litri/ettaro di formulato commerciale per ciclo. (4) Fluopyram : max 2 interventi anno tramite irrigazione a goccia con manichetta forata.

SCHEDA DISERBO N°10 – CETRIOLO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
POST -EMERGENZA	Graminacee	1 Interventi ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici.	Acido pelargonico * Fluazifop p Butile		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°11 – FAVA

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Ruggine (<i>Uromyces fabae</i>),	1	<i>Prodotti rameici</i> Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina) (solo pieno campo) (2)	Soglia: comparsa dei primi sintomi	(2) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina): max 2 interventi indipendentemente dall'avversità
Botrite (<i>Botrytis fabae</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	1	Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina) (solo pieno campo) (2)		(2) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina): max 2 interventi indipendentemente dall'avversità
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	1	Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina) (solo pieno campo) (2)		(2) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina): max 2 interventi indipendentemente dall'avversità
Antracnosi (<i>Ascochyta fabae</i>), Cercosporiosi (<i>Cercospora zonata</i>)		.		
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Aphis fabae</i>)	1	Pirimicarb Piretrine pure Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1)	Soglia. Presenza di attacchi diffusi.	(1) Neonicotinoidi max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
VIROSI (<i>BBWV</i> , <i>BBTMV</i> , <i>BYMV</i> , <i>BBSV</i>)				

SCHEDA DISERBO N°11 – FAVA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% DI P.A.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30.4 (360 g/L)	
PRE- EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Imazamox Imazamox+Pendimetalin Aclonifen (2) Metribuzin Acido pelargonico *		
POST -EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Imazamox Bentazone Cicloxidim Propaquizafop Quizalofop p Etile Fluazifop p Butile Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEMA DIFESA N°12 – CECE

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI VEGETALI				
Rabbia o antracnosi del cece (<i>Ascochyta rabiei</i>)	1	<i>Prodotti rameic</i> Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina) (solo pieno campo) (2)		(2) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina): max 1 intervento
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Aphis spp.</i>)	1	<i>Piretrine pure</i> Pirimicarb Acetamiprid Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (1) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: presenza di focolai di infestazione	(1) Piretroidi: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue fogliari (<i>Heliothis spp., Spodoptera spp., Helicoverpa armigera, ect..</i>)	2	Emamectina Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (1)	Soglia: presenza di focolai di infestazione	(1) Piretroidi: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

SCHEDA DISERBO N°12 – CECE

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% DI P.A.	L. O KG / HA
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30.4 (360 g/L)	
PRE -EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Pendimetalin Metribuzin Aclonifen (2) Acido pelargonico *		
POST -EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Pyridate ** Acido pelargonico *		
POST- EMERGENZA	Graminacee	1	Ciclossidim Quizalofop-etile Propaquizafop Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

** Controlla solo infestanti dicotiledoni secondo le indicazioni riportate in etichetta

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEDA DIFESA N°13 – LUPINO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N°13 – LUPINO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N°14 – PISELLO (FRESCO, DA INDUSTRIA E PROTEICO)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Pseudoperonospora pisi</i>) Antracnosi (<i>Ascochyta spp</i>)	1	Prodotti rameici Azoxistrobin (Strobilurine) (1) Cimoxanil Boscalid (SDHI) (7) +Piraclostrobin (Strobilurine) (solo pieno campo) Fluxapiroxad (SDHI) + Difenconazolo (IBE) (2) (*) (solo pieno campo)	Soglia. Presenza di attacchi precoci.	(1) Strobilurine : al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (7) SDHI : max 2 interventi indipendentemente dall'avversità. (2) IBE (Penconazolo, Tebuconazolo, Difenconazolo): al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (*) solo contro antracnosi
Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	Fludioxonil (6) (solo pieno campo) Ciprodinil + Fludioxonil (6) (solo pieno campo) (*)		(6) Fludioxonil, Ciprodinil + Fludioxonil : complessivamente max 1 intervento all'anno; (*) ammesso solo su pisello mangiatutto (pisello fresco con baccello o taccola)
Oidio (<i>Erysiphe polygoni</i>)	1	Zolfo Azoxistrobin (Strobilurine) (1) Penconazolo (IBE) (2) Boscalid (SDHI) (7) +Piraclostrobin (Strobilurine) (solo pieno campo) Tebuconazolo (IBE) (2)		(1) Strobilurine : al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (2) IBE (Penconazolo, Tebuconazolo, Difenconazolo): al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) SDHI : max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.
PARASSITI ANIMALI				
Afide verde (<i>Acythosiphon pisum</i>) Afide nero (<i>Aphis fabae</i>)	1	Cipermetrina (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Beta-cyflutrin (Piretroidi) (1) Tau-fluvalinate (solo pieno campo) (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (1) Spirotetramat (solo serra) (3) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (5) <i>Maltodestrina</i>	Soglia. Presenza di colonie diffuse e in accrescimento.	(1) Piretroidi max 2 intreventi all'anno indipendentemente dalle avversità, di cui max 1 Lambdacialotrina. (3) Spirotetramat : max 2 intreventi all'anno indipendentemente dalle avversità (5) Neonicotinoidi : max 1 intreventi all'anno indipendentemente dalle avversità
Mamaestra (<i>Mamestra brassicae</i>)	1	Cipermetrina (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (1) (solo pieno campo) Beta-cyflutrin (Piretroidi) (1) (solo pieno campo) Spinosad (2) Emamectina (4)	Soglia. Presenza di diffuse infestazioni	(1) Piretroidi max 2 intreventi all'anno indipendentemente dalle avversità, di cui max 1 Lambdacialotrina. (2) Spinosad : max 3 trattamento indipendentemente avversità (4) Emamectina max 2 intreventi all'anno indipendentemente dalle avversità
Lumache, Limacce	Trattamenti localizzati con esche avvelenate	Metaldeide.	Soglia. Presenza d'infestazione	

SCHEDA DISERBO N°14 – PISELLO (FRESCO, DA INDUSTRIA E PROTEICO)

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Clomazone Pendimetalin Metribuzin Aclonifen (2) Acido pelargonico *		
POST- EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Bentazone Piridate ** Acido pelargonico *		
	Graminacee e Dicotiledoni	1	Propaquizafop (solo graminacee) Quizalofop-p-etile (solo graminacee) Quizalofop etile isomero D (solo graminacee) Ciclossidim (solo graminacee) Imazamox		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

** Controlla solo infestanti dicotiledoni secondo le indicazioni riportate in etichetta

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEDA DIFESA N°15 – FAGIOLO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Antracnosi <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Ruggine <i>(Uromyces appendiculatus)</i>	2	<i>Prodotti rameici</i> Azoxistrobin (Strobilurine) (6) Boscalid (SDHI) +Piraclostrobin (Strobilurine) (6) (solo pieno campo) (5)		(5) Boscalid (SDHI) +Piraclostrobin (Strobilurine): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Strobilurine: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	1	<i>Prodotti rameici</i> Boscalid (SDHI) +Piraclostrobin (Strobilurine)(6) (solo pieno campo) (5) Ciprodinil + Fludioxonil (solo pieno campo) (7)	solo Su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e piogge frequenti	(5) Boscalid (SDHI) +Piraclostrobin (Strobilurine): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Strobilurine: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Ciprodinil + Fludioxonil: max 1 intervento all'anno; ammesso solo su fagiolo da granella (raccolto secco)
Sclerotinia <i>(Sclerotinia spp.)</i>	1	Boscalid (SDHI) +Piraclostrobin (Strobilurine) (6) (solo pieno campo) (5)		(5) Boscalid (SDHI) +Piraclostrobin (Strobilurine): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Strobilurine: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
BATTERIOSI <i>(Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)</i>		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDE DIFESA N°15 – FAGIOLO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Su Fagiolo sono ammessi massimo 3 insetticidi per ciclo colturale				
Afidi (<i>Aphis fabae</i>)	2	Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Cipermetrina (Piretroide) (1) Beta-cyflutrin (Piretroide) (solo pieno campo) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Spirotetramat (solo serra) (3) <i>Maltodestrina</i>	Soglia. Comparsa delle prime colonie in accrescimento.	(1) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina. (2) Neonicotinoidi max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità. (3) Spirotetramat: max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità
Mosca (<i>Delia platura</i>)	1	Teflutrin (solo pieno campo)	Solo nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti	
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	<i>Maltodestrina</i> <i>Olio minerale</i> Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (solo pieno campo) (1)		(1) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina.
Nottue terricole (<i>Agrotis spp</i>)	1	Beta-ciflutrin (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1)	Soglia. Infestazione diffusa.	(1) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina.
Nottue fogliari (<i>Mamestra spp.</i> , <i>Polia pisi</i> , <i>Autographa gamma</i> , ecc.)	1	<i>Spinosad</i> (3) Emamectina (4) Cipermetrina (Piretroide) (1) Beta-cyflutrin (Piretroide) (solo pieno campo) (1)	Soglia. Presenza accertata.	(3) Spinosad: max 3 interventi anno indipendentemente avversità; solo contro <i>Mamestra spp.</i> (4) Emamectina: max 2 interventi anno indipendentemente avversità; solo contro <i>Autographa gamma</i> . (1) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina.
Tripide (<i>Frankliniella intonsa</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Beta-cyflutrin (Piretroidi) (solo pieno campo) (1)	Soglia. Infestazione generalizzata, intervenire dopo dopo la formazione del baccello	(1) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina.

SCHEDA DISERBO N°15 – FAGIOLO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE- EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Clomazone Pendimetalin (1) s-Metolachlor Acido pelargonico * Aclonifen		
POST- EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Imazamox Piridate Bentazone Acido pelargonico *		
	Graminacee	1	Propaquizafop Cycloxydim Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEMA DIFESA N°16 – FAGIOLINO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Antracnosi (<i>Colletotricum lindemuthianum</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Cyprodinil + Fludioxonil (solo pieno campo) (7)		(7) Fludioxonil, Cyprodinil + Fludioxonil : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Ruggine (<i>Uromyces appendiculatus</i>)	1	Azoxistrobin Boscalid (SDHI) + Piraclostrobin (Strobilurine) (8) <i>Prodotti rameici</i>		(8) Boscalid (SDHI) + Piraclostrobin (Strobilurine): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	Pirymetanil (solo coltura protetta) (1) Fenexamid (solo coltura protetta) (2) Boscalid (SDHI) + Piraclostrobin (Strobilurine) (8) Fludioxonil (solo pieno campo) (9) Ciprodinil + Fludioxonil (solo pieno campo) (9) Fludioxonil (solo pieno campo) (9) <i>Pythium oligandrum</i> M1 (6)		(1) Pirymetanil: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Fenexamid: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (6) <i>Pythium oligandrum</i> M1: max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (8) Boscalid (SDHI) + Piraclostrobin (Strobilurine): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (9) Fludioxonil, Ciprodinil + Fludioxonil: complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	2	<i>Pythium oligandrum</i> M1 (6) Boscalid (SDHI) + Piraclostrobin (Strobilurine) (solo pieno campo) (8) Cyprodinil + Fludioxonil (solo pieno campo) (9)		(6) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (9) Fludioxonil, Ciprodinil + Fludioxonil: complessivamente max 2 interventi all'anno. (8) Boscalid (SDHI) + Piraclostrobin (Strobilurine): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp.)		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDE DIFESA N°16 – FAGIOLINO

PARASSITI ANIMALI			
Afidi (<i>Aphis fabae</i>)	2	Tau-fluvalinate (solo pieno campo) (Piretroide) (1) Deltametrina (Piretroide) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (solo pieno campo) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroide) (1) Cipermetrina (Piretroide) (1) Betacyflutrin (Piretroide) (solo pieno campo) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Spirotetramat (solo serra) (3) <i>Maltodestrina</i>	Soglia. Comparsa delle prime colonie in accrescimento. (1) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (2) Neonicotinoidi max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Spirotetramat: max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	Spiromesifen (solo serra) Abamectina <i>Maltodestrina</i>	Soglia. Attacchi precoci con 2 - 3 forme mobili/foglia.
Tripide (<i>Frankliniella intonsa</i>)	1	Tau-fluvalinate (solo pieno campo) (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Cipermetrina (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (solo Pieno campo) (1) Etofenprox (Piretroidi) (1) Acrinatrina (Piretroidi) (1)	Soglia. Infestazioni generalizzate. (1) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Nottue fogliari (<i>Mamestra spp., Polia pisi, Autographa gamma, Spodoptera spp., Heliothis armigera, ecc.</i>)	1	<i>Spinosad</i> (3) (solo pieno campo) Deltametrina (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Etofenprox (Piretroidi) (1) Cipermetrina (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Emamectina (4) Clorantraniliprole (5)	Soglia. Presenza accertata. (1) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (3) Spinosad: max 3 interventi anno indipendentemente avversità (4) Emamectina: max 2 interventi anno indipendentemente avversità (5) Clorantraniliprole: max 2 interventi per anno indipendentemente avversità

SCHEDE DISERBO N°16 – FAGIOLINO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Clomazone Pendimetalin Acido pelargonico *		
POST -EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Imazamox Bentazone Acido pelargonico *		
	Graminacee	1	Quizalofop-p-etile Quizalofop etile isomero D Ciclossidin Propaquizafop Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°17 – LENTICCHIA

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N°17 – LENTICCHIA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE-SEMINA	GRAMINACEE E DICOTILEDONI	1	Acido Pelargonico		
PRE- EMERGENZA	DICOTILEDONI E GRAMINACEE	1	Metribuzin Aclonifen (1) Acido pelargonico *		
POST- EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Pyridate Acido pelargonico *		
POST- EMERGENZA	Graminacee	1	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-etile Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEDA DIFESA N°18 – CAVOLI AD INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli Broccoli, Broccoli cinesi, Cime di Rapa)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Metalaxil-M + Rame (solo pieno campo)(1)		(1) Metalaxil-M: max 2 interventi per ciclo.
Alternariosi (<i>Alternaria brassicae</i>)	2	Difeconazolo (cavolfiore e cavolo broccolo) (IBE) (3) Pyraclostrobin (Strobilurina)+Boscalid (SDHI) (2) Azoxystrobin + Difenonazolo (4) Fluxapiroxad (SDHI) + Difenonazolo (IBE) (solo pieno campo) (5) <i>Prodotti rameici</i>		(3) IBE max 2 interventi per ciclo indipendentemente avversità. Max 3 per cicli superiori a 120 giorni con raccolta primaverile. (2) Strobilurine: max 2 interventi per ciclo indipendentemente avversità. Max 3 per cicli superiori a 120 giorni con raccolta primaverile. (4) Azoxystrobin + Difenonazolo: per cavolo broccolo max 2 interventi in alternativa al solo Difenonazolo. (5) Fluxapiroxad (SDHI) + Difenonazolo (IBE): max 2 interventi all'anno in alternativa al Difenonazolo
Micosferella del cavolo (<i>Mycosphaerella brassicola</i>)	1	Azoxistrobin (solo cavolfiore) (Strobilurina) (2) Difeconazolo (cavolfiore e cavolo broccolo solo in PC) (IBE) (3) Fluxapiroxad (SDHI) + Difenonazolo (IBE) (solo pieno campo) (5) <i>Prodotti rameici</i>		(2) Strobilurine: max 2 interventi per ciclo indipendentemente avversità. Max 3 per cicli superiori a 120 giorni con raccolta primaverile. (3) IBE: max 2 interventi per ciclo indipendentemente avversità. Max 3 per cicli superiori a 120 giorni con raccolta primaverile. (5) Fluxapiroxad (SDHI) + Difenonazolo (IBE): max 2 interventi all'anno in alternativa al Difenonazolo
Marciumi basali (<i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phoma spp.</i>)		<i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Coniothyrium minitans</i>		
Oidio (<i>Erysiphe criciferarum</i>)	1	Difeconazolo (cavolfiore e cavolo broccolo solo in PC) (IBE) (3) Zolfo		(3) IBE max 2 interventi per ciclo indipendentemente avversità. Max 3 per cicli superiori a 120 giorni con raccolta primaverile.
Marciumi radicali (<i>Pythium spp.</i>)	1	Propamocarb + Fosetil-AL (6)		(6) Propamocarb + Fosetil-AL: ammesso solo in semenzaio.
BATTERIOSI (<i>Xanthomonas campestris.</i> , <i>Erwinia carotovora</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°18 – CAVOLI AD INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli Broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Brevicoryne brassicae.</i>)	2	Lambdacialotrina (no serra) (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (2) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (no serra)(2) Deltametrina (Piretroidi) (2) Betacyflutrin (Piretroidi) (no serra) (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Sulfoxaflor (9) (solo in pieno campo) Maltodestrine <i>Azadiractina</i> (solo cavolfiore e broccoli) <i>Piretrine pure</i>	Soglia. Presenza generalizzata di colonie in accrescimento.	(2) Piretroidi: complessivamente max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 all'anno Lambdacialotrina, max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (3) Neonicotinoidi: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (9) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Altica (<i>Phyllotreta spp.</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (2) Betacyflutrin (Piretroidi) (no serra) (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3)	Soglia. Presenza d'infestazioni diffuse su giovani piante.	(2) Piretroidi: complessivamente max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 anno Lambdacialotrina e max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (3) Neonicotinoidi: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nottue fogliari (<i>Mamestra spp</i>) Cavolaia (<i>Pieris brassicae</i>)	2	Deltametrina (Piretroidi) (2) Indoxacarb (cavolfiore e broccolo) (7) Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (2) Lambdacialotrina (no serra) (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (2) Betacyflutrin (Piretroidi) (no serra) (2) Tau-fluvalinate (no serra) (solo cavolfiore) (2) <i>Azadiractina</i> (solo cavolfiore e broccoli) <i>Spinosad</i> (Spinosine)(5) Emamectina (Broccolo e Cavolfiore) (no serra) (6) Clorantraniliprole (Broccolo e Cavolfiore) (8) Spinetoram (Spinosine) (5) (solo pieno campo) <i>Bacillus thuringiensis</i>	Soglia. Comparsa dei primi sintomi.	(2) Piretroidi: complessivamente max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 anno Lambdacialotrina, max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (6) Emamectina: max 2 interventi per anno indipendentemente avversità (7) Indoxacarb: max 3 interventi per anno indipendentemente avversità (8) Clorantraniliprole: max 2 interventi per anno indipendentemente avversità, NO coltura protetta.

Segue SCHEDA DIFESA N°18 – CAVOLI AD INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli Broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Mosca del cavolo (<i>Delia radicum</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (2) Teflutrin (solo cavolfiore) (no serra) (4)		(2) Piretroidi : complessivamente max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 anno Lambdacialotrina max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina. (4) Teflutrin da distribuire localizzato lungo le file in forma granulare.
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (2) Betaciflutrin (Piretroidi) (no serra) (2)	Soglia: presenza di giovani larve	(2) Piretroidi : complessivamente max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 anno Lambdacialotrina, max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Elateridi (<i>Agritotes spp.</i>)	1	Teflutrin (solo cavolfiore) (no serra) Zeta-cipermetrina granulare (Piretroide) (2) Lambdacialotrina (Piretroidi) (no serra) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) L'uso di questi prodotti come geodisinfestanti non incide sul numero massimo dei trattamenti.	Soglia: trattamento al terreno solo se sulla coltura precedente si sono verificati problemi	(2) Piretroidi : complessivamente max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 anno Lambdacialotrina, max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	1	<i>Spinosad</i> (5) Betacyflutrin (Piretroide) (no serra) (2) Lambdacialotrina (Piretroidi) (no serra) (2)	Soglia: presenza accertata	(5) Spinosad : max 3 interventi per anno indipendentemente avversità (2) Piretroidi : complessivamente max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 anno Lambdacialotrina, max 1 intervento fra Cipermetrina, Alfa-cipermetrina e Zeta-cipermetrina.
Aleurodidi (<i>Aleyrodes proletella</i>)		Olio essenziale di arancio dolce Maltodestrina Olio minerale	Interventi: Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate	
Limacee (<i>Helix spp ed altre</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Ortofosfato ferrico esca	Soglia: presenza accertata	

SCHEDA DISERBO N°18 – CAVOLI AD INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli Broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-TRAPIANTO	Graminacee annuali e Dicotiledoni	1	Pendimetalin (2) Napropamide (solo cavolfiore)		
POST – TRAPIANTO POST - EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	2	Piridate ** (solo cavolfiore e cavolo broccolo) Clopiralid Quizalofop etile isomero D (solo cavolfioree) Quizalofop-p-etile Propaquizafop Metazaclor (3)		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

**Controlla solo infestanti dicotiledoni secondo le indicazioni riportate in etichetta

(2) Pendimetalin: 100 giorni di carenza.

(3) Metazaclor: non più di 1 kg/ha di sostanza attiva in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°19 – CAVOLI A TESTA (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavoli rossi, Cavolo di Bruxelles)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i>		
Alternariosi (<i>Alternaria brassicae</i>)	1	Azoxistrobin (1) Difenoconazolo (IBE) (2) Fluxapiroxad(SDHI) + Difenoconazolo (IBE) (solo cappucci) (no serra) (3) <i>Prodotti rameici</i>		(1) Azoxistrobin max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Difenoconazolo: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Fluxapiroxad(SDHI) + Difenoconazolo (IBE): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità e in alternativa al Difenoconazolo
Micosferella del cavolo (<i>Mycosphaerella brassicola</i>)	1	Azoxistrobin (1) Fluxapiroxad(SDHI) + Difenoconazolo (IBE) (solo cappucci) (no serra) (3) <i>Prodotti rameici</i>		(1) Azoxistrobin, max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (3) Fluxapiroxad(SDHI) + Difenoconazolo (IBE): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa al Difenoconazolo
Marciumi basali (<i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phoma spp.</i>)	1	<i>Coniothyrium minitans</i> (*) <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma harzianum</i>		(*) Ammesso solo contro sclerotinia.
Oidio (<i>Erysiphe criciferarum</i>)		Zolfo		
Marciumi radicali (<i>Pythium spp.</i>)	1	Propamocarb (*)		(*) Solo in vivaio, preparazione substrati.
BATTERIOSI (<i>Xanthomonas campestris.</i> , <i>Erwinia carotovora</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°19 – CAVOLI A TESTA (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavoli rossi, Cavolo di Bruxelles)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Brevicoryne brassicae.</i>)	2	Lambdacialotrina (no serra) (Piretroidi) (2) Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (2) (no Bruxelles) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (2) (no Bruxelles) Deltametrina (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroide) (2) Betacyflutrin (Piretroide) (no serra) (2) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (no serra) (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (6) (**) Spirotetramat (3) <i>Maltodestrina</i> Sulfoxaflor (9) (solo pieno campo) <i>Azadiractina</i> <i>Piretrine pure</i>	Soglia. Presenza generalizzata di colonie in accrescimento.	(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 all'anno indipendentemente dall'avversità con Lambdacialotrina, Etofenprox, Deltametrina, Betacyflutrin e max 1 intervento fra Cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Alfa-cipermetrina. (6) Neonicotinoidi: max 1 trattamento anno indipendentemente avversità (3) Spirotetramat: max 2 intreventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (9) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa al trattamento con neonicotenoide. (**) Acetamiprid: ammesso solo su Cavolo di Bruxelles.
Altica (<i>Phyllotreta spp.</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (2) Betacyflutrin (Piretroide) (no serra) (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (6) (**) Etofenprox (Piretroidi) (2) (*)	Soglia. Presenza d'infestazioni diffuse su giovani piante.	(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 all'anno indipendentemente dall'avversità con Lambdacialotrina, Etofenprox, Deltametrina, Betacyflutrin e max 1 intervento fra Cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Alfa-cipermetrina. (6) Neonicotinoidi: max 1 trattamento anno indipendentemente avversità (*) Etofenprox: non ammesso su Cavolo di bruxelles. (**) Acetamiprid: ammesso solo su Cavolo di Bruxelles.

Segue SCHEDA DIFESA N°19 – CAVOLI A TESTA (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavoli rossi, Cavolo di Bruxelles)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
<p>Nottue fogliari (<i>Mamestra spp</i>) Cavolaia (<i>Pieris brassicae</i>)</p>	2	<p>Indoxacarb (no Bruxelles) (7) Deltametrina (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) Lambdacialotrina (Piretroidi) (no serra)(2) Zetacipermetrina (Piretroidi) (2) (no Bruxelles) Etofenprox (Piretroidi) (2) (*) Betacyflutrin (Piretroide) (no serra) (2) Azadiractina Metaflumizone (no serra) (5) Emamectina (no serra) (3) Clorantraliniprole (no Bruxelles) (8) Spinetoram (Spinosine) (9) (Solo pieno campo) <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (Spinosine) (9) <i>Piretrine</i></p>	Soglia. Comparsa dei primi sintomi.	<p>(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 all'anno indipendentemente dall'avversità con Lambdacialotrina, Etofenprox, Deltametrina, Betacyflutrin e max 1 intervento fra Cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Alfa-cipermetrina. (5) Metaflumizone max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (7) Indoxacarb: max 3 interventi per anno indipendentemente avversità (3) Emamectina: max 2 interventi per anno indipendentemente avversità; solo contro <i>Pieris brassicae</i>. (8) Clorantraliniprole: max 2 interventi per anno indipendentemente avversità (9) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (*) Etofenprox: non ammesso su cavoletti di bruxelles.</p>

Segue SCHEDA DIFESA N°19 – CAVOLI A TESTA (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavoli rossi, Cavolo di Bruxelles)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Mosca del cavolo (<i>Delia radicum</i>)	1	Teflutrin (solo cappuccio) (no serra) 4)		(4) Teflutrin da distribuire localizzato lungo le file in forma granulare.
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (2) Betacyflutrin (Piretroide) (no serra) (2)	Soglia: presenza di giovani larve	(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 all'anno indipendentemente dall'avversità con Lambdacialotrina, Etofenprox, Deltametrina, Betacyflutrin e max 1 intervento fra Cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Alfa-cipermetrina.
Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	1	Teflutrin (no serra) (no bruxelles) Zeta-cipermetrina granulare (Piretroide) (2) Lambdacialotrina (Piretroide) (no serra) (no Bruxelles) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) L'uso dei geodisinfestanti è indipendente dalle altre limitazioni sui piretroidi.	Soglia: trattamento al terreno solo se sulla coltura precedente si sono verificati problemi	(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 all'anno indipendentemente dall'avversità con Lambdacialotrina, Etofenprox, Deltametrina, Betacyflutrin e max 1 intervento fra Cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Alfa-cipermetrina.
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	1	<i>Spinosad</i> (9) <i>Piretrine</i> Betacyflutrin (Piretroide) (no serra) (2)	Soglia: presenza accertata	(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Per cicli oltre 70 giorni max 3 trattamenti. Max 2 all'anno indipendentemente dall'avversità con Lambdacialotrina, Etofenprox, Deltametrina, Betacyflutrin e max 1 intervento fra Cipermetrina, Zeta-cipermetrina, Alfa-cipermetrina. (9) Spinosad: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Limacee (<i>Helix spp ed altre</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Fosfato ferrico	Soglia: presenza accertata Distribuire le esche lungo le fasce interessate	

SCHEDE DISERBO N°19 – CAVOLI A TESTA (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavoli rossi, Cavolo di Bruxelles)

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico (*)	30,4 (360 g/L)	
PRE-TRAPIANTO	Graminacee annuali e Dicotiledoni	1	Pendimetalin (100 giorni di carenza) Napropamide (solo cappuccio) Acido pelargonico (*)		
POST – TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Piridate Clopiralid Cicloxidim Quizalofop etile isomero D (solo su cappuccio) Quizalofop-p-etile Propaquizafop (solo su cappuccio) Metazaclor (**)		

(*) Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(**) Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento. Verificare registrazione su C. di Bruxelles

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°20 – CAVOLI A FOGLIA (Cavolo nero, Cavoli cinesi)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i>)	2	Prodotti rameici		
Marciumi basali (<i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phoma spp.</i>)	1	<i>Coniothyrium minitans</i> (*) <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma harzianum</i>		(*) Ammesso solo contro Sclerotinia
Oidio (<i>Erysiphe criciferarum</i>)		Zolfo		
Alternariosi (<i>Alternaria brassicae</i>)	1	Prodotti rameici Difenoconazolo (IBE) (1)		(1) IBE (Difenoconazolo): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Micosferella del cavolo (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)	1	Difenoconazolo (IBE) (1)		(1) IBE (Difenoconazolo): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
BATTERIOSI (<i>Xanthomonas campestris.</i> , <i>Erwinia carotovora</i>)				
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Brevicoryne brassicae.</i>)	2	Deltametrina (Piretroidi) (2) (no cavolo riccio e cinese Beta-cyflutrin (Piretroidi) (no serra) (2) Sulfoxaflor (8) (solo cavolo cinese) (solo in pieno campo) Spirotetramat (9) <i>Maltodestrina</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> (4)	Soglia. Presenza generalizzata di colonie in accrescimento.	(2) Piretroidi : max 2 interventi all'anno per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 2 con Lambdacialotrina. (8) Sulfoxaflor : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Azadiractina : max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (9) Spirotetramat : max 1 intervento all'anno; ammesso solo su cavolo cinese.
Altica (<i>Phyllotreta spp.</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (solo cavolo nero) (2) Beta-cyflutrin (Piretroide) (no serra) (2)	Soglia. Presenza d'infestazioni diffuse su giovani piante.	(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 2 con Lambdacialotrina
Nottue (<i>Mamestra spp</i>) Cavolaia (<i>Pieris brassicae</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (2) Beta-cyflutrin (Piretroidi) (no serra) (2) Spinetoram (Spinosine) (8) (solo pieno campo) Indoxacarb (no cavolo nero, solo contro <i>Mamestra spp.</i> e <i>Pieris brassicae</i>) (7) <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> (4)	Soglia. Comparsa dei primi sintomi.	(8) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 2 con Lambdacialotrina. (7) Indoxacarb : max 3 interventi per anno indipendentemente avversità. (4) Azadiractina : max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°20 – CAVOLI A FOGLIA (Cavolo nero, Cavoli cinesi)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Mosca bianca del cavolo <i>Aleyrodes proletella</i>	1	Deltametrina (Piretroidi) (solo cavolo nero) (2) <i>Piretrine pure</i>		(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 2 con Lambdacialotrina .
Mosca del cavolo <i>Delia radicum</i>	1	Lambdacialotrina (*) <i>Piretrine pure</i>		(*) Lambdacialotrina: Formulato granulare per trattamenti localizzati sulla fila.
Tentredini <i>Athalia rosae</i>	1	Deltametrina (Piretroidi) (solo cavolo nero)(2) Beta-cyflutrin (Piretroide) (no serra) (2) <i>Piretrine pure</i>	Soglia: presenza di giovani larve	(2) Piretroidi max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 2 con Lambdacialotrina .
Tripidi <i>Thrips tabaci</i>	1	<i>Spinosad</i> <i>Piretrine pure</i> Beta-cyflutrin (Piretroide) (no serra) (2)	Soglia: presenza accertata	(2) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 2 con Lambdacialotrina .
Limacee <i>Helix spp ed altre</i>	Esche avvelenate	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	Soglia: presenza accertata Distribuire le esche lungo le fasce avvelenate	

SCHEDA DISERBO N°20 – CAVOLI A FOGLIA (Cavolo nero, Cavoli cinesi)

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico (*)	30,4 (360 g/L)	
PRE-TRAPIANTO	Graminacee annuali e Dicotiledoni	1	Pendimetalin (**) Acido pelargonico (*)		
POST – TRAPIANTO	Graminacee	1	Cicloxdim Metazaclor (***)		

(*) Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane).

(**) 100 giorni di carenza.

(***) Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento. Verificare impiego dei formulati commerciali

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEMA DIFESA N°21 – SPINACIO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Fosetil Al Cimoxanil (4) Flupicolide+Propamocarb (solo pieno campo) (1) Pyraclostrobin+Dimetomorf (CAA) (solo pieno campo) (3) Mandipropamid (CAA) (5)		(1) <u>Flupicolide+Propamocarb</u> max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (3) <u>Pyraclostrobin+Dimetomorf</u> max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (4) <u>Cimoxanil</u> : max 2 interventi per ciclo colturale. (5) <u>(Mandipropamid (CAA))</u> : max 1 intervento all'anno. CAA (Mandipropamid, Dimetomorf): complessivamente max 3 interventi all'anno.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	<i>Pythium oligandrum</i> M1 (3) Boscalid+Pyraclostrobin (2) Fludioxonil (4)		(2) <u>Boscalid+Pyraclostrobin</u> max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (3) <u><i>Pythium oligandrum</i> M1</u> : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (4) <u>Fludioxonil</u> : max 1 intervento all'anno.
Cercospora		<i>Prodotti rameici</i>		
Oidio		Zolfo		
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Marciumi basali (<i>Phoma lycopersici</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Thielaviopsis basicola</i>)	1	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Pythium oligandrum</i> M1 (3)		(3) <u><i>Pythium oligandrum</i> M1</u> : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra, contro <i>Sclerotinia</i> spp.
Moria delle piantine (<i>Pithium</i> spp.)	1	<i>Tricoderma asperellum</i> + <i>Tricoderma gamsii</i>		

Segue SCHEDE DIFESA N°21 – SPINACIO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Aphis fabae</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide della lattuga (<i>Nasonovia ribisnigri</i>)	2	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Lambdacialotrina (Piretroide) (solo pieno campo) (1) Sulfoxaflor (6) (solo pieno campo) <i>Maltodestrina</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i>	Soglia. Presenza.	(1) Piretroidi : max 3 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Max 4 interventi indipendentemente dall'avversità per cicli oltre 50 giorni) Lambdacialotrina max 2 all'anno. (6) Sulfoxaflor : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo contro afide verde del pesco e afide della lattuga.
Notte fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helycoverpa armigera</i>) <i>Autographa gamma</i>)	2	Indoxacarb (5) (**) Etofenprox (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (solo pieno campo) (1) Metoxifenozide (solo pieno campo) (2) Clorantroliniprole (3) Spinetoram (Spinosine) (4) <i>Spinosad (Spinosine) (4) (*)</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>SpliNPV (solo contro S. littoralis)</i>	Soglia. Presenza di focolai.	(1) Piretroidi : max 3 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Max 4 interventi indipendentemente dall'avversità per cicli oltre 50 giorni) Lambdacialotrina max 1 all'anno. (2) Metoxifenozide max 1 intervento per ciclo colturale anno indipendentemente dall'avversità (3) Clorantroliniprole max 2 intervento per anno indipendentemente dall'avversità (2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (5) Indoxacarb max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità (*) ammesso solo contro <i>H. armigera</i> e <i>S. littoralis</i> (**) ammesso solo contro <i>S. littoralis</i> e <i>A. gamma</i>
Mamestra (<i>Mamestra brassicae</i>)	1	Indoxacarb (5)		(5) Indoxacarb max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità
Tripidi (<i>Thrips tabaci, ect</i>)	1	<i>Spinosad (Spinosine) (4)</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Spinetoram (Spinosine) (4) Terpenoid blend QRD 460 (4) (solo serra)	Soglia: presenza accertata.	(2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (4) Terpenoid blend QRD 460 : max 1 intervento per ciclo colturale.
Limacce (<i>Helix spp. ed altre</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	Soglia: presenza accertata.	

SCHEDA DISERBO N°21 – SPINACIO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (2) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-SEMINA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Acido pelargonico *		
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Metamitron Lenacil S-metolaclor (1) Tri-allate Acido pelargonico *		
POST - EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Fenmedifam Lenacil Acido pelargonico *		
	Graminacee	1	Propaquizafop Cicloxidim Quizalofop etile isomero D Quizalofop-p-etile Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) S-metalaclor: utilizzabile solo nel periodo compreso tra febbraio e agosto

(2) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°22 - BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Mal del piede (<i>Phoma betae</i>) Mal vinato (<i>Rhizoctonia violacea</i>), Marciume secco (<i>R. solani</i>)		<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1		
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2	<i>Pythium oligandrum</i> M1 (6) Boscalid (SDHI) +Pyraclostrobin (Strobilurina)(1) Penthiopirad (SDHI) (in pieno campo) (7)		(1) Boscalid (SDHI)+Pyraclostrobin : max 2 interventi per anno (6) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (7) Penthiopirad (SDHI) : max 1 intervento all'anno in alternativa a altri SDHI
Marciume del colletto (Sclerotinia) <i>Sclerotinia</i> spp.	1	<i>Pythium oligandrum</i> M1 (6) <i>Coniothyrium minitans</i> Penthiopirad (SDHI) (in pieno campo) (7)		(6) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra (7) Penthiopirad : max 1 intervento all'anno in alternativa a altri SDHI
Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Peronospora (<i>Peronospora farinosa f.sp. betae</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Pyraclostrobin (Qol)+Dimetomorf Mandipropamide (CAA) (8)		(8) Mandipropamid (CAA) : max 1 intervento all'anno.
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)		Zolfo		
Ruggine (<i>Uromyces betae</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)		<i>Trichoderma asperellum</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Aphis fabae</i> <i>Myzus persicae</i>)	1	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Acetamiprid (Neonicotenoide) (2) <i>Maltodestrina</i>	Interventi chimici: - intervenire in presenza di infestazioni diffuse	(1) Piretroidi : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (2) Acetamiprid (Neonicotenoide) : max 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Altica (<i>Phyllotreta</i> spp.)		Acetamiprid (Neonicotenoide) (2)	Interventi chimici: - Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti	(2) Acetamiprid (Neonicotenoide) : max 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Mosca e Mosca minatrice (<i>Pegomia betae</i> e <i>Liriomyza</i> spp.)		<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> (3)		(3) Azadiractina : ammessa solo contro <i>Liriomyza</i> spp.

Segue SCHEDA DIFESA N°22 – BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue fogliari (<i>Spodoptera</i> spp., <i>Helycoverpa armigera</i> ecc.)	1	Metoxifenoziide (solo pieno campo) (3) Spinetoram (Spinosine) (2)		(3) Metoxifenoziide max 1 intervento per anno indipendentemente dall'avversità. (2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i>)	1	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad</i> (2) Etofenprox (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Clorantraniliprole (4)	Soglia: presenza accertata	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità; Etofenprox max 1 intervento per taglio. (2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (4) Clorantraniliprole max 2 intervento per anno indipendentemente dall'avversità
Limacee (<i>Helix</i> spp. <i>Limax</i> spp.)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Fosfato di ferro	Soglia: presenza generalizzata	

SCHEDE DISERBO N°22 – BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (2) Acido pelargonico *	30.4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Metamitron S-metolacloclor (1) Acido pelargonico *		
POST-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Acido pelargonico * Fenmedifam		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) S-metolacloclor: utilizzabile solo nel periodo compreso tra febbraio e agosto

(2) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°22 / A BIETOLA ROSSA O DA ORTO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)		Prodotti rameici	<u>Interventi agronomici:</u> - effettuare ampi avvicendamenti - eliminare la vegetazione infetta <u>Interventi chimici:</u> - intervenire alla comparsa delle prime pustole sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di 10-15 giorni in relazione all'andamento climatico	
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)		Zolfo	<u>Interventi chimici:</u> - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	
Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i>)		Prodotti rameici	<u>Interventi agronomici:</u> - ampie rotazioni colturali <u>Interventi chimici:</u> - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	
Mal dello Sclerozio (<i>Sclerotium rolfsii</i>)			<u>Interventi agronomici:</u> - estirpare dal terreno le piante colpite e bruciarle - evitare la coltivazione sullo stesso terreno per 3-4 anni	
Batteriosi		Prodotti rameici	<u>Interventi agronomici:</u> - estirpare dal terreno le piante colpite e bruciarle	
PARASSITI ANIMALI				
Afidi		Piretrine pure Maltodestrina	<u>Interventi chimici:</u> - intervenire in presenza di infestazioni diffuse	
Altica (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	1	Piretrine Deltametrina	<u>Interventi chimici:</u> - Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti	
Mosca (<i>Pegomia betae</i>)		Piretrine pure	<u>Interventi chimici:</u> - intervenire con tempestività alla nascita delle larve o sulle mine appena formate	
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)		<i>Bacillus thuringensis</i>	<u>Soglia:</u> Presenza	

SCHEDA DISERBO N°22 / A – BIETOLA ROSSA O DA ORTO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30.4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e graminacee	1	Metamitron Acido pelargonico *		
POST-EMERGENZA	Dicotiledoni e graminacee	1	Metamitron Fenmedifan Acido Pelargonico * Cicloxiidim Quizalofop-p-etile		

(*) Prodotto non selettivo. Utilizzare attrezzature schermate.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDE DIFESA N° 23 – BIETOLA DA FOGLIA (Produzione in coltura protetta e Baby leaf)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	BABY LEAF	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE					
Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)		Prodotti rameici	SI		
Peronospora (<i>Peronospora farinosa f.sp. betae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)		Prodotti rameici Cerevisane	SI		
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)		Zolfo	SI		
Muffa Grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2	Boscalid+Pyraclostrobin (1)	SI		(1) Boscalid+Pyraclostrobin: max 2 trattamenti all'anno
Sclerotinia (<i>Sclerotinia spp.</i>) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)		<i>Coniothyrium minitans</i> (*) <i>Trichoderma asperellum</i> (**)	SI		(*) solo contro Sclerotinia. (**) solo contro Rhizoctonia
Ruggine (<i>Uromyces betae</i>)		Prodotti rameici	SI		
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)		Prodotti rameici	SI		
Moria delle piantine (<i>Pythium spp.</i>)		<i>Trichoderma asperellum</i>	SI		
PARASSITI ANIMALI			SI		
Afidi (<i>Aphis fabae</i> <i>Myzus persicae</i>)	1	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> Lambdacialotrina (Piretroidi) (solo Baby leaf) (3) <i>Maltodestrina</i>	SI		(3) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox.
Mosca minatrice (<i>Liriomyza spp.</i>) Mosca (<i>Pegomya betae</i>)		<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> (5)	SI		(5) Azadiractina: ammessa solo contro <i>Liriomyza spp.</i>

Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	1	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad (Spinosine) (2) (*)</i> <i>Spinetoram (Spinosine) (2)</i> Etofenprox (Piretroidi) (3) Clorantraniprole (4)	SI SI NO NO SI	Soglia: presenza accertata	<u>(2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram):</u> max 3 interventi all'anno per ciclo colturale di cui con Spinetoram max 2 interventi. <u>(3) Piretroidi:</u> max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente avversità di cui max 1 con Etofenprox. <u>(4) Clorantraniprole</u> max 2 interventi anno indipendentemente dall'avversità (*) solo contro <i>Heliothis armigera</i> e <i>Spodoptera littoralis</i> .
Limacee (<i>Helix spp.</i> , <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agriolimax spp.</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Fosfato ferrico	SI SI	Soglia: presenza generalizzata	Distribuire le esche lungo le fasce interessate

SCHEDE DISERBO N° 23 – BIETOLA DA FOGLIA (Produzione in coltura protetta e Baby leaf)

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (2) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	S-metolacloclor (1)		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) S-metolacloclor: utilizzabile solo nel periodo compreso tra febbraio e agosto.

(2) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°24 – ASPARAGO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Fusariosi (<i>Fusarium spp</i>)				
Ruggine (<i>Puccinia asparagi</i>)	2 (solo dopo la raccolta)	Prodotti rameici Difenoconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (1) Azoxytrobina (Strobilurine) (2) Pyraclostrobina (Strobilurine) (2) +Boscalid (SDHI) (solo pieno campo) Fluopyram (3)		(1) IBE max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (2) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (3) Fluopyram max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Stemfiliosi (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	2 (solo dopo la raccolta)	Difenoconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (1) Azoxytrobina (Strobilurine) (2) Pyraclostrobina (Strobilurine) (2) +Boscalid (SDHI) (solo pieno campo) Fluopyram (SDHI) + Tebuconazolo (IBE) (6)		(1) IBE max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (2) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (6) Fluopyram + Tebuconazolo (IBE): max 1 intervento all'anno
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)		<i>Pythium oligandrum</i> M1 (4)		(4) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi in pieno campo e serra.
Mal vinato (<i>Rhizoctonia violacea</i>)				
PARASSITI ANIMALI				
Mosca grigia dei semi (<i>Delia platura</i>)	1	Teflutrin (1)	Soglia. Sicura infestazione del dittero sui turioni.	(1) Trattamento da eseguire in pre-emergenza in formulazione granulare.
Afide (<i>Brachycorynella asparagi.</i>)		<i>Piretrine pure</i> Lambda-cialotrina (Piretroidi) (5) <i>Maltodestrina</i>		(5) Lambda-cialotrina: max 1 intervento all'anno nel limite di max 2 interventi con Piretroidi indipendentemente dall'avversità.
Criocere (<i>Crioceris spp.</i>)	1	Spinosad Lambda-cialotrina (Piretroidi) (5) Deltametrina (Piretroidi) (5)	Interventi chimici Soglia: Elevata presenza di larve e/o adulti durante i primi 2 anni di impianto	(5) Lambda-cialotrina: max 1 intervento all'anno nel limite di max 2 interventi con Piretroidi indipendentemente dall'avversità.
Ipopita (<i>Parahypopta caestrum</i>)				

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)		<i>Paecilomices lilacinus</i> ceppo 251	<u>Interventi agronomici:</u> - nei terreni sani utilizzare materiale di propagazione proveniente da terreni sicuramente non infestati; - negli avvicendamenti inserire il carciofo, i cereali, le Ombrellifere, le Crucifere; - porre a riposo il terreno per un anno, lavorandolo per abbassare le popolazioni dei nematodi; - limitare l'apporto di fertilizzanti organici.	
Limacce e Chioccioline (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)		<i>Fosfato ferrico</i>	<u>Interventi agronomici</u> Circonscrivere il campo con calce per evitare la migrazione a zone esterne. <u>Interventi chimici</u> Effettuare la distribuzione delle esche esclusivamente sul terreno, precocemente nel periodo autunnale prima della deposizione delle uova, preferibilmente di sera e subito dopo le prime irrigazioni o le prime piogge. Con attacchi limitati ai bordi dei campi effettuare la distribuzione soltanto sulla fascia interessata	

SCHEDA DISERBO N°24 – ASPARAGO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - TRAPIANTO PRE-RICACCIO E/O POST-RACCOLTA	Dicotiledoni e Graminacee.	1	Glifosate (5) Acido pelargonico (1)	30,4 (360 g/L)	
PRE-RICACCIO POST-EMERGENZA E POST RACCOLTA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin (60 giorni di carenza) Pendimetalin + Clomazone Dicamba Propaquizafop (Post-emergenza Graminacee) Piridate (4) Metribuzin (3) Isoxaben + Orizalin (2)	45	0,5 - 2
POST -RACCOLTA	Graminacee	1	Metribuzin (3) Propaquizafop Metobromuron (5)		

(1) Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(2) Non può essere distribuito su più del 75% della superficie dell'appezzamento da trattare se applicato in pre-emergenza della coltura

(3) Complessivamente max 1 intervento all'anno

(4) Controlla solo infestanti dicotiledoni secondo le indicazioni riportate in etichetta

(5) Controlla infestanti a foglia larga ed annuali.

(2) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°25 - CIPOLLA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Peronospora shleideni</i>)	4	Benalaxil (Fenilammidi) (1) + rame Metalaxil-M (Fenilammidi) (1) Valifenalate (CAA) (2) Cymoxanil (3) Azoxystrobin (Strobilurina)(4) Pyraclostrobin (Strobilurina) (4) +Dimetomorf (CAA) (2) Flupicolide+Propamocarb (6) Mancozeb (Ditiocarbammati) (7) Metiram (Ditiocarbammati) (7) Zoxamide (8) +Dimetomorf (CAA) (2) Zoxamide (8) <i>Prodotti rameici</i>		(1) Fenilammidi max 2 interventi per anno. (2) CAA: max 3 interventi all'anno indipendentemente avversità. (3) Cymoxanil max 3 interventi per anno. (4) Strobilurine: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (6) Flupicolide+Propamocarb max 1 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (7) Ditiocarbammati max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (8) Zoxamide: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità.
Botrite (<i>Botritis squamosa</i>)	2	Ciprodinil+Fludioxonil (9) Pyrimethanil (9) Fenexamid (5) Boscalid (SDHI)+ Pyraclostrobin (Strobilurina) (4)		(5) Fenexamid: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (4) Strobilurine: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (9) Pyrimethanil, Ciprodinil+Fludioxonil: complessivamente max 2 unterventi all'anno.
PARASSITI ANIMALI				
Mosca dei bulbi (<i>Delia antiqua</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (1) Cipermetrina (Piretroidi) (1) Etofenprox (Piretroidi) (1)	Soglia: primi danni.	(1) Piretroidi: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, Cipermetrina.
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	2	<i>Spinosad</i> (2) <i>Azadiractina</i> Spirotetramat (9) Acrinatrina (Piretroidi) (1)	Soglia: presenza dell'insetto.	(2) Spinosad: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (9) Spirotetramat: max 2 interventi all'anno. (1) Piretroidi: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, Cipermetrina.
Afidi (<i>Myzus ascalonicus</i>)	1	Piretrine Beta-cyflutrin (Piretroidi) (1) <i>Maltodestrina</i>		(1) Piretroidi: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, Cipermetrina.
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (1) Cipermetrina (Piretroidi) (1)	Soglia: infestazione larvale diffusa a pieno campo	(1) Piretroidi: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, Cipermetrina.

segue SCHEDA DIFESA N°25 – CIPOLLA

Nottue fogliari (<i>Spodoptera exigua</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (1) Beta-cyflutrin (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (1)	Soglia: infestazione diffusa a pieno campo	(1) Piretroidi: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, Cipermetrina, Lambdacialotrina.
AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Elateridi (<i>Agrotis spp</i>)	1	Cipermetrina (Piretroidi)	Soglia: accertata presenza mediante specifici monitoraggi.	I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi e di fosfororganici non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse sostanze attive.

SCHEDA DISERBO N°25 – CIPOLLA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni da seme e Graminacee	1	Pendimetalin Clorpropam Acido pelargonico *		
POST -EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Bromoxinil Pendimetalin Aclonifen (2) Clopiralid Pyridate ** Acido pelargonico *		
	Graminacee	1	Cicloxdim Quizalofop-p-etile Cletodim Propaquizafop Quizalofop etile isomero D		

* PRODOTTO NON SELETTIVO. UTILIZZARE POMPE A SPALLA O IRRORATORI DOTATI DI ATTREZZATURE PROTETTIVE (SCHERMI O CAMPANE)

** CONTROLLA SOLO INFESTANTI DICOTILEDONI SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEDA DIFESA N°26 – PORRO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Phytophthora porri</i>)	4	Cymoxanil (1) Azoxystrobin (Strobilurine) (2) Pyraclostrobin (Strobilurine) (2)+ Dimetomorf (CAA) (in pieno campo) <i>Prodotti rameici</i>		(1) Cymoxanil max 3 interventi per anno. (2) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità.
Ruggine (<i>Puccinia spp.</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Azoxystrobin (Strobilurine) (2)		(2) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità.
Botrite (<i>Botritis squamosa, Botritis allii</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Pyraclostrobin (Strobilurine) (2) + Boscalid (SDHI) (in pieno campo)		(2) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità.
Alternaria (<i>Alternaria porri</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Azoxystrobin (Strobilurine) (2) Pyraclostrobin (Strobilurine) (2) + Boscalid (SDHI) (in pieno campo)		(2) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità.
PARASSITI ANIMALI				
Mosca (<i>Delia antiqua</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (1)	Soglia: primi danni.	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo indipendentemente dall'avversità.
Mosca del porro (<i>Napomyza gymnotoma</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (1) <i>Spinosad</i> (2)	Soglia: primi danni.	(2) Spinosad max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (2) <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> Deltametrina (Piretroide) (1) Lambdacialotrina (Piretroide) (1)	Soglia: presenza dell'insetto.	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo indipendentemente dall'avversità. (2) Spinosad max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità.

SCHEDA DISERBO N°26 – PORRO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA PRE-TRAPIANTO	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
POST-TRAPIANTO	Dicotiledoni da seme e Graminacee	1	Piridate ** Pendimetalin		
POST-EMERGENZA	Graminacee	1	Cicloxdim Pendimetalin		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

** Controlla solo infestanti dicotiledoni secondo le indicazioni riportate in etichetta.

*** Impiegare in pre o in post-emergenza o pre o post-trapianto

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°27 – AGLIO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Ruggine (<i>Puccinia allii</i>)	2	Azoxystrobin (Strobilurina) (1) Tebuconazolo (IBE) (2) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina) (1) Mancozeb (Ditiocarbammati) (3) <i>Prodotti rameici</i> Zolfo		(1) Strobilurina (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 volte all'anno indipendentemente avversità. (2) Tebuconazolo max 2 volte all'anno. (3) Ditiocarbammati: max 2 volte all'anno indipendentemente avversità.
Peronospora	1	Pyraclostrobin (Strobilurina) (1) + Dimetomorf (CAA) Metiram (Ditiocarbammati) (3) Zoxamide + Dimetomorf (CAA)(4)		(1) Strobilurina (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 volte all'anno indipendentemente avversità. (3) Ditiocarbammati: max 3 volte all'anno indipendentemente avversità. (4) Dimetomorf (CAA): max 2 volte all'anno indipendentemente avversità.
Marciumi dei bulbi (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Helminthosporium spp.</i> , <i>Sclerotium cepivorum</i> , <i>Penicillium spp.</i>)	1	Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina) (1) <i>Tricoderma harzianum</i>		(1) Strobilurina (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 volte all'anno indipendentemente avversità
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas fluorescens.</i>)				
PARASSITI ANIMALI				
Tripidi (<i>Thrips spp.</i>)		<i>Azadiractina</i>		
Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)			Interventi agronomici: - per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi - si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti - si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)	
Mosca dei bulbi (<i>Suillia univittata</i>)	1	<i>Azadiractina</i> Etofenprox (Piretroidi) (6) Deltametrina (Piretroidi) (6)		(6) Piretroidi (Deltametrina, Etofenprox): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità fra Etofenprox e Deltametrina.

SCHEDE DISERBO N°27 – AGLIO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Metazaclor Acido pelargonico *		
POST -EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Metazaclor Aclonifen (2)(in Post-emergenza precoce) Piridate Clopiralid (su Dicotiledoni) Bromoxinil Acido pelargonico *		
	Graminacee	1	Proquazafop Quizalofop-p-etile Quizalofop etile isomero D		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEDE DIFESA N°28 – SCALOGNO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Peronospora schleideni</i>)	3	<i>Prodotti rameici</i> Azoxystrobin (Strobilurine) (1) Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) +Dimetomorf Zoxamide+Dimetomorf (2)		(1) Strobilurine: max 2 volte all'anno indipendentemente avversità. (2) Zoxamide: max 3 volte all'anno indipendentemente avversità.
Botrite (<i>Botrytis squamosa</i>)	1	Boscalid + Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) (solo pieno campo) Fludioxonil + Ciprodinil (3)		(1) Strobilurine: max 2 volte all'anno indipendentemente avversità. (3) Fludioxonil + Ciprodinil: max 1 intervento all'anno.
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas spp.</i>)				
PARASSITI ANIMALI				
Tripide (<i>Thrips tabaci</i>)	2	<i>Spinosad</i> (1) <i>Piretrine pure</i> Spirotetramat (4) Cipermetrina (Piretroidi) (2) Beta-cyflutrin (Piretroidi) (2) Acrinatrina (Piretroidi) (2)	Soglia: presenza diffusa su giovani impianti	(1) Spinosad max 3 volte all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Piretroidi: max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Acrinatrina e max 1 fra Cipermetrina e Beta-ciflutrin. (4) Spirotetramat: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Afidi (<i>Myzus ascalonicus</i>)		<i>Piretrine pure</i> Beta-cyflutrin (Piretroidi) (2)		(2) Piretroidi: max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità

SCHEDE DISERBO N°28 – SCALOGNO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
POST -EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Clopiralid (su Dicotiledoni) Piridate ** Bromoxynil Aclonifen (2) Propaquizafop Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

** Controlla solo infestanti dicotiledoni secondo le indicazioni riportate in etichetta

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEDA DIFESA N°29 – CARCIOFO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Oidio (<i>Leveillula spp.</i>)	3	Penconazolo (IBE) (2) Tetraconozolo (IBE) (2) Tebuconazolo (IBE) (CS) (2) Miclobutanil (IBE) (CS) (2) Azoxystrobin (Strobilurina) (1) Pyraclostrobin (Strobilurina) (1)+Dimetomorf (CAA) (4) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina)(1) (5) Zolfo		(1) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 volte per anno indipendentemente dall'avversità (2) IBE max 2 volte all'anno, di cui con CS (Candidati sostituzione) max 1. (4) Pyraclostrobin+Dimetomorf: ammesso 2 volte per anno indipendentemente dall'avversità (5) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Botrite (<i>Botritis cinerea</i>)	1	Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina) (1) (5)		(5) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (1) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 volte per anno indipendentemente dall'avversità
Peronospora (<i>Bremia spp</i>)	3	<i>Prodotti rameici</i> Cymoxanil Fosetil-Al Azoxystrobin (Strobilurina) (1) Metalaxil-M (3) Pyraclostrobin (Strobilurina) (1)+Dimetomorf (4)	Soglia: presenza di primavera ed autunni piovosi	(1) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 volte per anno indipendentemente dall'avversità (4) Pyraclostrobin (Strobilurina) +Dimetomorf: ammesso 2 volte per anno indipendentemente dall'avversità (3) Metalaxil-M: complessivamente max 2 interventi all'anno.
Marciume del colletto (<i>Rhizoctonia spp</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	1	<i>Coniothyrium minitans</i> * <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma asperellum</i> + <i>Tricoderma gamsii</i> Flutolanil (6)		* Solo contro Sclerotinia (6) Flutolanil: max 1 intervento per ciclo culturale. Solo contro <i>Rhizoctonia solani</i>

Segue SCHEDE DIFESA N°29 – CARCIOFO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Brachycaudus cardui</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Dysaphis cynarae</i>)	1	Pirimicarb (1) Deltametrina (Piretroidi) (2) Lambda cialotrina (Piretroidi) (2) Cipermetrina (Piretroidi) (2) Acetamiprid (Neonicotinoide) (5) <i>Maltodestrina</i> <i>Piretrine pure</i> .	Soglia:10 % di piante infestate.	(1) <u>Pirimicarb</u> : max 1 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità; ammesso solo su <i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i> . Trattamenti precoci e localizzati. (2) <u>Piretroidi</u> : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 <u>Lambdacialotrina</u> . (5) <u>Neonicotinoidi</u> : max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità
Gortina (<i>Gortyna xanthenes</i>)	1	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad</i> (4) Deltametrina (Piretroidi) (2) Alphametrina (Piretroidi) (2) Lambdacialotrina (Piretroidi) (2)	Obbligo installazione trappole a feromoni. Soglia: presenza dell'insetto nelle trappole.	(2) <u>Piretroidi</u> : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 <u>Lambdacialotrina</u> . (4) <u>Spinosad</u> : max 3 volte per anno indipendentemente dall'avversità
Depressaria (<i>Depressaria erinacella</i>)	2	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad</i> (4) Deltametrina (Piretroide) (2) Emamectina (3)	Soglia. Presenza diffusa di larve in autunno	(2) <u>Piretroidi</u> : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 <u>lambdacialotrina</u> . (4) <u>Spinosad</u> : max 3 volte per anno indipendentemente dall'avversità (3) <u>Emamectina</u> : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
Nottue terricole (<i>Scotia ypsilon</i> , <i>Scotia segetum</i>)	2	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad</i> (4) Deltametrina (Piretroide) (2) Cipermetrina (Piretroide) (2)	Soglia: presenza di forti attacchi	(2) <u>Piretroidi</u> : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 <u>lambdacialotrina</u> . (4) <u>Spinosad</u> : max 3 volte per anno indipendentemente dall'avversità (3) <u>Emamectina</u> : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità

Segue SCHEDA DIFESA N°29 – CARCIOFO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Plusia gamma</i> , <i>Plusia chalcites</i>)	2	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad</i> (4) Deltametrina (Piretroide) (2) Cipermetrina (Piretroide) (2) Lambdacialotrina (Piretroidi) (2) Indoxacarb (6) Emamectina (3)	Soglia: intervenire solo in presenza di grossi attacchi.	(2) Piretroidi : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 lambdacialotrina. (4) Spinosad : max 3 volte per anno indipendentemente dall'avversità (6) Indoxacarb : max 2 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità; solo su <i>Spodoptera littoralis</i> (3) Emamectina : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.) Nematodi da lesioni (<i>Pratylenchus</i> spp.)		<i>Paecilomyces liliacinus</i> ceppo 251	Interventi agronomici: - nei terreni sani utilizzare materiale di propagazione proveniente da terreni sicuramente non infestati. - allungare il turno delle rotazioni e consociare, se possibile, con piante repellenti o nematocide (per es <i>Tagetes patula</i>). - non avvicendare con altre Composite o con Solanacee. - negli avvicendamenti inserire l'asparago, i cereali, le Umbrellifere, le Crucifere. - porre a riposo il terreno per un anno, lavorandolo per abbassare le popolazioni dei nematodi. - limitare l'apporto di fertilizzanti organici Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	
Lumache (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Fosfato ferrico	Soglia: elevata presenza	

SCHEDA DISERBO N°29 – CARCIOFO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE EMERGENZA PRE TRAPIANTO	Dicotiledoni annuali e Graminacee invernali	1	Oxyfluorfen (<i>ammesso dall'ultima decade di settembre alla prima maggio</i>) Pendimentalin Aclonifen (2)(in Pre-trapianto) Metazaclor Acido pelargonico *		
POST EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Piridate Cletodim (su Dicotiledoni in Post-trapianto) Quizalofop-p-etile Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

SCHEDA DIFESA N°30 – CARDO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Bremia luctucae</i>) ,		Prodotti rameici		
Oidio (<i>Leveillula spp.</i>)		Zolfo		
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)		<i>Pythium oligandrum</i> M1 (4)		(4) <i>Pythium oligandrum</i> M1 : max 4 interventi in pieno campo e serra.
BATTERIOSI (<i>Erwinia carotovora var. carotovora</i>)		Prodotti rameici		
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Capitophorus elaeagni</i>)		Piretrine pure Tau-fluvalinate (Piretroidi) (2) Maltodestrina		(2) Tau-fluvalinate (Piretroidi): max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.
Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Nottue fogliari (<i>Hydroecia xanthenes</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>) Depressaria (<i>Agonopterix spp</i>)		<i>Bacillus thuringensis</i>		
Nematodi galligeni		<i>Paecilomyces lilacinus</i> ceppo 251		
Lumache e Limacee (<i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca (1) Ortofosfato di ferro esca		(1) Trattamenti localizzati

SCHEDA DISERBO N°30 – CARDO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE EMERGENZA	Dicotiledoni annuali e Graminacee invernali	1	Pendimetalin Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

SCHEDA DIFESA N°31 – RADICCHI

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens SBS plantarum D747</i> <i>Cerevisane (solo serra)</i> Metalaxil-M (2) Azoxistrobin (Strobilurine) (3) Mandipropamide (CAA) (1) Dimetomorf (CAA) (1) Ametoctradina (10) (solo pieno campo)		(2) <u>Metalaxil-M</u> : max 1 intervento per ciclo colturale (3) <u>Strobilurine</u> max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. <u>Boscalid+Pyraclostrobin</u> max 1 all'anno. (1) <u>CAA (Mandipropamide, Dimetomorf)</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) <u>Ametoctradin</u> : max 2 interventi all'anno.
Marciume basale (<i>Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor</i>) Muffa Grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2 per ciclo 3 per cicli lunghi	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Coniothyrium minitum</i> <i>Pythium oligandrum M1</i> (8) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (9) <i>Bacillus amyloliquefaciens SBS plantarum D747</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Cerevisane (solo serra)</i> Cyprodinil+Fludioxanil (4) Boscalid (SDHI) +Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) Fenexamid (7) Azoxistrobin (Strobilurine) (no serra)(3) *		(3) <u>Strobilurine</u> max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. <u>Boscalid+Pyraclostrobin</u> max 1 all'anno. (4) <u>Cyprodinil+Fludioxanil</u> : max 2 interventi per ciclo colturale. (7) <u>Fenexamid</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (8) <u>Pythium oligandrum M1</u> : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra (9) <u>Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11)</u> : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	1	Zolfo Azoxystrobin (Strobilurine) (no serra) (3)		(3) <u>Strobilurine</u> max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. <u>Boscalid+Pyraclostrobin</u> max 1 all'anno.
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		

segue SCHEDA DIFESA N°31 – RADICCHI

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas cichorii.</i> , <i>Erwinia carotovora.</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Nottue terricole (<i>Agrotis spp</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (1) Zeta-Cipermetrina (Piretroidi) (1) Teflutrin (Piretroidi) (1)	Soglia: inizio infestazione	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina. L'uso dei Piretroidi come geodisindestanti è indipendente dalle altre limitazioni previste per i piretroidi utilizzati contro altre avversità.
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Udea ferrugalis</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Spodoptera exigua</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Indoxacarb (4) Emamectina (solo pieno campo) (5) Clorantraniliprole (6) <i>Bacillus thuringiensis</i> Tebufenozide (7) (solo pieno campo)	Soglia: 5% di piante colpite	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina. (4) Indoxacarb: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità; ammesso su <i>H. armigera</i> , <i>S. littoralis</i> . (5) Emamectina: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Ammesso su <i>Spodoptera</i> (6) Clorantraniliprole: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (7) Tebufenozide: max 1 intervento all'anno solo contro <i>Spodoptera exigua</i> .
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Ureleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	1	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Deltametrina (Piretroidi) (1) Zetacipermetrina (Piretroidi) (1) Spirotetramat (5) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Zeta-Cipermetrina. (5) Spirotetramat: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°31 – RADICCHI

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	1	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Abamectina (solo pieno campo) (4) Etofenprox (Piretroidi) (1) Terpenoid blend QRD 460 (2) (solo serra)		(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Zeta-Cipermetrina. (4) Abamectina: max 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità e max 3 interventi per anno. (2) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Liriomiza (<i>Liriomyza spp.</i>)	1	<i>Azadiractina</i> Abamectina (solo pieno campo) (4)	Soglia: presenza di mine fogliari	(4) Abamectina: max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità e max 3 interventi per anno.
Miridi (<i>Lygus spp.</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (1)	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Zeta-Cipermetrina.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	Terpenoid blend QRD 460 (2) (solo serra) <i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i>		(2) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Lumache (<i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Ortofosfato di ferro	Soglia: presenza di forti infestazioni	

SCHEDE DISERBO N°31 – RADICCHI

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE - SEMINA PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Benfluralin Pendimetalin Acido pelargonico *		
POST - SEMINA POST TRAPIANTO	Graminacee e dicotiledoni	1	Propizamide Acido pelargonico *		
POST - EMERGENZA	Graminacee	1	Ciclofidim Quizalofop etil isomero D Quizalofop p etile Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N° 32 – INDIVIA RICCIA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2	Prodotti rameici <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS plantarum D747 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZ824 <i>Cerevisane</i> (solo serra) Metalaxil-M (2) + Rame Azoxistrobin (Strobilurine) (no serra) (3) Propamocarb+Fosetil-AI (5) Mandipropamide (CAA) (1) Dimetomorf (CAA) (1) Fosetil-AI (6) Ametoctradina (11) (solo pieno campo)		(1) CAA: max 2 interventi all'anno. (2) Metalaxil-M + Rame: max 1 intervento per ciclo colturale (3) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1. (5) Propamocarb+Fosetil-AI: max 2 interventi per ciclo vegetativo. (6) Fosetil-AI: max 3 interventi all'anno. (11) Ametoctradin: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2 per ciclo 3 per cicli lunghi	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma viride</i> <i>Pythium oligandrum</i> M1 (8) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS plantarum D747 <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. atroviride</i> (9) <i>Cerevisane</i> (solo serra) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 Cyprodinil (Anilino pirimidine) + Fludioxanil (4) Boscalid (SDHI)+Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) Fenexamid (7) Azoxistrobin (Strobilurine) (no serra) (3) *		(3) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1. (4) Cyprodinil+Fludioxanil: max 3 interventi per ciclo colturale. (7) Fenexamid: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (8) <i>Pythium oligandrum</i> M1: max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra (9) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia.
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	2	Zolfo Olio essenziale di arancio Azoxystrobin (Strobilurine) (3)		(3) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1.
Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)		<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS plantarum D747 <i>Streptomyces</i> <i>Cerevisane</i> (solo serra)		
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)		Prodotti rameici		
PARASSITI ANIMALI				
Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp)	1	Zeta-Cipermetrina (1)	Soglia: inizio infestazione	1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina.

SCHEDA DIFESA N° 32 – INDIVIA RICCIA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Heliolithis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> ecc..)	2	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Indoxacarb (3) Etofenprox (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (solo serra) (2) Emamectina (solo pieno campo) (5) Clorantraniliprole (6) Tebufenozide (7) (solo pieno campo) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (2)	Soglia: 5% di piante colpite	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina. (2) Spinosine (<i>Spinosad</i>, <i>Spinetoram</i>): max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (3) Indoxacarb: max 3 interventi anno indipendentemente avversità ammesso su <i>H. armigera</i> e <i>S. littoralis</i> . (5) Emamectina: max 2 interventi anno indipendentemente avversità; solo su <i>Spodoptera</i> . (6) Clorantraniliprole: max 2 interventi anno indipendentemente avversità; (7) Tebufenozide: max 1 intervento all'anno solo contro <i>Spodoptera exigua</i> .
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Ureleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	2	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Zetacipermetrina (Piretroidi) (1) Spyrotetramat (5) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina. (5) Spyrotetramat: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	1	<i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (solo serra) (2) <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Tau-fluvalinate (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Abamectina (no serra) (4) Acrinatrina (Piretroidi) (1) (solo pieno campo) Formentanato (Carbammato) (12) (solo pieno campo) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (2)		(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina; Acrinatrina max 1 intervento all'anno. (2) Spinosine (<i>Spinosad</i>, <i>Spinetoram</i>): max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (4) Abamectina: max 1 interventi per ciclo colturale, max 3 per anno, indipendentemente dall'avversità. (12) Formentanato (Carbammato): max 1 intervento per ciclo di coltivazione entro la fase di 4-6 foglie.
Liriomiza (<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>L. trifolii</i>)	2	<i>Spinosad</i> (solo serra)(2) <i>Azadiractina</i> Abamectina (solo pieno campo) (4)	Soglia: presenza di mine fogliari	(2) Spinosad: max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità (4) Abamectina: max 1 intervento per ciclo colturale, max 3 per anno, indipendentemente dall'avversità
Miridi (<i>Lygus spp.</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (1) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (1)	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Zeta-Cipermetrina.
Lumache e Limacce (<i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Ortofosfato di ferro	Soglia: presenza di forti infestazioni	

SCHEDA DISERBO N° 32 – INDIVIA RICCIA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE – SEMINA PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Benfluralin Propizamide Pendimetalin Acido pelargonico *		
POST TRAPIANTO	Graminacee e dicotiledoni	1	Acido pelargonico *		
POST - EMERGENZA	Graminacee	1	Ciclossidim Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N° 33 – INDIVIA SCAROLA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZ824 <i>Cerevisane</i> (solo serra) Metalaxil-M (2) + Rame Azoxistrobin (Strobilurine) (3) Propamocarb+Fosetil-Al (6) Mandipropamide (CAA) (1) Dimetomorf (CAA) (1) Fosetil-Al (6) Ametoctradina (11) (solo pieno campo)		(1) CAA : max 2 interventi all'anno. (2) Metalaxil-M + Rame max 1 intervento per ciclo colturale (3) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1. (6) Propamocarb+Fosetil-Al : max 2 per ciclo vegetativo. (6) Fosetil-Al : max 3 interventi all'anno. (11) Ametoctradin : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2 per ciclo 3 per cicli lunghi	<i>Trichoderma harzianum</i> (*) <i>Coniothyrium minitans</i> (*) <i>Pythium oligandrum</i> M1 (9) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS Plantarum D747 <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. atroviride</i> (10) <i>Cerevisane</i> (solo serra) Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 Cyprodinil (Anilinopirimidine) + Fludioxanil (4) Boscalid (SDHI)+Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) Fenexamid (7) Pyrimetanil (Anilinopirimidine) (8) Azoxistrobin (Strobilurine) (no serra) (3) *		(3) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1. (4) Cyprodinil+Fludioxanil : max 3 interventi per ciclo colturale. (7) Fenexamid : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (9) Pythium oligandrum M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (10) Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11) : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia.
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	2	Zolfo Olio essenziale di arancio Azoxystrobin (Strobilurine) (no serra) (3)		(3) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1.
Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)		<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS plantarum D747 <i>Streptomyces</i> <i>Cerevisane</i> (solo serra)		

segue SCHEDA DIFESA N° 33 – INDIVIA SCAROLA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Nottue terricole (<i>Agrotis spp</i>)	1	Lambdacialotrina (Piretroidi) (1)	Soglia: inizio infestazione	L'uso dei Piretroidi come geodisindestanti è indipendente dalle altre limitazioni previste per i piretroidi utilizzati contro altre avversità.
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	2	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad (Spinosine) (solo serra) (2)</i> Indoxacarb (3) Etofenprox (Piretroidi) (1) Emamectina (solo pieno campo) (5) Clorantraniliprole (6) Tebufenozide (7) (solo pieno campo) Spineteram (Spinosine) (2)	Soglia: 5% di piante colpite	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Lambdacialotrina e Zeta-Cipermetrina. (2) Spinosine (Spinosad, Spineteram): max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spineteram. (3) Indoxacarb: max 3 interventi anno indipendentemente avversità ammesso su <i>H. armigera</i> e <i>S. littoralis</i> . (5) Emamectina: max 2 interventi anno indipendentemente avversità; solo su <i>Spodoptera</i> . (6) Clorantraniliprole: max 2 interventi anno indipendentemente avversità (7) Tebufenozide: max 1 intervento all'anno solo contro <i>Spodoptera exigua</i> .
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Ureleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i> , <i>Nasonovia ribis nigri</i>)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Lambdacialotrina (Piretroidi) (1) (solo pieno campo) Spyrotetramat (5) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Lambdacialotrina e Zeta-Cipermetrina. (5) Spyrotetramat: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità

segue SCHEDA DIFESA N° 33 – INDIVIA SCAROLA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	1	<i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (solo serra) (2) <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Acrinatrina</i> (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) <i>Abamectina</i> (no serra) (4) <i>Formentanato</i> (Carbammato) (12) (solo pieno campo) <i>Spinetoram</i> (<i>Spinosine</i>) (2)		(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con <i>Lambdacialotrina</i> e <i>Zeta-Cipermetrina</i> . <i>Acrinatrina</i> max 1 intervento all'anno. (2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con <i>Spinetoram</i> . (4) Abamectina: max 1 intervento per ciclo colturale, max 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (12) Formentanato (Carbammato): max 1 intervento per ciclo di coltivazione entro la fase di 4-6 foglie.
Liriomiza (<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>L. trifolii</i>)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (solo serra) (2) <i>Abamectina</i> (no serra)(4)	Soglia: presenza di mine fogliari	(2) Spinosad: max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità. (4) Abamectina: max 1 2 intervento per ciclo colturale, max 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità
Lumache e Limacce (<i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>)	Esche avvelenate	<i>Metaldeide esca</i> <i>Ortofosfato di ferro</i>	Soglia: presenza di forti infestazioni	

SCHEDA DISERBO N° 33 – INDIVIA SCAROLA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE - SEMINA PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Benfluralin Acido pelargonico *		
PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Propizamide Pendimetalin Acido pelargonico *		
PRE - EMERGENZA	Graminacee e dicotiledoni	1	Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N° 34 – CICORIA (PAN DI ZUCCHERO)

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Cerevisane</i> (solo serra) Azoxistrobin (Strobilurine) (no serra)(3) Metalaxil-M + rame (2) Mandipropamide (CAA) (1) Dimetomorf (CAA) (1) Propamocarb+Fosetil-Al (6)(5) Fosetil-Al (6) Ametoctradina (10) (solo pieno campo)		(1) CAA : max 2 4 interventi all'anno. (2) Metalaxil-M + Rame : max 1 interventi per ciclo colturale (3) Strobilurine : max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1. (5) Propamocarb+Fosetil-Al : max 2 interventi per ciclo vegetativo. (6) Fosetil-Al : max 3 interventi all'anno. (10) Ametoctradin : max 2 interventi all'anno.
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2 per ciclo 3 per cicli lunghi	<i>Coniothyrium minitans</i> (*) <i>Trichoderma harzianum</i> (*) <i>Pythium oligandrum</i> M1 (8) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. atroviride</i> (9) <i>Cerevisane</i> (solo serra) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 Cyprodinil+Fludioxanil (4) Boscalid (SDHI)+Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) Fenexamid (7) Azoxistrobin (Strobilurine) (3) (no serra)*		(3) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1. (4) Cyprodinil+Fludioxanil , max 3 interventi per ciclo colturale. (7) Fenexamid : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (8) Pythium oligandrum M1 : max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra (9) Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11) : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia.
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	2	Zolfo Azoxystrobin (Strobilurine) (no serra) (3)		(3) Strobilurine max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. Boscalid+Pyraclostrobin max 1.
Septoria (<i>Septoria</i> spp.)				
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas cichorii</i> ., <i>Erwinia carotovora</i> .)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp)	1	Zeta-Cipermetrina (1)	Soglia: inizio infestazione	(1) Piretroidi : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina.

Segue SCHEDA DIFESA N° 34 – CICORIA (PAN DI ZUCCHERO)

Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> .)	2	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Etofenprox (Piretroidi) (1) Indoxacarb (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (1)	Soglia: 5% di piante colpite	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina. (4) Indoxacarb: max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità; ammesso su <i>H. armigera</i> e <i>S. littoralis</i> . (5) Emamectina: max 2 interventi anno indipendentemente avversità (6) Clorantraniliprole: max 2 interventi anno indipendentemente avversità
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Ureleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Spyrotetramat (5) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina. (5) Spyrotetramat: max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (1) Abamectina (solo pieno campo) (4) Terpenoid blend QRD 460 (2) (solo serra) <i>Sali potassici degli acidi grassi</i>		(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Zeta-Cipermetrina. (4) Abamectina: max 1 intervento per ciclo colturale e max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità (2) Terpenoid blend QRD 460: max 1 intervento per ciclo colturale.
Liriomiza (<i>Liriomyza spp.</i>)	2	<i>Azadiractina</i> Abamectina (solo pieno campo) (4)	Soglia: presenza di mine fogliari	(4) Abamectina: max 1 intervento per ciclo colturale e max 3 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Miridi (<i>Lygus spp.</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (1)	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Lambdacialotrina e Zeta-Cipermetrina.
Lumache e Limacce (<i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Ortofosfato di ferro	Soglia: presenza di forti infestazioni	

SCHEDA DISERBO N° 34 – CICORIA (PAN DI ZUCCHERO)

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE - SEMINA PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Benfluralin Propizamide Acido pelargonico *		
PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Propizamide Pendimetalin Acido pelargonico *		
PRE - EMERGENZA	Graminacee e dicotiledoni	1	Propizamide Acido pelargonico *		
POST - EMERGENZA	Graminacee	1	Ciclofidim Propizamide Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N° 35 – LATTUGA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Laminarina</i> <i>Cerevisane (solo serra)</i> Propamocarb (5) Fosetil-Al Metalaxil-M (2) Cimoxanil (4) Mandipropamide (CAA) (1) Azoxistrobin (Strobilurine) (no serra) (3) Pyraclostrobin (Strobilurine) (3)+Dimetomorf (CAA) (1) Ametoctradina (8)+ Dimetomorf (CAA) (1) Ametoctradina (8)+ Metiram (Ditiocarbammati) (9) (solo pieno campo) Flupicolide+Propamocarb (10) Almisulbrom (11) Metiram (Ditiocarbammati) (9) Oxathiapiprolin (15) (solo pieno campo) Ametoctradina (8) (solo pieno campo)		(1) CAA (Mandipropamide, Dimetomorf): max 1 intervento per ciclo colturale; max 3 interventi all'anno. (2) Metalaxil-M: max 1 intervento per ciclo colturale. (3) Strobilurine max 2 interventi indipendentemente dall'avversità (4) Cimoxanil: max 1 intervento per ciclo colturale (5) Propamocarb max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (8) Ametoctradina: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (9) Ditiocarbammati: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flupicolide+Propamocarb: al max 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Almisulbrom: al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (15) Oxathiapiprolin: al max 2 interventi per ciclo colturale e un max di 3 interventi all'anno.
Marciume basale (<i>Sclerotinia sclerotiorum.</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2 per ciclo 3 per cicli lunghi	Cyprodinil (Anilinopirimidine) (8) +Fludioxonil (5) Boscalid (SDHI) +Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) Fenexamid (7) Pyrimetanil (Anilinopirimidine) (solo su Botrite) (8) Fluopyram (SDHI) +Tryfloxystrobin (Strobilurine) (3) (12) Azoxistrobin (Strobilurine) (no serra) (3) * Fludioxonil (17) <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii</i> <i>Pythium oligandrum M1</i> (13) <i>Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride</i> (14) <i>Cerevisane (solo serra)</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600		(3) Strobilurine max 2 interventi indipendentemente dall'avversità (5) Cyprodinil+Fludioxonil, max 2 interventi per ciclo colturale; max 3 interventi all'anno. (7) Fenexamid: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (8) Anilinopirimidine: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (12) Fluopyram (SDHI) +Tryfloxystrobin max 1 intervento per anno indipendentemente dall'avversità (13) Pythium oligandrum M1: max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra. (17) Fludioxonil: max 2 interventi all'anno nel limite di 3 interventi all'anno fra Cyprodinil+Fludioxonil e Fludioxonil * Autorizzato contro <i>Sclerotinia</i> spp. (14) Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11) : max 5 interventi con dose massima complessiva di 3kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia.

Segue SCHEDA DIFESA N°35 – LATTUGA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Marciume del colletto (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1	<i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Tricoderma asperellum</i> <i>Streptomyces</i> <i>Tricoderma asperellum</i> + <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Bacillus subtilis</i> (solo pieno campo)		
Moria delle piantine (<i>Pythium spp.</i>)	1	<i>Tricoderma asperellum</i> <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Cerevisane</i> (solo serra) Propamocarb (15) Propamocarb + Fosetil-AL (16)		(15) Propamocarb: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (16) Propamocarb + Fosetil-AL: max 1 intervento solo in semenzaio.
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas cichorii, Erwinia carotovora.</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Nottue terricole (<i>Agrotis spp</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (1) Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1)	Soglia: infezione generalizzata	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Lambdacialotrina e Zeta-Cipermetrina.
Afidi (<i>Nasonovia ribis nigri, Myzus persicae, Ureleucon sonchi, Acyrthosiphon lactucae</i>)	2	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Lambdacialotrina (Piretroidi) (solo pieno campo) (1) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (1) Alfa-cipermetrina (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Spyrotetramat (5) Sulfoxaflor (10) (solo in pieno campo) <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i>	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con Alfacipermetrina e Zeta-Cipermetrina. (3) Neonicotinoidi: max 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (5) Spyrotetramat: max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (10) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo contro <i>Myzus persicae</i> .

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Notteue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Spodoptera exigua</i>)	2	Deltametrina (Piretroidi) (1) Indoxacarb (9) Alfaccipermetrina (Piretroidi) (1) Zetacipermetrina (Piretroidi) (1) Etofenprox (Piretroidi) (1) Metaflumizone (6) Emamectina (8) Clorantraniliprole (9) Metoxifenozone (10) Tebufenozide (7) (solo pieno campo) <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (2) <i>Nucleopolydnavirus (SpliNPV)</i>	Soglia: 5% di piante colpite	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Alfaccipermetrina e-Zeta-Cipermetrina. (2) Spinosad: max 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (6) Metaflumizone: max 2 interventi per anno indipendentemente avversità (9) Indoxacarb: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (8) Emamectina: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (9) Clorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (11) Metoxifenozone: massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Tebufenozide: max 1 intervento all'anno solo contro <i>Spodoptera exigua</i> in alternativa al metoxifenozone.
Tripidi (<i>Thrips spp.</i>)	1	<i>Spinosad</i> (2) <i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Abamectina (4) Etofenprox (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotenoide)(8) Terpenoid blend QRD 460 (12) (solo serra)		(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Zeta-Cipermetrina. (2) Spinosad: max 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (4) Abamectina max 1 intervento per ciclo colturale e max 3 interventi all'anno indipendentemente avversità (8) Acetamiprid: max 1 intervento per ciclo colturale. (12) Terpenoid blend QRD 460: max 1 intervento per ciclo colturale.
Liriomiza (<i>Liriomyza spp.</i>)	1	<i>Spinosad</i> (2) <i>Azadiractina</i> Abamectina (solo pieno campo) (4)	Soglia: presenza di mine fogliari	(2) Spinosad: max 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente avversità (4) Abamectina max 1 intervento all'anno indipendentemente avversità.
Miridi (<i>Lygus spp.</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (1)	Soglia: presenza	(1) Piretroidi: max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 per ciclo con-Zeta-Cipermetrina.
Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	1 (solo prima del trapianto)	Teflutrin (Piretroidi) (no serra) Zeta-cipermetrina granulata (Piretroidi) Lambdacialotrina (Piretroidi)	Soglia: infestazione generalizzata accertata con specifici monitoraggi o danni sul ciclo colturale precedente.	L'uso dei Piretroidi come geodisindestanti è indipendente dalle altre limitazioni previste per i piretroidi utilizzati contro altre avversità.
Lumache (<i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Ortofosfato di ferro esca	Soglia: presenza di forti infestazioni	
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)		<i>Estratto d'aglio</i> <i>Paecilomyces lilacinus</i>		

SCHEDA DISERBO N°35 – LATTUGA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Benfluralin Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE – SEMINA PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Propizamide Pendimetalin Clorprofam Acido pelargonico *		
POST – SEMINA POST - TRAPIANTO	Graminacee e dicotiledoni	1	Propaquizafop Ciclofidim Clorprofam Quizalofop-p-etile Acido pelargonico *		

* **PRODOTTO NON SELETTIVO. UTILIZZARE POMPE A SPALLA O IRRORATORI DOTATI DI ATTREZZATURE PROTETTIVE (SCHERMI O CAMPANE)**
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°36 – CAROTA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Alternariosi (<i>Alternaria dauci</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Azoxystrobin (Strobilurine) (1) Difeconazolo (IBE) (2) Pyrimetanil (solo pieno campo) (3) Boscalid (SDHI) (5) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (4)		(1) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (2) Difeconazolo (IBE): al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (3) Pyrimetanil al max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità. (4) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurine): al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) SDHI (Boscalid, Fluopyram): complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Marciumi basali: (<i>Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor, Rhizoctonia solani</i>)	1	<i>Coniothyrium minitans</i> * <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>		* Solo su Sclerotinia
Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)	1	<i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Azoxystrobin (Strobilurine) (1) Difeconazolo (IBE) (2) Boscalid (SDHI) (5) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) (4)		(1) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (2) Difeconazolo (IBE): al max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (4) Boscalid (SDHI)+ Pyraclostrobin (Strobilurine): al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) SDHI (Boscalid, Fluopyram): complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Moria delle piantine (<i>Pytium spp.</i>)		<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°36 – CAROTA

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Elateridi (<i>Agriotes spp</i>)	1	Teflurin Lambdacialotrina granulare (Piretroidi) (1) <i>Beauveria bassiana</i>	Soglia. Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.	(1) Piretroidi : max 2 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 lambacialotrina.
Mosca della carota (<i>Chamaepsila rosae</i>)	2	Deltametrina (Piretroidi) (1) <i>Azadiractina</i>	Soglia. Intervento ammesso limitatamente alle semine primaverili estive e nelle zone con ricorrenti attacchi del Dittero.	(1) Piretroidi : max 2 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 lambacialotrina.
Afidi (<i>Semiaphis dauci</i> , <i>Cavariella aegopodii</i>)	1	Deltametrina (Piretroide) (1) * Lambdacialotrina (Piretroide) (1) Tau-fluvalinate (Piretroide) (1) Maltodestrine <i>Azadiractina</i> <i>Piretrine pure</i>	Soglia. Accertata presenza su piante in fase d'accrescimento.	(1) Piretroidi : max 2 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 lambacialotrina. * Solo su <i>Cavariella aegopodii</i>
Patogeni tellurici (<i>Fusarium spp.</i> , ect...)	1 (solo ad anni alterni)	Metam Na (1) (2) Metam K (1) (2) Dazomet (1)	Soglia: presenza accertata.	(1) Metam Na, Metam K, Dazomet : trattamento ammesso sul singolo appezzamento solo ad anni alterni, Dazomet una volta ogni 3 anni. Nell'intervento con Dazomet al massimo utilizzare la dose di 50 g/mq. Nell'intervento con Metam Na o Metam K la dose max è di 1000 litri/anno/ettaro. (2) Metam Na, Metam K : impiegabili solo una volta ogni 3 anni
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>) Nematodi fogliari (<i>Ditylencus dipsaci</i>)	1	<i>Solarizzazione</i> <i>Pannelli di semi di brassica</i> <i>Vapore d'acqua</i> <i>Estratto di aglio (solo pieno campo)</i> <i>Paecilomyces lilacinus ceppo 251</i> Oxamyl (2) Fluopyram (SDHI) (solo pieno campo) (3) (5)	Soglia: presenza dei nematodi.	(2) Oxamyl : max 30 litri/ettaro di formulato commerciale per ciclo. Solo alla semina e in pre-semina. Localizzato lungo il solco di semina. (3) Fluopyram (SDHI) : max 1 intervento all'anno in pre-semina. (5) SDHI (Boscalid, Fluopyram) : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Lumache (<i>Deroceras spp.</i> , <i>Arion spp.</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Fosfato ferrico		

SCHEDA DISERBO N°36 – CAROTA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 gr/L)	
PRE – EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Clomazone Aclonifen (2) Metobromuron (3) Acido pelargonico *		
POST -EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Pendimetalin Metribuzin Acido pelargonico *		
	Graminacee	1	Propaquizafop Cletodim Cicloxidim Quizalofop etile isomero D Quizalofop-p-etile Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero ettari}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

(3) Solo in coltura per la produzione di sementi.

SCHEDA DIFESA N°37 – FINOCCHIO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)		<i>Prodotti rameici</i>	<i>Comparsa dei primi sintomi.</i>	
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum, S. minor</i>)	2	Ciprodinil+Fludioxonil (1) (solo pieno campo) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (2) <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Tricoderma asperellum</i> + <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Prodotti rameici</i>		(1) Ciprodinil+Fludioxonil: max 2 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (2) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina): max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.
Oidio (<i>Erysiphe umbelliferarum</i>)		<i>Zolfo</i>		
Septoriosi (<i>Septoria spp.</i>)		Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina) (2)		(2) Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurina): max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.
Marciumi basali (<i>Pythium spp.</i>)			Interventi agronomici: effettuare avvicendamenti ampi	
BATTERIOSI (<i>Erwinia carotovora.</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	1	Teflutrin.*	Soglia. Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.	* localizzato alla semina
Afidi (<i>Dysaphis spp, ecc.</i>)	1	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio minerale paraffinico</i> Lambdacialotrina (Piretroidi) (no serra) (1) <i>Maltodestrina</i>	Soglia. Accertata presenza su piante in fase d'accrescimento.	(1) Piretroidi: max 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Nottue fogliari (<i>Spodoptera spp.</i>)	1	Lambdacialotrina (Piretroidi) (no serra) (1) <i>Spinosad</i> <i>Bacillus thuringensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio minerale paraffinico</i>	Soglia: presenza accertata	(1) Piretroidi: max 1 intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Limacee e Lumache (<i>Deroceras spp., Arion spp.</i>)	Esche avvelenate1	<i>Metaldeide esca</i> <i>Fosfato ferrico</i>	Soglia: presenza accertata	

SCHEDA DISERBO N°37 – FINOCCHIO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE- EMERGENZA PRE- TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Clomazone Aclonifen (2) Metobromuron (3) Acido pelargonico *		
POST- EMERGENZA- TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Metribuzin (per coltura di finocchio trapiantato) Acido pelargonico *		
	Graminacee	1	Propaquizafop		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni due anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura precedente.

(3) Solo in coltura per la produzione di sementi in Pre-emergenza.

SCHEDA DIFESA N°38 – SEDANO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Septoria (<i>Septoria apiicola</i>)	4	Difenoconazolo (IBE) (1) Azoxystrobin (Strobilurine) (2) (no serra) Boscalid (SDHI) (3) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (in pieno campo) <i>Prodotti rameici</i>		(1) Difenoconazolo (IBE): max 3 interventi anno, indipendentemente dall'avversità (2) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (3) SDHI (Boscalid): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Cercosporiosi (<i>Cercospora apii</i>)	1	Azoxystrobin (Strobilurine) (2) (no serra) <i>Prodotti rameici</i>		(2) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)	1	Difenoconazolo (1) <i>Prodotti rameici</i>		(1) Difenoconazolo (IBE): max 3 interventi anno, indipendentemente dall'avversità.
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor</i>)	1	Boscalid (SDHI) (3) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (2) (in pieno campo) <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i>		(2) Strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin): max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (3) SDHI (Boscalid): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)		Zolfo Difenoconazolo (IBE) (1)		(1) Difenoconazolo (IBE): max 3 interventi anno, indipendentemente dall'avversità
Moria delle piantine (<i>Pithium spp</i>)	1	<i>Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i>		
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas marginalis</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°38 – SEDANO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Cavariella aegopodi</i> , <i>Dysaphis dauci</i> , <i>D. crataegi</i> , <i>spp.</i> <i>Myzus persicae</i> , <i>Semiaphis dauci</i>)	1	Lambdacialotrina (Piretroidi) (no serra) (1) <i>Maltodestrina</i> <i>Piretrine</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio minerale</i>	Soglia: infestazione generalizzata.	(1) Piretroidi : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Mosca minatrice (<i>Liriomyza spp.</i>)	1	Abamectina (3) <i>Azadiractina</i> <i>Diglyphus isaea</i> <i>Piretrine</i> <i>Olio minerale</i>	Soglia: infestazione generalizzata.	(3) Abamectina : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	1	<i>Spinosad</i> (2) <i>Piretrine</i> Terpenoid blend QRD 460 (4) (solo serra) Abamectina (3)	Soglia: infestazione generalizzata.	(2) Spinosad max 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (3) Abamectina : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Terpenoid blend QRD 460 : max 1 intervento per ciclo colturale.
Mosca del sedano (<i>Phyllophila heraclei</i>)	1	<i>Azadiractina</i> <i>Piretrine</i> <i>Olio minerale</i>	Soglia: infestazione generalizzata.	
Nottue fogliari (<i>Mamestra spp.</i> , <i>Spodoptera spp.</i>)	1	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (2) Lambdacialotrina (Piretroide) (no serra)(1)	Soglia: infestazione generalizzata.	(1) Piretroidi : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (2) Spinosad max 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Nottue terricole (<i>Agriotis spp.</i>)	1	Teflutrin <i>Azadiractina</i>	Soglia: infestazione generalizzata.	(1) Piretroidi : max 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Lumache e Limacee (<i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Fosfato ferrico	Soglia: infestazione generalizzata.	
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	Abamectina (3) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: infestazione accertata.	(3) Abamectina : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

SCHEDE DISERBO N°38 – SEDANO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
POST- TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Pendimetalin Acido pelargonico *		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N°39 – PREZZEMOLO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Septoria (<i>Septoria apiicola</i>)	4	Azoxystrobin (Strobilurina QOI) (1) <i>Prodotti rameici</i>		(1) Strobilurina QOI: max 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità di cui max 2 con Azoxystrobin.
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Metalaxil-M (3)		(3) Metalaxil-M: max 1 trattamento a ciclo colturale indipendentemente avversità
Sclerotinia , (<i>Sclerotinia spp.</i> , ,)	1	Pyraclostrobin (Strobilurina) (1) +Boscalid (SDHI) <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Pythium oligandrum</i> M1 (2) <i>Trichoderma harzianum</i>		(1) Strobilurina: max 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità di cui max 2 con Azoxystrobin. (2) Pythium oligandrum M1: max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra.
Rizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)		<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747		
Muffa grigia <i>Bptritris cinerea</i>	1	Fenaxamide (4)		(4) Fenhexamid: max 1 intervento all'anno.
Oidio (<i>Erisiphe spp.</i>)		Zolfo Olio essenziale di arancio		
Ruggine (<i>Puccinia petroselini</i> , <i>P. apii</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Moria delle piantine (<i>Pithium spp</i>)		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Streptomyces</i>		
BATTERIOSI (<i>Erwinia spp.</i> , <i>Pseudomonas marginalis</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°39 – PREZZEMOLO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Dysaphis spp.</i> <i>Myzus persicae</i>)	1	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) <i>Maltodestrina</i>	Soglia: infestazione generalizzata.	(3) Neonicotinoidi: max 1 trattamento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
Mosca minatrice (<i>Liriomyza spp.</i>)	1	<i>Spinosad (Spinosine)</i> (2) <i>Diglyphus isaea</i> <i>Azadiractina</i>	Soglia: infestazione generalizzata.	(2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Nottue fogliari (<i>Mamestra spp.</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Heliothis armigera</i> , ecc.)	1	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad (Spinosine)</i> (2) Metoxifenozone (3) (No serra) Clorantraniliprole (4) Spinetoram (Spinosine) (2)	Soglia: infestazione generalizzata.	(2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (3) Metoxifenozone max 1 intervento per anno indipendentemente dall'avversità (4) Clorantraniliprole max 2 interventi per anno indipendentemente dall'avversità
Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	Esche avvelenate	<i>Azadiractina</i>	Soglia: infestazione generalizzata.	
Lumache (<i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>)	Esche avvelenate	Metaldeide esca Fosfato ferrico	Soglia: infestazione generalizzata.	

SCHEDA DISERBO N°39 – PREZZEMOLO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido pelargonico *	30,4 (360 g/L)	
PRE-EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Metobromuron (2)		
POST- EMERGENZA	Dicotiledoni e Graminacee	1	Acido pelargonico * Quizalofop p etile		

* Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane)

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Solo in coltura per la produzione di sementi

SCHEDA DIFESA N°40 – BASILICO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Peronospora spp.</i>)	3	Metalaxil-M (1) Azoxystrobin (Strobilurina) (2) Mandipropamide (CAA) (9) Flupicolide+Propamocarb (5) Mancozeb (6) Pyraclostrobin (Strobilurina) (2) +Dimetomorf (CAA) (9) Dimetomorf (CAA) (9) <i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus amyloliquefacies</i> SBS <i>plantarum</i> D747		(1) Metalaxil-M: max 2 interventi per ciclo culturale. (2) Strobilurina Qel: max 2 interventi per ciclo, indipendentemente dall'avversità. (5) Flupicolide+Propamocarb max 3 interventi per anno, indipendentemente dall'avversità (6) Mancozeb max 3 interventi per anno, indipendentemente avversità (9) CAA (Dimetomorf, Mandipropamide): max 2 interventi per ciclo in pieno campo; Mandipropamide max 1 intervento per ciclo.
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia spp.</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	<i>Tricoderma spp.</i> <i>Tricoderma viride</i> <i>Tricoderma asperellum</i> + <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Coniothyrium minitans</i> (9) <i>Pythium oligandrum</i> M1 (8) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 Boscalid (SDHI)+Pyraclostrobin (Strobilurina) (2) Fenhexamide (4) Cyprodinil + Fludioxonil (10)		(2) Strobilurina Qel: max 1 intervento per ciclo o 2 per anno, indipendentemente dall'avversità (4) Fenhexamide max 2 interventi per anno, indipendentemente dall'avversità (8) Pythium oligandrum M1: max 4 interventi indipendentemente dall'avversità in pieno campo e serra . (9) Coniothyrium minitans: contro <i>Sclerotinia spp.</i> (10) Cyprodinil + Fludioxonil: max 2 interventi all'anno.
Marciumi del colletto (<i>Rhizoctonia solani</i>)		<i>Tricoderma asperellum</i> + <i>Tricoderma gamsii</i> <i>Tricoderma harzianum</i>		
Macchia nera (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Moria delle piantine (<i>Pythium spp.</i>)		<i>Trichoderma spp.</i> <i>Tricoderma asperellum</i> + <i>Tricoderma gamsii</i>		
Alternaria		<i>Prodotti rameici</i>		
Oidio		Zolfo		

Segue SCHEDA DIFESA N° 40 – BASILICO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (4) (NO SERRA) Maltodestrina Piretrine pure Azadiractina Sali potassici di acidi grassi	Soglia: presenza di forti infestazioni.	(4) Piretroidi : max 1 per anno indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1	Spinosad (Spinosine) (1) Piretrine pure Spinetoram (Spinosine) (1) Terpenoid blend QRD – 460 (solo in serra)	Soglia: presenza di forti infestazioni.	(1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (2) Terpenoid blend QRD – 460 : max 1 intervento per ciclo colturale.
Nottue fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> ecc.)	1	<i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Piretrine pure Spinosad (Spinosine) (1) Deltametrina (Piretroidi) (4) (NO SERRA) Metoxifenozide (5) (NO SERRA) Spinetoram (Spinosine) (1)	Soglia: presenza di infestazioni.	(1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : max 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (4) Piretroidi : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità; solo contro <i>spodoptera</i> . (5) Metoxifenozide max 1 intervento per anno indipendentemente dall'avversità
Nottue terricole (<i>Agrotis spp</i>)	Esche avvelenate		Soglia: presenza di infestazioni.	
Minatrice fogliare (<i>Lyriomiza spp.</i>)	1	Spinosad (1) Acetamiprid (6)		(1) Spinosad max 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (6) Acetamiprid : max 1 intervento per ciclo, max 2 interventi all'anno

SCHEDA DISERBO N°40 – BASILICO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
	NON AMMESSI INTERVENTI				

SCHEDA DIFESA N°41 – FUNGO PRATAIOLO O CHAMPIGNON

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Marciume secco (<i>Verticillium fungicola</i>)	1	Prochloraz (1)		(1) <u>Prochloraz</u> max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Marciume umido (<i>Mycogone perniciosa</i>)	1	Prochloraz (1)		1) <u>Prochloraz</u> max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Muffe verdi (<i>Tricoderma spp.</i>)	1	Prochloraz (1)		1) <u>Prochloraz</u> max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Tela di ragno (<i>Cladobotryum dendroides</i> - <i>Dactylium</i>)	1	Metrafenone (2)		(2) <u>Metrafenone</u> : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità;
PARASSITI ANIMALI				
Sciaridi (<i>Lycoriella spp.</i>)	1	Ciromazina (solo serra) (1) <i>Azadiractina</i>	Soglia: presenza	(1) <u>Ciromazina</u> max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Foridi (<i>Megaselia spp.</i>)	1	<i>Azadiractina</i> Ciromazina (solo serra) (1)	Soglia: presenza	(1) <u>Ciromazina</u> max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Cecidomidi (<i>Heteropeza pigmea</i>)	-		Soglia: presenza	
Acari	1	<i>Maltodestrina</i>		
Lumache	Esche avvelenate	Metaldeide esca. Fosfato ferrico	Soglia: presenza	

SCHEDA DISERBO N°41 – FUNGO PRATAIOLO O CHAMPIGNON

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N° 42 – ALTRE ORTICOLE

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DIFESA N° 42 – ALTRE ORTICOLE

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

COLTURE OFFICINALI

Scheda

1 - Colture officinali

SCHEDA DIFESA N° 1 – COLTURE OFFICINALI

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DIFESA N° 1 – COLTURE OFFICINALI

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

COLTURE FORAGGERE

Scheda

1 - Erbai autunno vernini

2 - Erba medica

3 - Favino

4 - Sulla, lupinella e trifogli annuali e biennali da foraggio

5 - Sulla, lupinella e trifogli da seme

6 - Prati polifiti

7 - Prati pascolo, Altre colture foraggere, Miscugli melliferi

SCHEDA DIFESA N° 1 – ERBAI AUTUNNO VERNINI

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N° 1 – ERBAI AUTUNNO VERNINI

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N° 2 – ERBA MEDICA

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
INSETTI				
Afidi	1	Deltametrina (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (1) <i>Piretrine</i>		(1) Piretroidi max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Apion (<i>Apion pisi</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (1)		(1) Piretroidi max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità
Fitonomo (<i>Hypera variabilis</i>)	1	Deltametrina (Piretroidi) (1) Lambdacialotrina (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Cipermetrina (Piretroidi) (1)		(1) Piretroidi max 1 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità

SCHEDA DISERBO N° 2 – ERBA MEDICA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido Pelargonico	30,4 (360g/L)	
POST-EMERGENZA	Dicotiledoni	1	Propizamide (ammessa solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che non potranno superare il 50% dell'intera superficie)		
		1	Imazamox (ammesso solo il 1° anno) Piridate		
	Graminacee	1 (trattamento non ammesso il primo anno di impianto)	Cletodim Quizalofop etile isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop		

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N° 3 – FAVINO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N° 3 – FAVINO

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% DI P.A.	L. O KG / HA
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	1	Glifosate (1) Acido Pelargonico	30.4 (360 g/L)	
PRE- EMERGENZA	Graminacee e Dicotiledoni	1	Pendimetalin Imazamox (2) Aclonifen Imazamox+Pendimetalin Clomazone Metribuzin		
POST- EMERGENZA	Graminacee e Dicotiledoni	1	Propaquizafop Cicloxidim Imazamox (2) Bentazone Quizalofop-p-etile		

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(2) Imazamox: utilizzabile o in Pre-emergenza o in Post-emergenza.

SCHEDA DIFESA N° 4 – SULLA, LUPINELLA, TRIFOGLI ANNUALI E BIENNALI DA FORAGGIO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N° 4 – SULLA, LUPINELLA, TRIFOGLI ANNUALI E BIENNALI DA FORAGGIO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N° 5 – SULLA, LUPINELLA E TRIFOGLI DA SEME (Solo coltivazioni da seme)

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N° 5 – SULLA, LUPINELLA E TRIFOGLI DA SEME (Solo coltivazioni da seme)

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% DI P.A.	L. O KG / HA
POST –EMERGENZA	Dicotiledoni e graminacee	1	Propizamide (solo Sulla e Lupinella) Bentazone + Imazamox (solo Trifogli da seme)	35,9 43,1 + 2	2 L/ha 1,25 L/ha

SCHEDA DIFESA N° 6 – PRATI POLIFITI

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N° 6 – PRATI POLIFITI

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N° 7 – PRATI PASCOLO, ALTRE COLTURE FORAGGERE, MISCUGLI MELLIFERI

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N° 7 – PRATI PASCOLO, ALTRE COLTURE FORAGGERE, MISCUGLI MELLIFERI

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

COLTURE FRUTTICOLE

Scheda

1 - Actinidia

2 - Melo

3 - Pero

4 - Albicocco

5 - Ciliegio

6 - Pesco

7 - Susino

8 - Nocciolo

9 - Kaki

10 - Mandorlo

11 - Noce da frutto

12 - Cotogno

13 - Castagno da frutto

SCHEDA DIFESA N° 1 – ACTINIDIA

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	-		<u>Interventi agronomici</u> Contenere lo sviluppo vegetativo e favorire l'areggiamento dei frutti	
Marciume del colletto (<i>Phytophthora</i> spp.)	1	Metaxil – M (1) <i>Prodotti rameici</i>	Intervenire solo sugli impianti colpiti	(1) Metlaxil-M: sospendere i trattamenti almeno 180 giorni prima della raccolta.
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas</i> spp.)		<i>Bacillus amyloliquefacis</i> SBS <i>plantarum</i> D747,(6) <i>Prodotti rameici</i> Acibenzolar-S-methyl	<u>Interventi agronomici</u> - Impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende vivaistiche autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 214/2005 - Effettuare concimazioni equilibrate - Effettuare una potatura che consenta un buon areggiamento della chioma - Effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con Sali di ammonio quaternari (benzalconio cloruro) - Disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi - Evitare irrigazioni sovrachioma - Monitorare frequentemente gli impianti - Tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 cm al di sotto dell'area colpita.	(6) <i>Bacillus amyloliquefacis</i> SBS <i>plantarum</i> D747: max 6 interventi da impiegare preferibilmente in fioritura.
PARASSITI ANIMALI				
Cocciniglia (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	1	<i>Olio minerale</i> (1) Spirotetramat (6)	Soglia: presenza	(1)Olio minerale: non impiegare dopo la "gemma gonfia" in formulazioni in miscela con lo zolfo. (6) Spirotetramat: max 1 intervento all'anno.

segue SCHEDE DIFESA N° 1 – ACTINIDIA

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>)	1	<i>Bacillus thuringiensis</i> Etofenprox (5)	Soglia: 50 adulti/trappola/settimana dall'inizio del secondo e del terzo volo.	(5) Piretroidi (Etofenprox, Deltametrina): complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox e max 2 interventi con Deltametrina indipendentemente dall'avversità.
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	1	Deltametrina (5) Etofenprox (5)	Soglia : presenza	(5) Piretroidi (Etofenprox, Deltametrina): complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox e max 2 interventi con Deltametrina indipendentemente dall'avversità.
Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	1	<i>Olio essenziale di arancio dolce</i> Etofenprox (5) Deltametrina (5)	Soglia: infestazione in atto	(5) Piretroidi (Etofenprox, Deltametrina): complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox e max 2 interventi con Deltametrina indipendentemente dall'avversità.

SCHEDA DISERBO N° 1 – ACTINIDIA

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u> <u>(5) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.</u>	Glifosate (5) Carfentrazone (1) Pyraflufen-ethile (2) Isoxaben + Oryzalin (4)	30,40 6,45 2,6 34,86 10 + 37,9	 9 l/ha 1 l/ha 0.8 l/ha per trattamento; max 1.6 l/ha anno 6,5 l/ha 5 l/ha	(1) Carfentrazone per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 l/ha come spollonante. (2) Pyraflufen-ethile: spollonante, da usarsi in alternativa al Carfentrazone (4) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie. (5) Glifosate: max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30.4%) se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione.

(5) Glifosate il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie. Per tutte le altre sostanze attive la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie.</u>	Isoxaben + Oryzalin (4)	10 + 37,9	5 l/ha	(4) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie.
---------------------------	---	-------------------------	-----------	---------------	---

SCHEDE DIFESA N° 2 – MELO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	15	<p><i>Prodotti rameici</i> <i>Laminarina</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Zolfo</i></p> <p>Fenbuconazolo (IBE) (1) Penconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Tetraconazolo (IBE) (1) Myclobutanil (IBE) (CS) (1) Difenconazolo (IBE) (CS) (1) Cyprodinil (Anilopirimidine) (2) (11) Pirimetanil (Anilopirimidine)(2) Fluazinam (12) Dithianon (9) Dodina (10) Boscalid (SDHI) (7)+Pyraclostrobin (Strobilurina) (3) Trifloxystrobin (Strobilurina) (3) Metiram (Ditiocarbammati) (4) Mancozeb (Ditiocarbammati) (4) Captano (9) Pyraclostrobin (Strobilurina) (3) Penthiopyrad (SDHI) (7) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) +Fluopyram (SDHI) (7) (11) Fosfonato di K (13) Fluxapyroxad (SDHI) (7) Flutriafol (IBE) (1) Fosetil AI (13) Fluopyram (SDHI) + Fosetil AI (13) (7)</p>	<p>Cadenzare i trattamenti a turno biologico o a turno fisso allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza del fungicida.</p> <p>Interrompere i trattamenti, o ridurli sensibilmente, dopo la fase del frutto nocivo in assenza della malattia.</p>	<p>(1) IBE al max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 con IBE CS (Candidati sostituzione). Si consiglia l'uso degli IBE in miscela con altri fungicidi.</p> <p>(2) Anilopirimidine (Cyprodinil, Pirimetanil) al max 4 interventi l'anno indipendentemente avversità.</p> <p>(11) Cyprodinil al max 2 interventi l'anno.</p> <p>(3) Strobilurine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(4) Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram): complessivamente max 7 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 4 interventi con Mancozeb e max 3 interventi con Metiram.</p> <p>(7) SDHI (Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram, Fluxapyroxad): complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Boscalid max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(9) Dithianon e Captano: al max 10 trattamenti all'anno, in alternativa fra loro, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(10) Dodina: al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>(11) Tebuconazolo+Fluopyram: al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(12) Fluazinam: al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>(13) Fosfonato di K, Fosetil A.: complessivamente max 10 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità di cui al massimo 6 interventi con Fosfonato di K.</p>

Segue SCHEDA DIFESA N° 2 – MELO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Mal bianco (<i>Oidium farinosum</i>)	4	Zolfo Bicarbonato di Potassio Fenbuconazolo (IBE) (1) Penconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Tetraconazolo (IBE) (1) Myclobutanil (IBE) (CS) (1) Difenconazolo (IBE) (CS) (1) Trifloxystrobin (Strobilurina) (3) Boscalid (SDHI) (7) +Piraclostrobin (Strobilurina) (3) Bupirimate Pyraclostrobin (Strobilurina) (3) Cyflufenamide (8) Penthiopyrad (SDHI) (7) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) + Fluopyram (SDHI) (7) (11) Fluxapyroxad (SDHI) (7) Meptyldinocap (6) Flutriafol (IBE) (1)		(1) IBE al max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 con IBE CS (Candidati sostituzione). Si consiglia l'uso degli IBE in miscela con altri fungicidi. (2) Cyprodinil, Pirimetanil al max 4 interventi l'anno con ciascuno di essi. (3) Strobilurine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Meptyldinocap massimo 2 interventi l'anno (7) SDHI (Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram, Fluxapyroxad): complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Boscalid max 3 intarventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) Cyflufenamide massimo 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Tebuconazolo+Fluopyram: al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cancri e disseccamenti rameali (<i>Nectria galligena</i>)		<i>Prodotti rameici</i>	Interventi chimici: di norma si prevede di intervenire in autunno prima della completa defogliazione e in primavera a ingrossamento gemme. Nei frutteti giovani od in quelli gravemente colpiti è opportuno intervenire in autunno anche a metà caduta foglie.	
Marciume del colletto (<i>Phytophthora spp.</i>)	2 (solo interventi localizzati nelle aree colpite)	Fosetil-Al Metalaxil-M <i>Prodotti rameici</i>	Comparsa dei primi danni negli impianti	
Marciume dei frutti (<i>Gloeosporium album</i>)	1	Boscalid (SDHI) (7) +Piraclostrobin (Strobilurina) (3) Pyrimethanil + Fludioxonil (15) Fludioxonil (16)	Interventi chimici Solo in preraccolta	(3) Strobilurine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (15) Pyrimethanil + Fludioxonil: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (16) Fludioxonil: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N° 2 – MELO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Patina bianca <i>Tilletiopsis spp.</i>			<u>Interventi agronomici</u> - evitare sesti d'impianto troppo fitti; - evitare eccessivo sviluppo vegetativo con uso contenuto delle concimazioni fogliari azotate; - favorire areazione della chioma con potature invernali equilibrate e utilizzo razionale del sistema di irrigazione a goccia.	

Segue SCHEDA DIFESA N° 2 – MELO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Cocciniglia di S. José (<i>Comstockaspis perniciososa</i>)	2	<i>Olio minerale</i> Phosmet (Estere fosforico) (1) Pyriproxyfen (11) Spirotetramat (12) Sulfoxaflor (13)	Soglia. Reale presenza dell'insetto sulle piante	(1) Esteri fosforici (Fosmet) : complessivamente max 4 trattamenti all'anno indipendentemente dalle avversità, con Fosmet max 2 interventi, indipendentemente dall'avversità. (11) Pyriproxyfen : max 1 intervento in pre-fioritura (12) Spirotetramat : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità, solo in post fioritura. (13) Sulfoxaflor : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	2	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Pirimicarb (14) Flonicamid (10) Spirotetramat (12) Sulfoxaflor (13) Flupyradifurone (15)	Soglia. Reale presenza dell'insetto sulle piante	(2) Piretroidi (Tau-Fluvalinate, Etofenprox, Lambda-cialotrina, Deltametrina, Betaciflutrin) : complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità con Tau-Fluvalinate al max 2 interventi all'anno, con Lambda-cialotrina max 1 intervento ed Etofenprox al max 1 intervento. (3) Acetamiprid (Neonicotinoidi) : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità; si consiglia l'impiego in pre-fioritura. (12) Spirotetramat : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità, solo in post fioritura. (13) Sulfoxaflor max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Pirimicarb : max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità. (15) Flupyradifurone : max 1 intervento ad anni alterni indipendentemente dall'avversità
Afide verde (<i>Aphis pomi</i>)	1	<i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Flonicamid (10) Spirotetramat (12) Sulfoxaflor (13) Flupyradifurone (15)	Soglia. Presenza di danni da melata.	(3) Acetamiprid (Neonicotinoidi) : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità; si consiglia l'impiego in pre-fioritura. (12) Spirotetramat : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità, solo in post fioritura. (13) Sulfoxaflor max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (15) Flupyradifurone : max 1 intervento ad anni alterni indipendentemente dall'avversità

Segue SCHEDA DIFESA N° 2 – MELO

<p>Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)</p>	<p>6</p>	<p><i>Confusione e disorientamento sessuale.</i> <i>Virus della granulosa.</i> <i>Spinosad (Spinosine) (5)</i> Fosmet (Estere fosforico) (1) Metoxifenozone (IGR) (13) Tefubenzozide (IGR) (4) Triflumuron (IGR) (4) (11) Etofenprox (Piretroidi) (2) Chlorantraniliprole (9) Emamectina (10) Spinetoram (Spinosine) (5) Thiacloprid (Neonicotenioidi) (12) Acetamiprid (Neonicotenioidi) (3)</p>	<p>Soglia: obbligatorio installare le trappole - 2 adulti/trappola in una o due settimane; - 0,5 - 1% di frutti con fori iniziali di penetrazione su almeno 100-500 frutti/ha La soglia non è vincolante per la Confusione ed il Disorientamento sessuale.</p>	<p>(1) Esteri fosforici (Fosmet): complessivamente max 4 trattamenti all'anno indipendentemente dalle avversità con Fosmet max 2 interventi indipendentemente dall'avversità. (4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spinosine (Spinosad + Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; Spinetoram al max 1 intervento l'anno indipendentemente dalle avversità; Spinosad al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (2) Piretroidi (Tau-Fluvalinate, Etofenprox, Lambda-cialotrina, Deltametrina, Betaciflutrin): complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità con Tau-Fluvalinate al max 2 interventi, con Lambda-cialotrina max 1 intervento ed Etofenprox al max 1 intervento. (9) Chlorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Emamectina: Max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Triflumuron: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Thiacloprid (Neonicotenioidi): max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (13) Metoxifenozone (IGR): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Acetamiprid (Neonicotenioidi): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>
<p>Cidia del pesco (<i>Cydia molesta</i>)</p>	<p>1</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Confusione e disorientamento sessuale</i> <i>Spinosad (Spinosine) (5)</i> Metoxifenozone (IGR) (13) Triflumuron (IGR) (4) (11) Etofenprox (Piretroidi) (2) Emamectina (10) Chlorantraniliprole (9) Spinetoram (Spinosine) (5)</p>	<p>Soglia: presenza di ovideposizione o fori di penetrazione su almeno 1% dei frutti controllando almeno 100 frutti per ha La soglia non è vincolante per la Confusione ed il Disorientamento sessuale.</p>	<p>(4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spinosine (Spinosad + Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; Spinetoram al max 1 intervento l'anno indipendentemente dalle avversità; Spinosad al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (2) Piretroidi (Tau-Fluvalinate, Etofenprox, Lambda-cialotrina, Deltametrina, Betaciflutrin): complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità con Tau-Fluvalinate al max 2 interventi, con Lambda-cialotrina max 1 intervento ed Etofenprox al max 1 intervento. (10) Emamectina: Max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (9) Chlorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Triflumuron: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Metoxifenozone (IGR): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>

Segue SCHEDA DIFESA N° 2 – MELO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Pandemis (<i>Pandemis cerasana</i>) Archips (<i>Archips podanus</i>)	2	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (5) Tefubenzozide (IGR) (4) Metoxifenozide (IGR) (13) Indoxacarb (3) Emamectina (10) Chlorantraniliprole (9) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (5)	Soglia: obbligatorio installare le trappole - generazione svernante: 20% degli organi occupati da larve; - generazioni successive: 15 adulti di Pandemis per trappole in 2 settimane o 30 adulti come somma delle due specie o con il 5% dei germogli infestati	(4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (5) <u>Spinosine (Spinosad + Spinetoram)</u> : complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; Spinetoram al max 1 intervento l'anno indipendentemente dalle avversità; Spinosad al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (10) <u>Emamectina</u> : Max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (9) <u>Chlorantraniliprole</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) <u>Indoxacarb</u> : max 4 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità (13) <u>Metoxifenozide (IGR)</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>) (<i>Argyrotaenia ljugiana</i>)	1	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (5) Tefubenzozide (IGR) (4) Metoxifenozide (IGR) (13) Indoxacarb (3) Emamectina (10) Chlorantraniliprole (9) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (5)	Soglia: - I° generazione 5% di getti infestati; - II° e III° generazione 50 adulti per trappola o con il 5% dei germogli infestati.	(4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (5) <u>Spinosine (Spinosad, Spinetoram)</u> : complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; Spinetoram al max 1 intervento l'anno indipendentemente dalle avversità; Spinosad al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (10) <u>Emamectina</u> : Max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (9) <u>Chlorantraniliprole</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) <u>Indoxacarb</u> : max 4 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (13) <u>Metoxifenozide (IGR)</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotenoide) (3) Deltametrina (Piretroidi) (2) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2) Etofenprox (Piretroidi) (2) (15) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (2) Triflumuron (IGR) (4) (11) <i>Piretrine</i>	Soglia: presenza	(3) <u>Acetamiprid (Neonicotenoide)</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) <u>Piretroidi (Tau-Fluvalinate, Lambda-cialotrina, Etofenprox, Deltametrina, Betaciflutrin)</u> : complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità con Tau-Fluvalinate al max 2 interventi, con Lambda-cialotrina max 1 intervento ed Etofenprox al max 1 intervento all'anno. (15) <u>Etofenprox (Piretroidi)</u> : per questa avversità trattamento in più rispetto al conteggio con gli altri piretroidi. (4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (11) <u>Triflumuron</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità

Segue SCHEDA DIFESA N° 2 – MELO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Litocollete (<i>Phyllonoricter spp.</i>)	1	<i>Spinosad</i> (5) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Emamectina (10) Chlorantraniliprole (9) Spinetoram (5)	Soglia: 2 mine con larve vive per foglia giustificano il trattamento sulla generazione successiva.	(3) Acetamiprid (Neonicotinoidi): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Spinosine (Spinosad + Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; Spinetoram al max 1 intervento l'anno indipendentemente dalle avversità; Spinosad al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (10) Emamectina: Max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (9) Chlorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Cemiosstoma (<i>Leucoptera malifoliella</i>)	2	<i>Spinosad</i> (5) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Emamectina (10) Chlorantraniliprole (9) Spinetoram (5)	Soglia: - ovodeposizione su almeno il 20% delle foglie delle rosette sulla prima generazione; - 20 mine con larve vive su 100 foglie sulla seconda generazione; - 10 mine con larve vive su 100 foglie sulla terza.	(3) Acetamiprid (Neonicotinoidi): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Spinosine (Spinosad + Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; Spinetoram al max 1 intervento l'anno indipendentemente dalle avversità; Spinosad al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (10) Emamectina: Max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (9) Chlorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Rodilegno rosso (<i>Cossus cossus</i>)		Catture massali con trappole a feromoni		
Rodilegno giallo (<i>Zeuzera pyrina</i>)		Catture massali con trappole a feromoni Triflumuron (IGR) (4) (11)		(4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (11) Triflumuron: max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità.
Orgia (<i>Orgyia antiqua</i>)	1	<i>Bacillus thuringensis</i>	Soglia: presenza di attacchi larvali	

Segue SCHEDA DIFESA N° 2 – MELO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Afide lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Spirotetramat (12) Pirimicarb (14) Sulfoxaflor (13)	Soglia: 10 colonie vitali su 100 organi controllati	(3) Acetamiprid (Neonicotinoidi): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Spirotetramat: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità. (13) Sulfoxaflor max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Pirimicarb: max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità.
Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Proteine idrolizzate</i> <i>Attract and Kill con Deltametrina</i> Deltametrina (Piretroidi) (2) Betacyflutrin (Piretroidi) (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3)	Soglia: presenza di prime punture fertili	(2) Piretroidi (Tau-Fluvalinate, Lambda-cialotrina, Etofenprox, Deltametrina, Betacyflutrin): complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità con Tau-Fluvalinate al max 2 interventi, con Lambda-cialotrina max 1 intervento ed Etofenprox al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Acetamiprid (Neonicotinoidi): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	1	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Clofentezine Piridaben Etoxazole Exitiazox Fenpiroximate (15) Tebufenpirad Milbemectina Abamectina Acequinocyl Bifenazate Cyflumetofen	Soglia: 90% di foglie interessate dal fitofago	(15) Fenpiroximate: max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità.
Cicaline	1	Indoxacarb (3)		(3) Indoxacarb: max 4 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità.
Cervi, Daini, Caprioli, Camosci	1	<i>Grasso di pecora</i>		

SCHEDA DISERBO N° 2 – MELO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila.</u> <u>L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u>	Glifosate (1) MCPA Fluroxypir (8) Carfentrazone (2) Pyraflufen-ethile (3) Oxifluorfen (9) (CS) Pendimetalin (9) (CS) Diflufenican (9) (CS) Isoxaben (4) Isoxaben + Oryzalin (7)	30.40 20 20.6 6,45 2.6 22 40 42 45,5 10 + 37.9	9 l/ha 1,5 l/ha 1.5 l/ha 1 l/ha 0.8 l/ha 2 l/ha 3 l/ha 0,5-0,6 l/ha 1,2 l/ha 3.75 l/ha	(1) Glifosate : max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30.4%) se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione. (2) Carfentrazone : impiegabile come spollonante alla dose di 1 l/ha o come diserbante fogliare alla dose di 0,3 l/ha. In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 l/ha. (3) Pyraflufen-ethile : spollonante, da usarsi in alternativa al Carfentrazone o come sinergizzante di altri erbicidi. (4) Isoxaben : fine inverno, primavera fino alla fioritura solo in pre-emergenza dicotiledoni in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (6) Propaquizafop : max 1 intervento all'anno. (7) Isoxaben + Oryzalin : max 1 intervento all'anno in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (8) Fluroxypir : max 1 trattamento. (9) Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican : max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie. (CS): Candidati alla sostituzione
Graminacee	(1) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.	Ciclossidim Propaquizafop (6)	10.80 9,60	2-5 l/ha 0,8-2 l/ha	

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican. Per tutte le altre sostanze attive la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

Non ammessi:

- Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione;
- Interventi chimici nelle interfile.

L'uso dei diserbanti può essere opportuno quando:

- vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2.
- le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per il pero).

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u>	Pendimetalin	40	3 l/ha	(3) Oxyfluorfen: in bande lungo la fila tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio e SOLO SU ASTONI e non su piante innestate. (4) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie (5) Diflufenicam: solo contro le dicotiledoni (7) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino allo stadio di fine fioritura.
		Oxyfluorfen (3)	22	2 l/ha	
		Diflufenican+Glifosate	3,48-21,76	4-6 l/ha	
		Isoxaben (4)	45,5	1,2 l/ha	
		Diflufenican (5)	42	0,5 -0.6 l/ha	
Isoxaben + Oryzalin (7)	10 + 37.9	5 l/ha			

SCHEDE DIFESA N° 3 – PERO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	10	<p><i>Prodotti rameici</i> <i>Laminarina</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Zolfo</i></p> <p>Fenbuconazolo (IBE) (1) Penconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Tetraconazolo (IBE) (1) Myclobutanil (IBE) (CS) (1) Difenconazolo (IBE) (CS) (1) Cyprodinil (Anilinoipirimidine) (2) (10) Pirimetanil (Anilinoipirimidine) (2) Dithianon (8) Captano (8) Dodina (9) Boscalid (SDHI)(5)+Piraclostrobin (Strobilurina) (3) Trifloxystrobin (Strobilurina) (3) Metiram (Ditiocarbammati) (12) Ziram (Ditiocarbammati) (6) Piraclostrobin (Strobilurina) (3) Penthiopyrad (SDHI) (5) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) + Fluopyram (SDHI) (5) (11) Fosfonato di K (14) Fluxapyroxad (SDHI) (5) Mancozeb (Ditiocarbammati) (4) (16) Fluopyram (SDHI) (5) + Fosetil AI (14) Fosetil AI (14) Ditianon (8) + Pyrimethanil (Anilinoipirimidine) (2) Ditianon (8) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) Ditianon (8) + Fosfanati di K (14)</p>	<p>Cadenzare i trattamenti a turno biologico o a turno fisso allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza del fungicida.</p> <p>Interrompere i trattamenti, o ridurli sensibilmente, dopo la fase del frutto nocce in assenza della malattia.</p>	<p>(1) IBE al max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 con IBE CS (Candidati sostituzione).</p> <p>(2) Anilinoipirimidine (Cyprodinil, Pirimetanil) al max 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(10) Cyprodinil al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Strobilurine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) SDHI (Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram, Fluxapyroxad): max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Boscalid max 3 interventi all'anno, con Fluxapyroxad max 3 interventi, all'anno, con Penthiopirad max 2 interventi all'anno, con Fluopyram max 3 interventi all'anno.</p> <p>(6) Ziram: al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(12) Metiram: al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, impiegabile fino al 15 giugno.</p> <p>(8) Dithianon, Captano: complessivamente max 8 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(9) Dodina: al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>(11) Tebuconazolo+Fluopyram: al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>(14) Fosfonato di K, Fosetil AI: complessivamente al max 6 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(16) Mancozeb: max 2 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>

Segue SCHEDE DIFESA N° 3 – PERO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE Maculatura bruna (<i>Stemphiliium vesicarium</i>)	6	<p><i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus amyloliquefacis.plantarum, D747</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii</i></p> <p>Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Trifloxystrobin (Strobilurina) (3) Piraclostrobin (Strobilurina) (3) Boscalid (SDHI) (5) Penthiopirad (SDHI) (5) Fludioxonil+Ciprodinil (Anilinopirimidine) (2) (10) Ziram (Ditiocarbammati) (6) Mancozeb (Ditiocarbammati)(16) Piraclostrobin (Strobilurina) (3) Fluazinam (12) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) + Fluopyram (SDHI) (5) (11) Fluxapyroxad (SDHI) (5) Cyprodinil (10) Captano (8) Fosfonato di K (14) Ditianon (8) + Pyrimethanil (Anilinopirimidine) (2) Ditianon (8) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (3) Ditianon (8) + Fosfanati di K (14) Fosetil AI (14) Fluopyram (SDHI) (5) + Fosetil AI (14)</p>	<p>Interventi agronomici: Limitare l'irrigazione, in particolare quella soprachiuma Interrare le foglie colpite trattate preventivamente con urea Raccogliere e distruggere i frutti colpiti</p> <p>Interventi chimici: Nei pereti colpiti in forma grave nell'anno precedente si prevedono interventi a cadenza di 6 - 8 giorni con particolare attenzione nei periodi caratterizzati da prolungata bagnatura. Per contro, nei pereti ancora indenni, si consiglia di effettuare rilievi settimanali allo scopo di poter intervenire alla comparsa delle prime macchie.</p> <p>Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali</p>	<p>(1) IBE al max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 con IBE CS (Candidati sostituzione).</p> <p>(3) Strobilurine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) SDHI (Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram, Fluxapyroxad): max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Boscalid max 3 interventi all'anno, con Fluxapyroxad max 3 interventi, all'anno, con Penthiopirad max 2 interventi all'anno, con Fluopyram max 3 interventi all'anno.</p> <p>(2) Anilinopirimidine (Cyprodinil, Pirimetanil) al max 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(8) Dithianon, Captano: complessivamente max 8 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(10) Cyprodinil al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità da solo o in alternativa al Fludioxonil.</p> <p>(6) Ziram (Ditiocarbammati): al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(12) Fluazinam: al massimo 4 interventi all'anno, possibili rischi di fitotossicità con olio bianco.</p> <p>(11) Tebuconazolo+Fluopyram: al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>(14) Fosfonato di K, Fosetil AI: complessivamente al max 6 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(16) Mancozeb: max 2 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>

Segue SCHEDA DIFESA N° 3 – PERO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cancri e disseccamenti rameali (<i>Nectria galligena</i>)		Prodotti rameici		
Marciume del colletto (<i>Phytophthora cactorum</i>)	1	Fosetil-Al		
Marciume dei frutti (<i>Gloeosporium album</i>)	1	Boscalid (SDHI) (5) +Piraclostrobin (Strobilurina) (3) Fludioxonil (7)		(3) Strobilurine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) SDHI (Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram): Boscalid max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Penthiopirad max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. Con SDHI max 4 interventi all'anno indipendentemente avversità. (7) Fludioxonil: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Patina bianca <i>Tilletiopsis</i> spp.			Interventi agronomici - evitareesti d'impianto troppo fitti; - evitare eccessivo sviluppo Vegetativo con uso contenuto delle concimazioni fogliari azotate; - favorire areazione della chioma con potature invernali equilibrate e utilizzo razionale del sistema di irrigazione a goccia.	

PARASSITI ANIMALI				
Cocciniglia di S. José (<i>Comstockaspis pernicioso</i>)	2	<i>Olio minerale</i> Phosmet (Estere fosforico) (1) Pyriproxyfen (11) Spirotetramat (12) Sulfoxaflor (13)	Soglia. Reale presenza dell'insetto sulle piante	(1) Fosmet (Estere fosforico): max 2 interventi indipendentemente dall'avversità. (11) Pyriproxyfen: max 1 intervento in pre-fioritura (12) Spirotetramat: al max 2 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità. Max 1 intervento sulla singola avversità (13) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Psilla (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1	Abamectina (2) Spirotetramat (12) Spinetoram (Spinosine) (5) <i>Olio minerale</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Bicarbonato di K</i>	Soglia: prevalente presenza di uova gialle	(2) Abamectina al max 1 intervento all'anno indipendentemente avversità, (12) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. Max 1 intervento sulla singola avversità. Non ammesso in prefioritura. (5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3) Flonicamid (10) Spirotetramat (12) Sulfoxaflor (13) Flupyradifurone (14) <i>Sali potassici di acidi grassi</i>	Soglia. Reale presenza dell'insetto sulle piante	(3) Neonicotinoidi (Acetamiprid): max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (10) Flonicamid: al max 2 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità. (12) Spirotetramat: al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. Max 1 intervento sulla singola avversità. Non ammesso in prefioritura. (13) Sulfoxaflor: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (14) Flupyradifurone: max 1 intervento ad anni alterni indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDE DIFESA N° 3 – PERO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	6	<i>Confusione e disorientamento sessuale.</i> <i>Virus della granulosi.</i> <i>Spinosad (Spinosine)(5)</i> <i>Nematodi entomopatogeni (*)</i> Fosmet (Etere fosforico) (1) Metoxifenoziide (IGR) (4) Tefubenoziide (IGR) (4) Triflumuron (IGR) (4) (11) Chlorantraniliprole (9) Emamectina (12) Spinetoram (Spinosine) (5) Acetamiprid (Neonicotenoidi) (3)	Soglia: obbligatorio installare le trappole - 2 adulti/trappola in una o due settimane; - 1% di frutti con fori iniziali di penetrazione su almeno 100-500 frutti/ha La soglia non è vincolante per la Confusione ed il Disorientamento sessuale.	(1) Esteri fosforici max 4 trattamenti l'anno indipendentemente dalle avversità. Con Fosmet max 2 indipendentemente dall'avversità. (4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (9) Chlorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Emamectina: max 2 intervento all'anno. Si consiglia di iniziare l'utilizzo a partire dalla seconda generazione. (11) Triflumuron: max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (3) Neonicotinoidi (Acetamiprid): al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità. (*) Si consiglia l'utilizzo di <i>Steirnerinema feltiae</i>
Cidia del pesco (<i>Cydia molesta</i>)	1	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Confusione e disorientamento sessuale</i> <i>Spinosad (Spinosine)(5)</i> Metoxifenoziide (IGR) (4) Triflumuron (IGR) (4) (11) Fosmet (Etere fosforico) (1) Chlorantraniliprole (9) Emamectina (12) Spinetoram (Spinosine) (5)	Soglia: presenza di ovideposizione o fori di penetrazione su almeno 1% dei frutti controllando almeno 100 frutti per ha La soglia non è vincolante per la Confusione ed il Disorientamento sessuale.	(1) Esteri fosforici max 4 trattamenti l'anno indipendentemente dalle avversità. Con Fosmet max 2 indipendentemente dall'avversità. (4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (9) Chlorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Emamectina: max 2 intervento all'anno. Si consiglia di iniziare l'utilizzo a partire dalla seconda generazione. (11) Triflumuron: max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità.

Segue SCHEDE DIFESA N° 3 – PERO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Pandemis (<i>Pandemis cerasana</i>) Archips (<i>Archips podanus</i>)	2	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (5) Tefubenzozide (IGR) (4) Metoxifenozide (IGR) (4) Indoxacarb (10) Chlorantraniliprole (9) Emamectina (12) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (5)	Soglia: obbligatorio installare le trappole - generazione svernante: 10% degli organi occupati da larve; - generazioni successive: 15 adulti di Pandemis per trappole in 2 settimane o 30 adulti come somma delle due specie o con il 5% dei germogli infestati	(4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (5) <u>Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</u> (9) <u>Chlorantraniliprole</u> : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) <u>Emamectina</u> : max 2 intervento all'anno. Si consiglia di iniziare l'utilizzo a partire dalla seconda generazione. (10) <u>Indoxacarb</u> : max 4 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	1	<i>Proteine idrolizzate</i>	Soglia : presenza di prime punture fertili	
Cemiosoma (<i>Leucoptera scitella</i>) Litocollete (<i>Phyllomorictes</i> spp.)	1	Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (5)	Soglia: schiusura delle uova/primissime mine	(5) <u>Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</u>

Segue SCHEDA DIFESA N° 3 – PERO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Eulia <i>Argyrotaenia pulchellana</i>	1	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad</i> (5) Tefubenzozide (IGR) (4) Metoxifenozide (IGR) (4) Indoxacarb (10) Chlorantraniliprole (9) Emamectina (12) Spinetoram (Spinosine) (5)	Soglia: - I° generazione 5% di getti infestati; - II° e III° generazione 50 adulti per trappola o con il 5% dei germogli infestati.	(4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (5) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità di cui max 3 interventi con Spinosad e max 1 intervento con Spinetoram. (9) Chlorantraniliprole: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Emamectina: max 2 intervento all'anno. Si consiglia di iniziare l'utilizzo a partire dalla seconda generazione. (10) Indoxacarb: max 4 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Tentredine <i>(Hoplocampa brevis)</i>	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (3)	Soglia: 20 adulti per trappola catturati all'inizio del volo o 10% di corimbi infestati.	(3) Neonicotinoidi (Acetamiprid): max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità.
Rodilegno rosso <i>(Cossus cossus)</i>		<i>Catture massali con trappole a feromoni</i>		
Rodilegno giallo <i>(Zeuzera pyrina)</i>		<i>Catture massali con trappole a feromoni</i> Triflumuron (IGR) (4) (11)		(4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità (11) Triflumuron: max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità.
Orgia <i>(Orgyia antiqua)</i>	1	<i>Bacillus thuringensis</i>	Soglia: presenza di attacchi larvali	

Segue SCHEDE DIFESA N° 3 – PERO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Eriofide vescicoloso (<i>Epitrimerus pyri</i>)	1	Zolfo proteinato Olio minerale *	Soglia: intervenire solo a rottura gemme se nell'annata precedente si sono verificati attacchi	*Non impiegare oltre lo stadiodi "gemma gonfia" in formulazioni in miscela con zolfo.
Ragno rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	1	Sali potassici degli acidi grassi Clofentezine Piridaben Etoxazole Exitiazox Fenpiroximate (13) Tebufenpirad Acequinocyl Bifenazate Cyflumetofen	Soglia: - 60% di foglie interessate dal fitofago; - su Williams, Conference, Kaiser, Packam's Triumph, Guyot, Butirra precoce, Morettini, con temperature superiori ai 28 C°, la soglia è uguale alla presenza.	(13) Fenpiroximate: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	1	Indoxacarb (10)	Soglia vincolante: presenza di attacchi larvali sui frutti	(10) Indoxacarb: max 4 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Miride	1	Deltametrina (Piretroidi) (14) Acetamiprid (Neonicotenoidi) (3)	Monitorare la presenza dalla fase di post fioritura prestando attenzione alle colture limitrofe, in particolare erba medica e incolti, specie dopo gli sfalci. Gli interventi con esteri fosforici eseguiti contro altre avversità sono efficaci anche contro i Miridi.	(14) Piretroidi (Tau-fluvalinate, Deltametrina, Lambda-cialotrina): complessivamente max 3 trattamenti indipendentemente dall'avversità con max 1 intervento con Lambda-cialotrina . (3) Neonicotenoidi (Acetamiprid): al max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità.

<p>Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)</p>	<p>3</p>	<p>Tau-fluvalinate (Piretroidi) (14) Deltametrina (Piretroidi) (14) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (14) Etofenprox (Piretroidi) (14) (*) Triflumuron (IGR) (4) (11) <i>Piretrine</i></p>	<p>Monitoraggio: - a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc). - eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Monitoraggio visivo: - controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante. - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile. Monitoraggio con trappole: - utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare periodicamente. - installare le trappole sui bordi dell'apezzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro. - le trappole all'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri). - le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto. - non esiste al momento una soglia d'intervento. Mezzi fisici - applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura anticipando i primi spostamenti dell'insetto. Interventi chimici - gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali. - l'effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all'azione diretta per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell'insetto.</p>	<p>(14) Piretroidi (Tau-fluvalinate, Deltametrina, Lambda-cialotrina, Etofenprox): complessivamente max 3 trattamenti indipendentemente dall'avversità con max 1 intervento con Lambda-cialotrina. (4) IGR al max 3 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità. (11) Triflumuron: max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (*) Etofenprox: non applicare sulle cultivar di pero a buccia liscia.</p>
<p>Cervi, Daini, Caprioli, Camosci</p>	<p>1</p>	<p><i>Grasso di pecora</i></p>		

SCHEDA DISERBO N° 3 – PERO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<p>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</p>	Glifosate (1)	30,40	9 l/ha	<p>(1) Glifosate: max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30.4%) se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione. (2) Carfentrazone: impiegabile come spollonante alla dose di 1 l/ha o come diserbante fogliare alla dose di 0,3 l/ha. In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 l/ha. (3) Pyraflufen-ethile: spollonante, da usarsi in alternativa al Carfentrazone o come sinergizzante di altri erbicidi. (4) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie (6) Propaquizafop: max 1 intervento all'anno. (7) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino allo stadio di fine fioritura. (9) Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican: max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie. (CS): Candidati alla sostituzione</p>
Graminacee		<p>(1) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.</p>	Ciclossidim Propaquizafop (6)	10,90 9,60	

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican. Per tutte le altre sostanze attive la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

Non ammessi:

- Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione;
- Interventi chimici nelle interfile.

L'uso dei diserbanti può essere opportuno quando:

- vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2.
- le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per il pero).

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<p><u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u></p>	<p>Pendimetalin Oxyfluorfen (3) Diflufenican+Glifosate</p> <p>Isoxaben (4)</p> <p>Diflufenican (5)</p> <p>Isoxaben + Oryzalin (7)</p>	<p>40 38 22 42,9 3,48-21,76</p> <p>45,5 42 10 + 37.9</p>	<p>3 l/ha 2 l/ha 4-6 l/ha</p> <p>1,2 l/ha</p> <p>0,5-0,6 l/ha</p> <p>5 l/ha</p>	<p>(3) Oxyfluorfen: in bande lungo la fila tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio e SOLO SU ASTONI e non su piante innestate.</p> <p>(4) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie</p> <p>(5) Diflufenicam: solo contro le dicotiledoni.</p> <p>(7) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino allo stadio di fine fioritura.</p>
---------------------------	---	---	--	---	--

SCHEDA DIFESA N° 4 – ALBICOCCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Monilia (<i>Monilia laxa</i> , <i>M. fructigena</i>)	3	<i>Bacillus subtilis</i> ceppo QST 713 Fenbuconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Cyprodinil (CS) (3) Cyprodinil (CS) (3) + Fludioxonil Fenexamid (4) Boscalid (SDHI) (6) + Piraclostrobin (Strobilurine) (5) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) +Fluopyram (SDHI) (6) (11) Fenpyrazamine (4) Penthiopyrad (SDHI) (12) Difenoconazolo (IBE) (CS) (1) Isofetamid (SDHI) (6)		(1) IBE al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Ciprodinil al max 1 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Fenexamid, Fenpyrazamine: complessivamente al max 3 interventi all'anno. (5) Strobilurine al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Tebuconazolo + Fluopyram: al massimo 1 intervento all'anno. (6) SDHI: con SDHI max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (CS) Candidati alla sostituzione: con i prodotti contrassegnati CS complessivamente max 2 trattamenti anno indipendentemente avversità. (12) Penthiopyrad (SDHI) : max 1 intervento all'anno in alternativa agli altri SDHI.
Corineo (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Captano (8)		(8) Captano: max 2 indipendentemente dall'avversità.
Mal bianco (<i>Oidium crataegi</i>)	2	<i>Zolfo</i> Miclobutanil (IBE) (CS) (1) Fenbuconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Boscalid (SDHI) (6) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (5) Bupirimate Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) +Fluopyram (SDHI) (6) (13) Fluxipiroxad (SDHI) (6) Penthiopyrad (SDHI) (12) Tetraconazolo (1) Difenoconazolo (IBE) (CS) (1)		(1) IBE al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Strobilurine al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Tebuconazolo+Fluopyram: al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (6) SDHI: con SDHI max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (CS) Candidati alla sostituzione: con i prodotti contrassegnati CS complessivamente max 2 trattamenti anno indipendentemente avversità. (12) Penthiopyrad (SDHI) : max 1 intervento all'anno in alternativa agli altri SDHI.
BATTERIOSI Cancro batterico delle drupacee (<i>Xanthomonas pruni</i> , <i>Pseudomonas syringae</i>)		<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus subtilis</i> ceppo QST 713		

Segue SCHEDE DIFESA N° 4 – ALBICOCCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Anarsia (<i>Anarsia lineatella</i>)	3	<i>Disorientamento e confusione sessuale</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (3) Indoxacarb (1) Thiacloprid (Neonicotinoidi) (2) Etofenprox (4) Emamectina (6) Chlorantraniliprole (7) Metoxifenozone (IGR) (8) Spinetoram (3) Triflumuron (IGR) (8) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2)	Soglia. Al superamento di una soglia di 7 catture di adulti per trappola o 10 catture di adulti per trappola in 2 settimane o alle prime penetrazioni sui frutti. La soglia non è vincolante per la Confusione ed il Disorientamento sessuale.	(1) <u>Indoxacarb</u> al max 2 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) <u>Neonicotinoidi</u> al max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) <u>Spinosine (Spinosad, Spinetoram)</u> : complessivamente max 3 interventi, Spinetoram max 1 intervento, Spinosad al max 3 interventi all'anno. (4) <u>Etofenprox</u> al max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità e in alternativa a Lambdacialotrina. (6) <u>Emamectina</u> al max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) <u>Chlorantraniliprole</u> al max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) <u>IGR (Metoxifenozone, Triflumuron)</u> : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Metoxifenozone max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Ricamatori: Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>) Tignola delle gemme (<i>Recurvaria nanella</i>) Cheimatopia o falena (<i>Operophtera brumata</i>) Archips rosana (<i>Archips rosanus</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i>	Soglia consigliata per Eulia: - I° generazione: non sono ammessi interventi; - II° e III° generaz. trattare al superamento di 50 adulti per trappola Per gli altri insetti intervenire solo in presenza di danni diffusi	

Segue SCHEDA DIFESA N° 4 – ALBICOCCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Afidi (<i>Hyalopterus amygdali</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	1	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Pirimicarb Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Spirotetramat (8) Etofenprox (Piretroidi) (5) Lambdacialotrina (Piretroide) (5) Deltametrina (5) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (5)	Sogli(a: 5% di getti infestati.	(2) Neonicotinoidi al max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) Spirotetramat : al max 1 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Piretroidi (Deltametrina, Lambdacialotrina, Etofenprox, Tau-Fluvalinate) : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità con max 1 Etofenprox, max 1 Lambdacialotrina e max 1 Tau-Fluvalinate in pre-fioritura.
Cocciniglia di S. Josè (<i>Comstockaspis pernicioso</i>) Cocciniglia bianca (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	1	<i>Olio minerale</i> Pyriproxyfen (11) Spirotetramat (8)	Soglia: presenza	(11) Pyriproxyfen : max 1 intervento in pre-fioritura (8) Spirotetramat : al max 1 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.
Mosca mediterranea della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Attract and Kill con Deltametrina</i> <i>Proteine idrolizzate</i> Etofenprox (Piretroide) (5) Lambdacialotrina (Piretroide) (5) Deltametrina (Piretroide) (5) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2)	Soglia: 1% di frutti colpiti	(5) Piretroidi (Deltametrina, Lambdacialotrina, Etofenprox) : max 2 trattamenti all'anno con max 1 Etofenprox e max 1 Lambdacialotrina indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi al max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Moscerino asiatico della frutta (<i>Drosophyla suzukii</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Spinetoram (3)	Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele. Eliminare tutti i frutti colpiti.	I piretroidi e gli esteri fosforici previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro la <i>Drosophyla suzukii</i>. (2) Neonicotinoidi al max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : complessivamente max 3 interventi, Spinetoram max 1 intervento, Spinosad al max 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.
Cicaline	1	Etofenprox (Piretroide) (5)	Soglia: presenza	(5) Piretroidi (Deltametrina, Lambdacialotrina, Etofenprox) : max 4 2 trattamenti all'anno con max 1 Etofenprox e max 1 Lambdacialotrina indipendentemente dall'avversità.
Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>)	1	<i>Confusione sessuale</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Etofenprox (4) Triflumuron (9) Indoxacarb (1) Spinetoram (3)		(4) Etofenprox : al max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità e in alternativa a Lambdacialotrina. (9) IGR max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (3) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : complessivamente max 3 interventi, Spinetoram max 1 intervento, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (1) Indoxacarb al max 2 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N° 4 – ALBICOCCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cimice asiatica <i>(Halyomorpha halys)</i>	<p>1</p>	<p>Deltametrina (Piretroidi) (5) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Thiacloprid (Neonicotinoidi) (2) Etofenprox (Piretroidi) (5) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (5) Triflumuron (IGR) (9)</p>	<p>Soglia: presenza</p>	<p>(5) Piretroidi (Deltametrina, Lambdacialotrina, Etofenprox, Tau-Fluvalinate): max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità con max 1 Etofenprox, max 1 Lambdacialotrina e max 1 Tau-Fluvalinate. (2) Neonicotinoidi al max 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) IGR (Metoxifenozone, Triflumuron): complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Metoxifenozone max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>

SCHEDA DISERBO N° 4 – ALBICOCCO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<p><u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u></p> <p>(5) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.</p>	Glifosate (5)	30,40	9 l/ha	<p>Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.</p> <p>(5) Glifosate: max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30,4%) se si usano erbicidi fogliari; 6l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione. (1) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura, solo in pre-emergenza dicotiledoni in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (3) Propaquizafop: max 1 intervento all'anno. (4) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno, in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (9) Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican: max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie.</p> <p>(CS): Candidati alla sostituzione</p>
		Pyraflufen-ethile (spollonante)	2,6	0,8 l/ha	
		Isoxaben (1)	45,5	1,2 l/ha	
		Isoxaben + Oryzalin (4)	10 + 37,9	3,75 l/ha	
		Oxifluorfen (9) (CS)	22	2 l/ha	
		Pendimetalin (9) (CS)	40	3 l/ha	
		Diflufenican (9) (CS)	42	0,5-0,6	
Graminacee		Propaquizafop (3)	9,60	0,8-2,0 l/ha	

(5) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican. Per tutte le altre sostanze attive la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

-Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

-Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<p><u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila.</u> <u>L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u></p>	<p>Pendimetalin Diflufenicam + Glifosate (6) Isoxaben (1) Diflufenican (2) Isoxaben + Oryzalin (4)</p>	<p>40 38 3,48-21,76 45,5 42 10 + 37.9</p>	<p>3 l/ha 4-6 l/ha 1,2 l/ha 0,5-0,56 l/ha 5 l/ha</p>	<p>(1) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura, in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (2) Diflufenicam: solo contro le dicotiledoni (4) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno, in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (6) Diflufenicam + Glifosate: impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura.</p>
------------------------------	--	--	---	--	---

SCHEDA DIFESA N° 5 – CILIEGIO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Corineo (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Ziram (Ditiocarbammati) (12) Captano (12)	Interventi chimici: Si interviene solitamente nelle fasi di caduta foglie e ripresa vegetativa. Eccezionalmente si può effettuare un intervento nella fase compresa tra caduta petali e scamicatura.	(12) Captano, Ziram: complessivamente max 2 interventi all'anno di cui max 1 intervento con Ziram.
Monilia (<i>Monilia laxa</i> - <i>M. fructigena</i>)	3	Fenhexamid (Idrossianilidi) (4) Fenbuconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Boscalid (SDHI) (6) +Pyraclostrobin (2) Fludioxonil+Cyprodinil (CS) (3) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1)+ Fluopyram (SDHI) (6) (11) Fenpyrazamine (Amino-pirazolinone) (4) Boscalid (6) Isofetamid (SDHI) (6)		(1) IBE al max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità. (2) Boscalid+Pyraclostrobin al max 2 interventi all'anno. (3) Fludioxonil+Cyprodinil al max 2 interventi all'anno. (4) Fenhexamid, Fenpyrazamine (gruppi con stesso meccanismo di azione): complessivamente max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Fenpyrazamine max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Tebuconazolo+Fluopyram: al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (6) SDHI: con SDHI max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (CS) Candidati alla sostituzione: con i prodotti contrassegnati CS complessivamente max 2 trattamenti anno indipendentemente avversità.
Maculatura rossa delle foglie (<i>Apiognomonina erythrostoma</i>) Cilindrosporiosi (<i>Cylindrosporium padi</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Dodina (5) Fenbuconazolo (IBE) (1)		(5) Dodina: al max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità; ammesso solo contro Cilindrosporiosi. (1) IBE al max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità.
BATTERIOSI Cancro batterico (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> , <i>Xanthomonas</i> spp.)		<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus subtilis</i>	Soglia: Presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente. Intervenire a ingrossamento gemme.	
PARASSITI ANIMALI				
Cocciniglia di S. Josè (<i>Comstockaspis perniciososa</i>) Cocciniglia a virgola (<i>Mytilococcus ulmi</i>) Cocciniglia bianca (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	1	<i>Olio minerale</i> Fosmet (4) Spirotetramat (8) Pyriproxyfen Sulfoxaflor (13)	Soglia. Presenza di attacco diffuso sui rami, fusto e branche e/o danni riscontrati nell'anno precedente	(4) Fosmet al max 1 interventi all'anno. (8) Spirotetramat: al max 1 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità; autorizzato solo contro Cocciniglia bianca e Cocciniglia di S. Josè

Segue SCHEDA DIFESA N° 5 – CILIEGIO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Afide nero (<i>Myzus cerasi</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Sulfoxaflor (13) Pirimicarb (6) Spirotetramat (14) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (12) <i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i>	Soglia: - 3% dei germogli infestati - in aree ad elevato rischio: presenza	(1) Neonicotinoidi al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (6) Pirimicarb al max 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (13) Sulfoxaflor al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità; (14) Spirotetramat: max 1 intervento indipendentemente dall'avversità. (12) Piretroidi (Deltametrina, Tau-Fluvalinate, Etofenprox, Acrinatrina): complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, max 1 intervento con Acrinatrina.
Mosca delle ciliegie (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (12) Phosmet (3) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) <i>Beauveria bassiana</i> <i>Spinosad (Spinosine) con esca pronta all'uso</i> (7)	Soglia. Obbligatorio installare trappole cromotropiche. Intervenire nella fase di invaiatura dopo aver accertato la presenza degli adulti con trappole cromotropiche da installare intorno alla metà di maggio	(1) Neonicotinoidi al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Piretroidi (Deltametrina, Tau-Fluvalinate, Etofenprox, Acrinatrina): complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, max 1 intervento con Acrinatrina. (3) Phosmet al max un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (rischi di fitotossicità). (7) Spinosad (Spinosine): al max 5 interventi all'anno.
Cheimatopia o falena (<i>Operophtera brunata</i>) Tignola delle gemme (<i>Argyrestia ephipella</i>) Archips rosana (<i>Archips rosanus</i>) Tignola dei fruttiferi (<i>Recurvaria nanella</i>) Archips podana (<i>Archips podanus</i>) Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>)	1	Bacillus thuringiensis Indoxacarb (5) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1)		(5) Indoxacarb al max 2 interventi anno indipendentemente dall'avversità. (1) Neonicotinoidi al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

Segue SCHEDA DIFESA N° 5 – CILIEGIO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	2	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (12) Etofenprox (Piretroidi) (12)	Soglia : presenza	(1) <u>Neonicotinoidi</u> al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) <u>Piretroidi (Deltametrina, Tau-Fluvalinate, Etofenprox, Acrinatrina)</u> : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, max 1 intervento con acrinatrina.
Ragnetto rosso (<i>Panonyichus ulmi</i>)	1	Olio minerale Acrinatrina (Piretroidi) (12)	<u>Interventi chimici</u> Occasionalmente, può essere necessario intervenire chimicamente al superamento della soglia del 60% di foglie occupate.	(12) <u>Piretroidi (Deltametrina, Tau-Fluvalinate, Etofenprox, Acrinatrina)</u> : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox, max 1 intervento con Acrinatrina.
Moscerino asiatico della frutta (<i>Drosophyla suzuki</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (12) Spinetoram (Spinosine) (8)	Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele.	(1) <u>Neonicotinoidi</u> al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (12) <u>Piretroidi (Deltametrina, Tau-Fluvalinate, Etofenprox, Acrinatrina)</u> : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente avversità con max 1 intervento con Etofenprox, max 1 intervento con Acrinatrina. (8) <u>Spinetoram</u> al max 1 intervento all'anno con effetto collaterale nei confronti della mosca della frutta I piretroidi e gli esteri fosforici previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro la <i>Drosophyla</i> .

SCHEDA DISERBO N° 5 – CILIEGIO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).	Glifosate (6) Pyraflufen-ethile Isoxaben (1) Isoxaben + Oryzalin (5) Oxifluorfen (9) (CS) Pendimetalin (9) (CS) Diflufenican (9) (CS)	30.40 2.6 45,5 10 + 37.9 22 40 42	9 l/ha 0.8 l/ha 1,2 l/ha 3.75 l/ha 2 l/ha 3 l/ha 0,5-0,6 l/ha	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. (1) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura, in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (6) Glifosate: max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30,4%) se si usano erbicidi fogliari; 6l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione. (3) Fluazifop-p-butile: ammessi 2 trattamenti alla dose di 1 l/ha per ciascun trattamento (4) Propaquizafop: max 1 intervento all'anno. (5) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno, in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (9) Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican: max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie. (CS): Candidati alla sostituzione
Graminacee	(6) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.	Fluazifop-p-butile (3) Propaquizafop (4)	13.4 9,60	2 l/ha 0,8-2,0 l/ha	

(6) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican. Per tutte le altre sostanze attive la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

-Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

-Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

<p>Dicotiledoni e Graminacee</p>	<p><u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u></p>	<p>Diflufenicam + Glifosate (7) Isoxaben (1) Diflufenicam (2) Isoxaben + Oryzalin (5)</p>	<p>3,48-21,76 45,5 42 10 + 37.9</p>	<p>4-6 l/ha 1,2 l/ha 0,5 – 0,6 l/ha 5 l/ha</p>	<p>(1) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura, in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (2) Diflufenicam: solo contro le dicotiledoni (5) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno, in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (7) Diflufenicam + Glifosate: impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura.</p>
--------------------------------------	---	--	--	---	--

SCHEDA DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Bolla (<i>Taphrina deformans</i>)	5	<i>Prodotti rameici</i> Dodina (5) Difeconazolo (IBE) (CS) (1) Ziram (6) Captano (6) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) + Zolfo Fosetil-Al Mancozeb (6)		(1) IBE max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui con IBE CS (Candidati sostituzione) max 2. (6) Ziram, Captano, Mancozeb: con queste sostanze attive complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Ziram max 1 intervento, con Mancozeb max 2 interventi. (5) Dodina max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Corineo (<i>Coryneum beijirinkii</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Dodina (5) Captano (16)		(5) Dodina max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (16) Captano: max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.
Mal bianco (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	3	<i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> Myclobutanil (IBE) (CS) (1) Penconazolo (IBE) (1) Tetraconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) (2) Fenbuconazolo (IBE) (1) Bupirimate (6) Boscalid (SDHI) (9) +Piraclostrobin (Strobilurina) (3) Trifloxistrobin (Strobilurina) (3)+Tebuconazolo (CS) (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1)+Fluopyram (SDHI) (9) (5) (11) Fluxapyroxad (SDHI)(9) Penthiopyrad (SDHI) (15) Flutriafol (IBE) (1)		(1) IBE max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui con IBE CS (Candidati sostituzione) max 2. (2) Tebuconazolo al max 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Strobilurine (Piraclostrobin, Trifloxistrobin): max 2 interventi anno, indipendentemente dall'avversità (9) SDHI: con principi attivi del gruppo SDHI max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (11) Tebuconazolo+Fluopyram: al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (6) Bupirimate: max 2 interventi all'anno (15) Penthiopyrad (SDHI): max 1 intervento all'anno in alternativa agli altri SDHI.

Segue SCHEDA DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Monilia (<i>Monilia laxa</i> <i>Monilia fructigena</i>)	4	<i>Bacillus subtilis</i> Difeconazolo (IBE) (CS) (1) Myclobutanil (IBE) (CS) (1) Penconazolo (IBE) (1) Propiconazolo (IBE) (CS) (1) Tetraconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Fenbuconazolo (IBE) (1) Boscalid (SDHI) (9)+Pyraclostrobin (Strobilurina) (3) Trifloxistrobin (Strobilurina) (3)+Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Fenhexamid (Idrossianilidi) (8) Fludioxonil+Ciprodinil (7) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1)+Fluopyram (SDHI) (9)(16) Fenpyrazamine (Amino-pirazolinone) (8) Penthiopyrad (SDHI) (15)		(1) IBE max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui con IBE CS (Candidati sostituzione) max 2. (3) Strobilurine (Pyraclostrobin, Trifloxistrobin): max 2 interventi anno, indipendentemente dall'avversità (7) Fludioxonil+Ciprodinil al max 1 volte all'anno indipendentemente dall'avversità. (9) SDHI: con principi attivi del gruppo SDHI max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (8) Fenhexamid, Fenpyrazamine (gruppi con stesso meccanismo di azione): complessivamente max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Fenpyrazamine max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (15) Penthiopyrad (SDHI) : max 1 intervento all'anno in alternativa agli altri SDHI. (16)Tebuconazolo (IBE) (CS) +Fluopyram (SDHI): max 1 intervento all'anno.
Cancri rameali (<i>Fusicoccum amygdali</i> , <i>Cytospora spp.</i>)	3	<i>Prodotti rameici</i> Tiofanate metil (7)		(7) Tiofanate metil : max 2 interventi ammesso solo su percoche e Cvs. sensibili
BATTERIOSI Cancro o maculatura batterica (<i>Xanthomonas arboricola</i> <i>pv. pruni</i>)		<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus subtilis</i> Acybenzolar methyle		

Segue SCHEDA DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
PARASSITI ANIMALI				
Afide verde (<i>Myzus persicae</i>) Afide sigarai (<i>Myzus varians</i>)	3	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (2) Flonicamid (10) Spirotetramat (8) Sulfoxaflor (13)	Soglia: - nella fase di bottoni rosa: presenza di fondatrici; - per pesche e percoche 3% di germogli colpiti in prefioritura e 10% in post-fioritura. - per nettarine 3% dei germogli infestati in pre- e post-fioritura.	(1) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Thiacloprid e max 2 con Acetamiprid indipendentemente dall'avversità. (2) Tau-Fluvalinate solo in pre-fioritura, al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità e nel limite max di 4 Piretroidi indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid: ammesso solo contro afide verde; max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità. (8) Spirotetramat: al max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità a partire dalla scamiciatura. (13) Sulfoxaflor solo contro afide verde max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Afide farinoso (<i>Hyalopterus amygdali</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Spirotetramat (8) Sulfoxaflor (13) <i>Sali potassici di acidi grassi</i>	Soglia: presenza	(1) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): complessivamente al max 2 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Thiacloprid e max 2 con Acetamiprid indipendentemente dall'avversità. (8) Spirotetramat: al max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Tripidi (<i>Trips meridionalis</i> , <i>Thrips major</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	2 in primavera + 1 in estate contro tripide estivo	<i>Spinosad (Spinosine)</i> (4) <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Spinetoram (Spinosine)</i> (4) <i>Etofenprox (Piretroidi)</i> (12) <i>Alfacipermetrina (Piretroidi)</i> (12) <i>Lambdacialotrina (Piretroidi)</i> (12) <i>Cipermetrina (Piretroidi)</i> (12) <i>Zetacipermetrina (Piretroidi)</i> (12) <i>Deltametrina (Piretroidi)</i> (12) <i>Betacyflutrin (Piretroidi)</i> (12) <i>Tau-Fluvalinate (Piretroidi)</i> (12) <i>Acrinatrina (Piretroidi)</i> (12) <i>Formetanate (Estere fosforico)</i> (7)	Soglia: presenza o danni di tripidi nell'anno precedente.	(4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Piretroidi: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità e dei quali max 2 contro questa avversità di cui: con Lambdacialotrina, Cipermetrina, Alfacipermetrina, Zetacipermetrina max 1 in alternativa fra loro indipendentemente dall'avversità, con Etofenprox max 2 indipendentemente dall'avversità, Tau-Fluvalinate max 2 indipendentemente dall'avversità, Acrinatrina max 1 indipendentemente dall'avversità. (7) Esteri fosforici (Fosmet, Formentanate): complessivamente max 3 trattamenti l'anno indipendentemente dalle avversità di cui con Fosmet max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.
Cocciniglia bianca (<i>Pseudolaucaspis pentagona</i>) Cocciniglia di S. Josè (<i>Comstockaspis perniciosas</i>)	2	<i>Olio minerale</i> <i>Pyriproxyfen</i> (11) <i>Fosmet (Estere fosforico)</i> (7) <i>Spirotetramat</i> (8) <i>Sulfoxaflor</i> (13)	Soglia: presenza	(7) Esteri fosforici (Fosmet, Formentanate): complessivamente max 3 trattamenti l'anno indipendentemente dalle avversità di cui con Fosmet max 2 interventi indipendentemente dall'avversità (11) Pyriproxyfen: max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità entro la fase di prefioritura. (8) Spirotetramat: al max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Sulfoxaflor max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDE DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cidia (<i>Cydia molesta</i>)	5	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Confusione e Distrazione sessuale</i> <i>Spinosad (Spinosine)</i> (4) Spinetoram (Spinosine) (4) Metoxifenozone (IGR) (8) Triflumuron (IGR) (8) Fosmet (Estere fosforico) (7) Etofenprox (Piretroidi) (12) Emamectina (10) Chlorantraniliprole (13) Thiacloprid (Neonicotenoide) (1) (15) Acetamiprid (Neonicotenoide) (1) (15) Indoxacarb (5)	Soglia: obbligatorio installare trappole: - 1° generazione 30 catture trappola/settimana; - generazioni successive 10 catture trappola/settimana La soglia non è vincolante per la Confusione ed il Disorientamento sessuale.	(8) IGR (Triflumuron, Metoxifenozone): complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Metoxifenozone max 1 intervento. (7) Esteri fosforici (Fosmet, Formentanate): complessivamente max 3 trattamenti l'anno indipendentemente dalle avversità di cui con Fosmet max 2 interventi indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Piretroidi: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Etofenprox max 2 indipendentemente dall'avversità. (10) Emamectina al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (13) Chlorantraniliprole al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (1) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Thiacloprid e max 2 con Acetamiprid indipendentemente dall'avversità. (15) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): per questa avversità max 1 intervento all'anno tra Acetamiprid e Thiacloprid. (5) Indoxacarb: max 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità

Segue SCHEDA DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Anarsia (<i>Anarsia lineatella</i>)	2	<i>Bacillus thuringiensis</i> Confusione e Distrazione sessuale <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (4) Indoxacarb (5) Metoxifenozone (IGR) (8) Triflumuron (IGR) (8) Etofenprox (Piretroidi) (12) Emamectina (10) Chlorantraniliprole (13) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (4) Thiacloprid (Neonicotenoide) (1) (15) Acetamiprid (Neonicotenoide) (1) (15)	Soglia: obbligatorio installare trappole: - 7 catture per trappola /settimana; - 10 catture per trappola/2 settimane. La soglia non è vincolante per la Confusione ed il Disorientamento sessuale.	(8) IGR (Triflumuron, Metoxifenozone): complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Metoxifenozone max 1 intervento. (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (12) Piretroidi: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Etofenprox max 2 interventi indipendentemente dall'avversità. (10) Emamectina al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (13) Chlorantraniliprole al max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Indoxacarb: max 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (1) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Thiacloprid e max 2 con Acetamiprid indipendentemente dall'avversità. (15) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): per questa avversità max 1 intervento all'anno tra Acetamiprid e Thiacloprid.
Orgia (<i>Orgia antiqua</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i>	Soglia: presenza di larve giovani	

Segue SCHEDA DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ragno rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	1	Etoxazole Fenpiroximate (14) Tebufenpirad Abamectina Acequinocyl		(14) Fenpiroximate: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	2	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Attract and Kill con Deltametrina</i> <i>Spinosad (lotta adulticida) (10)</i> <i>Proteine idrolizzate</i> Zetacipermetrina (Piretroidi) (12) Betacyflutrin (Piretroidi) (12) Fosmet (Estere fosforico) (7) Etofenprox (Piretroidi) (12) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1)	Soglia: prime punture	(7) Esteri fosforici (Fosmet, Formentanate): complessivamente max 3 trattamenti l'anno indipendentemente dalle avversità di cui con Fosmet max 2 interventi indipendentemente dall'avversità. (1) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Thiacloprid e max 2 con Acetamiprid indipendentemente dall'avversità. (10) Spinosad (lotta adulticida) al max 8 interventi all'anno in formulazione Spintorfly. (12) Piretroidi: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui: con Lambdacialotrina, Cipermetrina, Alfacipermetrina, Zetacipermetrina max 1 in alternativa fra loro indipendentemente dall'avversità, con Etofenprox max 2 interventi indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	2	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (12) Lambdacialotrina (Piretroidi) (12) Etofenprox (Piretroide) (12) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (12) Triflumuron (IGR)	<p>Monitoraggio - a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc). - eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice.</p> <p>Monitoraggio visivo: - controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante. - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.</p> <p>Monitoraggio con trappole: - utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare periodicamente. - installare le trappole sui bordi dell'apezzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro. - le trappole all'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri). - le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto. - non esiste al momento una soglia d'intervento.</p> <p>Mezzi fisici - applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura anticipando i primi spostamenti dell'insetto.</p> <p>Interventi chimici - gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali - l'effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all'azione diretta per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell'insetto</p>	<p>(1) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Thiacloprid e max 2 con Acetamiprid indipendentemente dall'avversità. (12) Piretroidi: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Lambdacialotrina, max 1 intervento, con Etofenprox max 2 interventi, con Deltametrina max 2, con Tau-Fluvalinate max 2 interventi, tutti indipendentemente dall'avversità. (8) IGR (Triflumuron, Metoxifenoziide): complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Metoxifenoziide max 1 intervento.</p>

Segue SCHEDA DIFESA N° 6 – PESCO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Miridi (<i>Lygus spp.</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) 12) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1)	Soglia: presenza consistente	12) Piretroidi: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Etofenprox max 2 interventi indipendentemente dall'avversità. 1) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Thiacloprid e max 2 con Acetamiprid indipendentemente dall'avversità.

SCHEDA DISERBO N° 6 – PESCO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u>	Glifosate (8) Carfentrazone (2) Pyraflufen-ethile (4) Isoxaben (1) Isoxaben + Oryzalin (7) Oxifluorfen (9) (CS) Pendimetalin (9) (CS) Diflufenican (9) (CS)	30,40 6,45 2,6 45,5 10 + 37,9 22 40 42	9 l/ha 1 l/ha 0,8 l/ha 1,2 l/ha 3,75 l/ha 2 l/ha 3 l/ha 0,5-0,6 l/ha	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. (1) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura, in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (2) Carfentrazone impiegabile come spollonante alla dose di 1 l/ha o come diserbante alla dose è di 0,3 l/ha. (3) Fluazifop-p-butile: ammessi 2 trattamenti alla dose di 1 l/ha per ciascun trattamento (4) Pyraflufen-ethile: spollonante, da utilizzarsi in alternativa al Carfentrazone. (6) Propaquizafop: max 1 intervento all'anno. (7) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno, in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (8) Glifosate: max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30,4%) se si usano erbicidi fogliari; 6l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione. (9) Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican: max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie. (CS): Candidati alla sostituzione
Graminacee	(8) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.	Ciclossidim Fluazifop-p-butile (3) Propaquizafop (6)	10,80 13,3 9,60	5 l/ha 2 l/ha 0,8-2,0 l/ha	

(8) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican. Per tutte le altre sostanze attive la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

-Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

-Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila.</u> <u>L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u>	Pendimetalin	40	3 l/ha	(1) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura, in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (5) Diflufenicam: solo contro le dicotiledoni. (7) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno, in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (9) Diflufenicam + Glifosate: Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura.
		Diflufenicam + Glifosate (9)	3,48-21,75	4-6 l/ha	
		Isoxaben (1)	45,5	1,2 l/ha	
		Diflufenicam (5)	42	0,5-0,6 l/ha	
		Isoxaben + Oryzalin (7)	10 +37.9	5 l/ha	

SCHEDA DIFESA N° 7 – SUSINO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Monilia (<i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i>)	4	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 Fenbuconazolo (IBE) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1) Tebuconazolo (IBE) (CS) (1)+Trifloxistrobin Fenhexamid (Idrossianilidi) (11) Ciprodinil (CS)+ Fludioxonil (2) Boscalid+Piraclostrobin (3) Fenpyrazamine (Amino-pirazolinone) (11) Fluopiram (SDHI) (12) Difenoconazolo (IBE) (CS) (1)	Su varietà ad alta recettività è opportuno intervenire in pre-fioritura. Qualora durante la fioritura si verificano condizioni climatiche favorevoli alla malattia si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura. In condizioni climatiche favorevoli alla malattia e su cultivar suscettibili si possono eseguire ulteriori 1 o 2 trattamenti in prossimità della raccolta	(1) IBE max 3 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Tebuconazolo max 2. (2) Ciprodinil+Fludioxonil max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) Boscalid+Piraclostrobin max 2 interventi anno, indipendentemente dall'avversità (CS) Candidati alla sostituzione: con i prodotti contrassegnati CS complessivamente max 2 trattamenti anno indipendentemente avversità. (11) Fenhexamid, Fenpyrazamine (gruppi con stesso meccanismo di azione): complessivamente max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Fenpyrazamine max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, (12) Fluopiram (SDHI): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità per principi attivi del gruppo SDHI
Ruggine (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>)		Zolfo Prodotti rameici		
Corineo (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	2	Prodotti rameici Ziram (Ditiocarbammati) (4) Captano (5)		(4) Ditiocarbammati: max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Captano: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
BATTERIOSI Cancro batterico delle drupacee (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>)		Prodotti rameici <i>Bacillus subtilis</i>	Negli impianti colpiti intervenire a caduta foglie con 3-4 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni; un ulteriore intervento dopo la potatura e/o nelle fasi di ingrossamento gemme	
PARASSITI ANIMALI				
Cocciniglia di S. José (<i>Comstockaspis perniciosa</i>) Cocciniglia bianca (<i>Diaspis pentagona</i>)	1	Olio minerale Fosmet (1) Spirotetramat (8) Pyriproxyfen (3)	Soglia su San José. Presenza diffusa e danni riscontrati sui frutti nell'anno precedente. Soglia su Cocciniglia bianca. Presenza diffusa sulle branche principali.	(1) Fosmet max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (8) Spirotetramat: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità; solo dalla fioritura in poi. (3) Pyriproxyfen: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità; solo in pre-fioritura.

Segue SCHEDA DIFESA N° 7 – SUSINO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Afidi verdi (<i>Brachycaudus helychrisi</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Phorodon humuli</i>)	2	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Flonicamid (10) Pirimicarb (12)	Soglia. Infestazione presente su almeno il 10% dei germogli o sui frutticini.	(2) Neonicotinoidi (Thiacloprid, Acetamiprid): complessivamente max 2 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità di cui max 1 intervento con Thiacloprid indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità. (12) Pirimicarb : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità ad almeno 30 giorni dalla raccolta.
Afidi farinoso (<i>Hyalopterus pruni</i>)	1	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Flonicamid (10) Pirimicarb (12)	Soglia. Presenza Localizzare l'intervento nelle sole aree infestate	(2) Neonicotinoidi (Thiacloprid, Acetamiprid): complessivamente max 2 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità di cui max 1 intervento con Thiacloprid indipendentemente dall'avversità. (10) Flonicamid : al max 1 intervento all'anno indipendentemente dalle avversità. (12) Pirimicarb : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità ad almeno 30 giorni dalla raccolta.

Segue SCHEDA DIFESA N° 7 – SUSINO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cidia (<i>Cydia funebrana</i>)	4	<i>Confusione e distrazione sessuale Spinosad (Spinosine) (4)</i> Thiacloprid (Neonicotenoidi) (2) Chlorantraniliprole (10) Emamectina (6) Fosmet (1) Triflumuron (IGR) (8) Spinetoram (Spinosine) (4) Acetamiprid (Neonicotenoidi) (2) Beta-Ciflutrin (Piretroidi) (5)	<u>Soglia indicativa:</u> Consigliato di Installare 2-3 trappole a feromone per appezzamento a partire dall'ultima decade di aprile. Prima generazione. Interventi giustificati solo in presenza di scarsa allegagione. II e III generazione In condizioni di normale allegagione intervenire al superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana. E' opportuno fare riferimento alle catture di numerose trappole.	(4) Fosmet max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Piretroidi (Beta-Ciflutrin, Acrinatrina, Lambdacialotrina, Deltametrina): complessivamente max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Beta-Ciflutrin indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi (Thiacloprid, Acetamiprid): complessivamente max 2 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità di cui max 1 intervento con Thiacloprid indipendentemente dall'avversità. (10) Chlorantraniliprole: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Emamectina: max 2 interventi indipendentemente avversità (8) IGR (Triflumuron): max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.
Cidia molesta (<i>Cydia molesta</i>)	2	<i>Confusione e distrazione sessuale Spinosad (Spinosine) (4)</i> Chlorantraniliprole (10) Spinetoram (Spinosine) (4) Deltametrina (Piretroidi) (5)	Soglia: presenza	(4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): complessivamente al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinetoram al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità, Spinosad al max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Chlorantraniliprole: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Piretroidi (Beta-Ciflutrin, Acrinatrina, Lambdacialotrina, Deltametrina): complessivamente max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Deltametrina, indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N° 7 – SUSINO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>) Orgia (<i>Orgya antiqua</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i>	Presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti	
Tentredini (<i>Hoplocampa spp.</i>)	1	Betacyflutrin (Piretroidi) (5) Acrinatrina (Piretroidi) (5)	Si consigliano trappole cromotropiche bianche. Soglia consigliata. 50 catture/trappola durante il periodo della fioritura. Intervenire a caduta petali.	(5) Piretroidi (Betacyflutrin, Acrinatrina, Etofenprox, Lambdacialotrina, Deltametrina); complessivamente max 3 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Lambdacialotrina, max 1 intervento con deltametrina e max 2 interventi con Etofenprox indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Taeniothrips meridionalis</i>)	1	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Betacyflutrin (Piretroidi) (5) Acrinatrina (Piretroidi) (5) Lambdacialotrina (Piretroidi) (5) Deltametrina (Piretroidi) (5)	Soglia indicativa: presenza su cultivar suscettibili (es. Angeleno).	(5) Piretroidi Betacyflutrin, Acrinatrina, Etofenprox, Lambdacialotrina, Deltametrina); complessivamente max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Lambdacialotrina, max 1 intervento con deltametrina e max 2 interventi con Etofenprox indipendentemente dall'avversità.
Mosca (<i>Ceratitis capitata</i>)	1	<i>Spinosad (lotta aduaticida)</i> (4) <i>Proteine idrolizzate</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Attract and Kill con Deltametrina</i> Fosmet (1) Deltametrina (Piretroidi) (5) Acetamiprid (Neonicotinoide) (2)	Soglia: prime punture. Si consigliano trappole cromotropiche gialle all'inizio della pre-maturazione.	(1) Fosmet max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Piretroidi Betacyflutrin, Acrinatrina, Etofenprox, Lambdacialotrina, Deltametrina); complessivamente max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Lambdacialotrina, max 1 intervento con deltametrina e max 2 interventi con Etofenprox indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi (Thiacloprid, Acetamiprid); complessivamente max 2 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità di cui max 1 intervento con Thiacloprid indipendentemente dall'avversità. (10) Spinosad (lotta aduaticida) al max 8 interventi all'anno in formulazione Spintor fly

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
<p>Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)</p>	<p>1</p>	<p>Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Tiflumuron (IGR) (8)</p>	<p>Monitoraggio: - a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc). - eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Monitoraggio visivo: - controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante. - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile. Monitoraggio con trappole: - utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare periodicamente. - installare le trappole sui bordi dell'apezzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro. - le trappole all'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri). - le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto. - non esiste al momento una soglia d'intervento. Mezzi fisici - applicare reti antinsetto monofila o Monoblocco con chiusura anticipando i primi spostamenti dell'insetto. Interventi chimici - gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali. - l'effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all'azione diretta per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell'insetto.</p>	<p>(5) Piretroidi (Betacyflutrin, Acrinatrina, Etofenprox, Lambdacialotrina, Deltametrina): complessivamente max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Lambdacialotrina, max 1 intervento con deltametrina e max 2 interventi con Etofenprox indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi (Thiacloprid, Acetamiprid): complessivamente max 2 interventi l'anno indipendentemente dalle avversità di cui max 1 intervento con Thiacloprid indipendentemente dall'avversità. (8) IGR (Triflumuron): max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.</p>

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ragno rosso dei fruttiferi (Panonychus ulmi)	1	Fenpiroximate (11) Pyridaben Etoxazole Abamectina	Soglia. 60% di foglie occupate dal fitofago	(11) Fenpiroximate: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

SCHEDA DISERBO N° 7 – SUSINO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<p><u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila.</u> <u>L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u></p> <p>(8) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.</p>	Glifosate (8) Carfentrazone (2) Pyraflufen-ethile (4) Isoxaben (1) Isoxaben + Oryzalin (7) Oxifluorfen (10) (CS) Pendimetalin (10) (CS) Diflufenican (10) (CS)	30,40 6,45 2,6 45,5 10 + 37,9 22 34,8 42	9 l/ha 1 l/ha 0,8 l/ha 1,2 l/ha 3,75 l/ha 2 l/ha 3 l/ha 0,5-0,6 l/ha	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. (1) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura, in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (2) Carfentrazone impiegabile come spollonante alla dose di 1 l/ha o come diserbante alla dose di 0,3 l/ha. (4) Pyraflufen-ethile: spollonante, da utilizzarsi in alternativa al Carfentrazone. (7) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno, in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (8) Glifosate: max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30,4%) se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione. (10) Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican: max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie. (CS): Candidati alla sostituzione
		Fluazifop-p-butile (3) Propaquizafop (6)	13,4 9,60	2 l/ha 0,8-2,0 l/ha	(3) Fluazifop-p-butile: ammessi 2 trattamenti alla dose di 1 l/ha per ciascun trattamento (6) Propaquizafop: max 1 intervento all'anno.
GRAMINACEE					

(8) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican. Per tutte le altre sostanze attive la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

-Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%);

-Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila.</u> <u>L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u>	Diflufenicam + Glifosate (9) Isoxaben (1)	3,48-21,76 45,5	4-6 l/ha 4 l/ha	(1) Isoxaben: fine inverno, primavera fino alla fioritura, in banda sotto la fila per un max del 30% della superficie. (5) Diflufenicam: solo contro le dicotiledoni. (7) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno, in banda sotto la fila e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza fino alla prefioritura. (9) Diflufenicam + Glifosate: impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura.
		Diflufenicam (5)	42	0,5-0,6 l/ha	
		Isoxaben + Oryzalin (7)	10 + 37.9	5 l/ha	

SCHEDA DIFESA N° 8 – NOCCIOLO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Mal dello stacco e altre malattie del legno (<i>Cytospora corylicola</i>)		<i>Prodotti rameici</i> Mastici addizionati con prodotti fungicidi (su tagli e ferite ampie)		
BATTERIOSI Necrosi batterica (<i>Xanthomonas campestris</i> , <i>pv. corylina</i>) Moria del nocciolo (<i>Pseudomonas syringae pv.</i> <i>avellanae</i> , <i>Erwinia amylovora</i>).	4	<i>Prodotti rameici</i> <i>Acibenzolar-S-metil</i> (1) Pyraclostrobin+Boscalid (2)		(1) Acibenzolar-S-metil max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Pyraclostrobin+Boscalid max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
PARASSITI ANIMALI				
Eriofide delle gemme (<i>Phytocoptella avellanae</i>)		Zolfo Olio minerale	Soglia. 15-20% delle gemme infestate.	
Balanino (<i>Curculio nucum</i>)	2	<i>Beauveria bassiana</i> Chlorantraniliprole (3) Deltametrina (Piretroidi) (2) Etofenprox (Piretroidi)(1) Fosmet (4)	Soglia: 2 individui per pianta su 6 piante/ha scelte nei punti di maggiore rischio	(3) Chlorantraniliprole : max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Piretroidi : max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Fosmet max 2 intervento anno indipendentemente dall'avversità.
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	1	Etofenprox (Piretroidi) (2) Deltametrina (Piretroidi) (2)		(2) Piretroidi : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox.
Cimici Pentatomidi e Coreidi (<i>Gonocerus acuteangulatus</i> , <i>Palomena preasina</i> , ect...) Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	2	<i>Piretrine pure</i> Etofenprox (Piretroidi) (2) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2) Deltametrina (Piretroidi) (2)	Soglia: 2 individui per pianta adottando il "frappage" nel periodo maggio- luglio	(2) Piretroidi : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 1 intervento con Etofenprox.

SCHEDA DISERBO N° 8 – NOCCIOLO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<p><u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u></p> <p><u>(1) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie</u></p>	<p>Glifosate (1) (7) Carfentrazone (2) Pyraflufen-ethile (4)</p>	<p>30.40 6,45 2.6</p>	<p>9 l/ha 1 l/ha 0.8 l/ha per trattamento; max 1.6 l/ha anno 3.75 l/ha 2 l/ha 3 l/ha</p>	<p><u>(2) Carfentrazone:</u> impiegabile come spollonante alla dose di 1l/ha o come diserbante fogliare con dosi di 0,3 l/ha: complessivamente max-4 l/ha anno. <u>(4) Pyraflufen-ethile:</u> spollonante, da utilizzarsi in alternativa al Carfentrazone. <u>(5) Isoxaben + Oryzalin:</u> max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie. <u>(7) Oxifluorfen, Pendimetalin:</u> max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie. (CS): Candidati alla sostituzione</p>
Graminacee		<p>Isoxaben + Oryzalin (5) Oxifluorfen (7) (CS) Pendimetalin (7) (CS)</p>	<p>10 + 37.9 22 34,8</p>		
		Fluazifop-p-butile (3)	13.4	2 l/ha	<u>(3) Fluazifop-p-butile:</u> ammessi 2 trattamenti alla dose di 1 l/ha per ciascun trattamento

(7) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin. Per tutti gli altri principi attivi la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli più restrittivi in etichetta).

(1) In pre-raccolta è ammesso 1 intervento chimico sull'intera superficie del nocciolo. Esclusivamente nei noccioli con pendenze pari o superiori al 15% è ammesso il diserbo chimico sull'intera superficie senza limitazioni temporali.

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<p><u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u></p>	Diflufenicam + Glifosate (6)	40+250	6 l/ha	<p><u>(5) Isoxaben + Oryzalin:</u> max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie. <u>(6) Diflufenicam + Glifosate:</u> superficie massima diserbabile pari al 30%.</p>
		Isoxaben + Oryzalin (5)	10 + 37.9	5 l/ha	

SCHEDA DIFESA N° 9 – KAKI

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Cancro (<i>Phomopsis diospyri</i>)		<i>Prodotti rameici</i>	<u>Interventi agronomici</u> Taglio e bruciatura degli organi infetti <u>Interventi chimici</u> In presenza di sintomi intervenire a caduta foglie	
Maculatura fogliare Cercosporiosi (<i>Mycosphaerella nawae</i>)		Pyraclostrobin (3)		(3) Pyraclostrobin: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; intervenire tra la comparsa delle foglie e la fine della fioritura.
PARASSITI ANIMALI				
Cocciniglie (<i>Ceroplastes rusci</i>)	1	<i>Olio minerale</i> Spirotetramat (4)	Soglia. Intervenire solo in caso di presenza diffusa	(4) Spirotetramat: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità; intervenire da fine fioritura all'inizio della migrazione delle neanidi.
Mosca mediterranea (<i>Ceratitis capitata</i>)	2	Etofenprox (1) Spinosad (2) <i>Beauveria bassiana</i> <i>Attract and Kill con Deltametrina</i>	Soglia. Presenza di ovodeposizione. In caso di catture controllare la presenza di punture. Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo (tipo Rebell) innescate con Trimedlure.	(1) Etofenprox: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Spinosad: max 5 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo formulato con specifica esca pronta all'uso.
Sesia (<i>Synanthedon typuliformis</i>)		<i>Olio minerale</i> Nematodi entomoparassiti: <i>Sternernema feltiae</i> e <i>Heterorhabditis spp.</i>	<u>Interventi agronomici</u> Rimuovere le parti corticali alterate ospitanti le larve e chiudere con paste cicatrizzanti <u>Interventi chimici</u> In maggio giugno e agosto settembre intervenire con 10 - 15% di piante infestate nella fase di sfarfallamento degli adulti	
Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	1	Etofenprox (1)	Soglia. Presenza dell'insetto con produzione rilevante di melata	(1) Etofenprox max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)				

SCHEDA DISERBO N° 9 – KAKI

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N° 10 – MANDORLO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Corineo (<i>Coryneum beijerinckii</i>)		Prodotti rameici		
Monilia (<i>Monilia</i> spp.)	2	<i>Bacillus subtilis</i> Tebuconazolo (1)		(1) Tebuconazolo: max 2 interventi.
Cancri rameali (<i>Fusicoccum amygdali</i>)		Prodotti rameici		
Antracnosi (<i>Colletotrichum acutatum</i> <i>Colletotrichum</i> spp.)				
Cancro batterico delle drupacee (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)		<i>Bacillus subtilis</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus pruni</i> , <i>Brachycaudus</i> spp.)	1	<i>Piretrine</i> Thiacloprid (Neonicotinoidi) (1)	Soglia: presenza	(1) Thiacloprid: max 1 intervento l'anno
Cimicetta del mandorlo (<i>Monosteira unicastata</i>)		<i>Piretrine</i>	Soglia: presenza diffusa nel periodo primaverile	

SCHEDA DISERBO N° 10 – MANDORLO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<p><u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila.</u> <u>L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u></p> <p>(2) Per Glifosate l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.</p>	<p>Glifosate (2)</p> <p>Isoxaben + Oryzalin (1)</p> <p>Oxifluorfen (3) (CS)</p> <p>Pendimetalin (3) (CS)</p> <p>Diflufenican (3) (CS)</p>	<p>30.40</p> <p>10 + 37.9</p> <p>42,9</p> <p>34,8</p> <p>42</p>	<p>9 l/ha</p> <p>3.75 l/ha</p> <p>0,5-0,9 l/ha</p> <p>3 l/ha</p> <p>0,5-0,6 l/ha</p>	<p><u>Interventi agronomici:</u> operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.</p> <p><u>Interventi chimici:</u> operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.</p> <p>(2) Glifosate: max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30,4%) se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione.</p> <p>(1) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza a prefioritura.</p> <p>(3) Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican: max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie.</p> <p>(CS): Candidati alla sostituzione</p>

(2) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della Superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican. Per tutte le altre sostanze attive la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

-Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

-Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 3 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u>	Diflufenicam + Glifosate	3,48-21,76	4-6 l/ha	(1) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza a prefioritura.
		Isoxaben + Oryzalin (1)	10 + 37.9	5 l/ha	

SCHEDA DIFESA N° 11 – NOCE DA FRUTTO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Cancro del colletto (<i>Phytophthora</i> spp.)			<u>Interventi agronomici:</u> - Evitare i ristagni idrici. - Il parassita si sviluppa maggiormente in suoli acidi e ricchi di s.o.. - I portainnesti J. Nigra e l'ibrido J. Nigra x J. Regia sono maggiormente resistenti al patogeno ma non sono consigliabili per la loro sensibilità al CLRV.	
Carie del legno Carie bianca: (<i>Stereum hirsutum</i> , <i>Phomes ignarius</i>) Carie bruna: (<i>Polyporus sulphureus</i> , <i>Phystulina epatica</i>)			Operazioni di sluppatura e eliminazione dei tronchi e delle grosse branche infette. Disinfezione delle superfici di taglio. Uso di mastici protettivi per le ferite.	
Armillaria (<i>Armillaria mellea</i>)			<u>Interventi agronomici:</u> Evitare i ristagni idrici. J. regia presenta una discreta tolleranza verso il fungo	
Antracnosi (<i>Gnomonia leptostyla</i>) Necrosi apicale bruna (<i>Fusarium</i> spp., altri)	2	<u>Prodotti rameici</u> Tebuconazolo (1) Mancozeb (2) Boscalid +Piraclostrobin (6)	- <u>Interventi agronomici</u> Fare attenzione alle varietà più sensibili (Lara). Ridurre le fonti di inoculo e favorire l'arieggiamento. - <u>Lotta chimica</u> I trattamenti cuprici contro la batteriosi sono normalmente sufficienti a contenere la malattia	(1) Tebuconazolo: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Boscalid +Piraclostrobin: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
BATTERIOSI Batteriosi del noce, Necrosi apicale bruna, (<i>Xanthomonas campestris p.v. juglandis</i> , <i>Pseudomonas syringe</i> , <i>Brenneria nigri fluens</i>)	3	<u>Prodotti rameici</u> Mancozeb (2)	- <u>Interventi agronomici</u> Fare attenzione alle varietà più sensibili (Chandler); evitare la bagnatura diretta delle foglie con l'irrigazione; favorire l'aereazione; evitare gli eccessi di concimazione azotata - <u>Lotta chimica</u> Iniziando dal periodo di inizio fioritura, mantenendo una costante protezione cuprica, in particolare, per tutto il periodo della fioritura fino all'allegagione.	(2) Mancozeb: max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.

segue SCHEDA DIFESA N° 11 – NOCE DA FRUTTO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cancro batterico (<i>Pseudomonas syringae</i>)		<i>Prodotti rameici</i>	- Interventi chimici Allo sviluppo dell'avversità, nel periodo autunnale	
PARASSITI ANIMALI				
Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)		<i>Olio minerale</i>	<u>Interventi chimici:</u> Trattamenti al rigonfiamento delle gemme, in caso di forti infestazioni nell'anno precedente. <u>Interventi agronomici:</u> Evitare squilibri nutrizionali	
Afide piccolo (<i>Cromaphis juglandicola</i>)			<u>Interventi chimici:</u> In caso di forti infestazioni in giugno intervenire chimicamente in assenza di ausiliari	
Afidi delle nervature (<i>Callaphis juglandis</i>)			<u>Interventi chimici:</u> In caso di forti infestazioni in giugno intervenire chimicamente in assenza di ausiliari (<i>Trioxys pallidus</i>)	
Cocciniglia bianca (<i>Pseudolaucaspis pentagona</i>)		<i>Olio minerale</i>	<u>Interventi chimici:</u> In caso di forti infestazioni	

segue SCHEDE DIFESA N° 11 – NOCE DA FRUTTO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Mosca delle noci <i>(Rhagoletis completa)</i>		Fosmet (Fosfororganico) (5) Esche proteiche <i>Dispositivi attract and kill attivate con Deltametrina</i>	Per la verifica della comparsa degli adulti, si utilizzano trappole cromotropiche gialle, collocate a partire da metà giugno	(5) Fosmet (Fosfororganico): max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.
Carpocapsa <i>(Cydia pomonella)</i>	4	<i>Confusione sessuale Virus della granulosi *</i> Spinosad (1) Chlorantraniliprole (3) Emamectina (4) Fosmet (Fosfororganico) (5) Deltametrina (Piretroidi) (6)	Interventi chimici: Confusione sessuale: impiegabile in noceti di almeno 2 ettari, dopo aver effettuato un trattamento contro la prima generazione: Installare i dispenser prima dell'inizio dei voli della seconda generazione Soglia: Installare le trappole a feromone. Intervenire con 2 adulti/trappola/settimana. Prima generazione: Usare prodotti ad azione larvicida entro 10 gg. del superamento della soglia. Seconda generazione: Usare prodotti ad azione larvicida entro 8 gg. del superamento della soglia.	Installare almeno 2 trappole per azienda * In prima generazione si consiglia di utilizzare Virus della granulosi con le seguenti modalità: - Si consiglia di non utilizzare il virus in miscela con altri prodotti attivi nei confronti della carpocapsa. - Per problemi di incompatibilità si consiglia di non utilizzare il virus in miscela con prodotti rameici. (1) Spinosad max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità (3) Chlorantraniliprole: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Emamectina: max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Fosmet (Fosfororganico): max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Deltametrina (Piretroidi): max 2 interventi all'anno.
Rodilegno giallo Zeuzera <i>(Zeuzera pyrina)</i>		Trappole a feromoni Erogatori	Interventi biotecnologici: - Si consiglia l'installazione di 5/10 trappole sessuali ad ettaro per catture di massa. In caso di forte pressione del fitofago si può valutare l'impiego della confusione sessuale, con 300 erogatori/ha da installare dalla fine di maggio ai primi di giugno.	
Rodilegno rosso <i>(Cossus cossus)</i>		Trappole a feromoni	In presenza di infestazione effettuare la cattura massale con trappole a feromone	
Cimice asiatica <i>(Halyomorpha halys)</i>		Monitorare la presenza		

SCHEDA DISERBO N° 11 – NOCE DA FRUTTO

INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI:	LIMITAZIONI
Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u>	Glifosate (3) Isoxaben + Oryzalin (2)	30.40 10 + 37.9	9 l/ha 3.75 l/ha	(3)) Glifosate: max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (30,4%) se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione. (2) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza a fine fioritura.

SOLO IMPIANTI IN ALLEVAMENTO FINO A 4 ANNI.

Dicotiledoni e Graminacee	<u>Non ammessi interventi chimici sull'interfila. L'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie (salvo vincoli di etichetta).</u>	Diflufenicam (4) + Glifosate (3)	3,48-21,76	4-6 l/ha	(1) Pendimetalin: da post-raccolta a inizio allegazione; in pre-emergenza delle infestanti; non impiegare in terreni sabbiosi. (2) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie; da dormienza a fine fioritura. (4) Pendimetalin e Diflufenicam utilizzabili in alternativa fra loro.
		Pendimetalin (1) (4)	34,8	3 l/ha	
		Isoxaben + Oryzalin (2)	10 + 37.9	5 l/ha	

SCHEDA DIFESA N° 12 – COTOGNO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Moniliosi del cotogno e Muffa a circoli (<i>Monilinia spp.</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Entomosporiosi (<i>Diplocarpun maculatum</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Afidi	1	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>Sulfoxaflor (2)</i>		(2) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno
Cocciniglia bianca (<i>Pseudolaucaspis pentagona</i>)		<i>Olio minerale</i>		
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	2	<i>Spinosad (1)</i> <i>Confusione sessuale</i> <i>Virus della granulosa</i>	Soglia: Installare le trappole a feromone. Intervenire con 2 adulti/trappola/settimana.	(1) Spinosad max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità

SCHEDA DISERBO N° 12 – COTOGNO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

SCHEDA DIFESA N° 13 – CASTAGNO DA FRUTTO

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Mal dell'inchiostro (<i>Phytophthora cambivora</i>)		Prodotti rameici	- <u>Interventi agronomici</u> Evitare i ristagni idrici Eliminare i primi centri di infezione Isolare l'area infetta dalle zone limitrofe - <u>Interventi chimici</u> Solo interventi localizzati sulle piante colpite nelle prime fasi di sviluppo dell'avversità.	
Cancro corticale (<i>Cryphonectria parasitica</i>)		Prodotti rameici	- <u>Interventi agronomici</u> Eliminazione delle branche disseccate - <u>Interventi chimici</u> Solo interventi localizzati sulle parti colpite	
Fersa o seccume (<i>Mycosphaerella maculiformis</i>)		Prodotti rameici	- <u>Interventi agronomici</u> Eliminare e distruggere le parti disseccate. - <u>Interventi chimici</u> Intervenire a fine estate - inizio autunno solo in caso di gravi infezioni	
PARASSITI ANIMALI				
Balanino (<i>Curculio elephas</i>)	1	Clorantraniliprololo (Antranilammidi) (2)	- <u>Interventi agronomici</u> Distruzione dei frutti prematuramente caduti Raccolta e immediata distruzione del bacato - <u>Interventi chimici</u> Soglia: 3 adulti per pianta	(2) Clorantraniliprololo (Antranilammidi): max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità tra l'allegagione e la maturazione.
Tortrice intermedia (<i>Cydia flagiglandana</i>)	1	Emamectina benzoato (Avermectine) (1) Clorantraniliprololo (Antranilammidi) (2)	- <u>Interventi agronomici</u> Distruzione dei frutti prematuramente caduti Raccolta e immediata distruzione del bacato Monitoraggio dei voli degli adulti mediante trappole a feromoni Dopo l'inizio delle catture degli adulti nelle trappole a feromone, campionare i ricci per valutare la presenza degli stadi giovanili del fitofago ed il relativo danno - <u>Interventi chimici</u> Soglia: su 100 ricci campionati 10-12% dei ricci con presenza di larve	(1) Emamectina benzoato (Avermectine): max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Clorantraniliprololo (Antranilammidi): max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità tra l'allegagione e la maturazione.

<p>Tortrice tardiva (<i>Cydia splendana</i>)</p>	<p>1</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. kurstaki ceppo SA12 Emamectina benzoato (Avermectine) (1)</p>	<p>- <u>Interventi agronomici</u> Distruzione dei frutti prematuramente caduti Raccolta e immediata distruzione del bacato</p> <p>Monitoraggio dei voli degli adulti mediante trappole a feromoni Dopo l'inizio delle catture degli adulti nelle trappole a feromone, campionare i ricci per valutare la presenza degli stadi giovanili del fitofago ed il relativo danno</p> <p>- <u>Interventi chimici</u> Soglia: su 100 ricci campionati 10-12% dei ricci con presenza di larve</p>	<p>(1) Emamectina benzoato (Avermectine): max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>
---	-----------------	---	--	--

SCHEDA DISERBO N° 13 – CASTAGNO DA FRUTTO

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
Diserbo chimico non ammesso					

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

Scheda

1 - Fragola (incluso fuori suolo) e Fragolina

2 - Lampone

3 - Mirtillo

4 - Mora e Rovo

5 - Ribes rosso e nero

6 - Uva spina

SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Fragola POST IMPIANTO				
MALATTIE FUNGINE				
Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Oidium fragariae</i>)	4	<i>Laminarina</i> <i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo <i>Bicarbonato di potassio</i> (6) <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Bacillus pumilis</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> Bupirimate (7) Penconazolo (IBE) (1) Miclobutanil (IBE) (CS)(1) Azoxystrobin (Strobilurine) (2) Boscalid (SDHI)+ Piraclostrobin (Strobilurine) (2) Meptyldinocap (5) Azoxystrobin (Strobilurine) (2)+ Difeconazolo (IBE) (CS)(1) Ciflufenamid+Difenoconazolo (IBE)(CS) (9) Flutriafol (IBE) (1) (solo pieno campo)		(1) IBE al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; con Penconazolo max 2. (2) Strobilurine al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Meptyldinocap : max 2 interventi indipendentemente dall'avversità (7) Bupirimate : max 2 interventi all'anno (CS): candidati alla sostituzione (9) Ciflufenamid + Difeconazolo (IBE) : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa fra i CS. (6) Bicarbonato di potassio : max 8 trattamenti
Marciume bruno del colletto (<i>Phytophthora cactorum</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (4) Fosetil-Al Metalaxil-M		(4) Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11) : max 6 interventi. con dose massima complessiva di 6 kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia.
Vaiolatura (<i>Mycosphaerella fragariae</i>) Maculatura zonata (<i>Diplocarpon eartiana</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Dodina Ciflufenamid+Difenoconazolo (IBE)(CS) (9)		(CS): candidati alla sostituzione (9) Ciflufenamid + Difeconazolo (IBE) : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa fra i CS.
Batteriosi (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>fragariae</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		

Segue SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
segue Fragola POST IMPIANTO				
PARASSITI ANIMALI				
Nottue fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Acronicta rumicis</i> <i>Spodoptera exigua</i> ed altre)	1	Emamectina (3) Etofenprox (Piretroide) (4) Spinetoram (Spinosine) (2) <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>SpliNPV</i> <i>Spinosad (Spinosine) (2)</i>	Soglia: infestazione generalizzata	(2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (3) Emamectina al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cicaline (<i>Empoasca spp.</i>)	2	<i>Piretrine pure</i> Acetamiprid (Neonicotenoide) (8)		(8) Neonicotenoide: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità;
Oziorrinco (<i>Otiorynchus spp.</i>)		<i>Nematodi entomoparassiti</i> <i>Metarhizium a. var aniopliae</i>	Soglia. Intervenire contro le infestazioni larvali irrorando il terreno in settembre - ottobre alla comparsa degli adulti e dei danni sulle foglie.	
Afidi (<i>Macrosiphus euphorbiae</i> , <i>Choetosiphon fragaefolii</i> , altri)	2	<i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Fluvalinate (Piretroidi) (4) Lambdacialotrina (Piretroidi) (4) Acetamiprid (Neonicotenoide) (8) Deltametrina (Piretroidi) (4)	Soglia. Presenza	(4) Piretroidi al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (8) Neonicotenoide: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità;
Drosophila (<i>Drosophila suzukii</i>)	1	Lambda-cialotrina (Piretroide)(4) Spinetoram (Spinosine) (2)	Soglia. Intervenire alla comparsa.	(4) Piretroidi al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Lumache, Limacce e Grillotalpa.		Metaldaeide esca Ortofosfato di ferro esca		
Ragno rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) Ragno giallo (<i>Eotetranychus carpini</i>)	2	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Abamectina Clofentezine Exiatiazox Fenpiroximate Tebufenpirad Milbemectina Etoxazole Bifenazate Pyridaben (solo serra) Spiromesifen (solo serra) (6)	Soglia. Presenza significativa nelle prime fasi vegetative.	(6) Spiromesifen al max 2 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità

Segue SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Solo per Fragola PRODUZIONE AUTUNNALE				
Antracnosi (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	1	Boscalid + Piraclostrobin (Strobilurine) (2)		(2) Strobilurine al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	3	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Laminarina</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 <i>Cerevisane (solo serra)</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> Pyrimetanil (Anilinopirimidine) (4) Fludioxonil + Cyprodinil (Anilinopirimidine) (4) Fenaxamid (Idrossianilidi) (6) Boscalid (SDHI)(1)+ Piraclostrobin (Strobilurine) (2) Mepanapyryn (Anilinopirimidine) (4) Fenpyrazamine (amino-pirazolinone) (6) Fluopyram (SDHI)(1)+Tryfloxystrobin (Strobilurine) (2) Penthiopyrad (SDHI) (8) Isofetamid (SDHI)(1)(solo pieno campo)		(2) Strobilurine al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Anilinopirimidine, Fludioxonil + Cyprodinil; complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Pyrimetanil max 1 intervento l'anno, Mepanapyryn max 1 intervento all'anno. (6) Fenhexamid, Fenpyrazamine (gruppi con stesso meccanismo di azione): complessivamente max 1 intervento all'anno. (8)Penthiopyrad (SDHI) : max 1 intervento all'anno in alternativa agli altri SDHI; (1) SDHI: complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Fragola RIPRESA VEGETATIVA, in <u>coltura protetta</u>				
MALATTIE FUNGINE				
Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Oidium fragariae</i>)	4	<i>Laminarina</i> <i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> (11) <i>Bacillus pumilus</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> Bupirimate (7) Penconazolo (IBE) (1) Miclobutanil (IBE) (CS)(1) Azoxystrobin (Strobilurine) (2) Boscalid + Piraclostrobin (Strobilurine) (2) Meptyldinocap (5) Azoxystrobin (Strobilurine) (2)+ Difeconazolo (IBE) (CS)(1) Fluopyram+Tryfloxystrobin (Strobilurine) (2) Ciflufenamid+Difenoconazolo (IBE)(CS) (9) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (IBE) (1) (CS) (10)		(1) IBE al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; con Penconazolo max 2. (2) Strobilurine al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Meptyldinocap: max 2 interventi indipendentemente dall'avversità (7) Bupirimate: max 2 interventi all'anno (CS): candidati alla sostituzione (9) Ciflufenamid + Difenoconazolo (IBE): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa fra i CS. (10) Fluxapiroxad + Difenoconazolo: in alternativa al difenoconazolo. (11) Bicarbonato di potassio: max 8 trattamenti.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Tricoderma harzianum</i> <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Laminarina</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 <i>Cerevisane (solo serra)</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> Pyrimetanil (Anilinopirimidine) (4) Fludioxonil +Cyprodinil (Anilinopirimidine)(4) Fenhexamid (Idrossianilidi) (6) Boscalid (SDHI)+ Piraclostrobin (Strobilurine) (2) Mepanapyryn (Anilinopirimidine) (4) Fluopyram (SDHI)+Tryfloxystrobin (Strobilurine) (2) Penthiopyrad (SDHI) (8)		(2) Strobilurine al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Anilinopirimidine, Fludioxonil + Cyprodinil : complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Pyrimetanil max 1 intervento l'anno, Mepanapyryn max 1 intervento all'anno. (8)Penthiopyrad (SDHI) : max 1 intervento all'anno in alternativa agli altri SDHI;

Segue SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Segue Fragola RIPRESA VEGETATIVA, in <u>coltura protetta</u>				
Marciume bruno del colletto (<i>Phytophthora cactorum</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> (12) Metalaxil-M (13)		(12) <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11): max 6 interventi con dose massima complessiva di 6 kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia. (13) Metalaxil-M: incorporare al terreno in banda.
Vaiolatura (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)		<i>Prodotti rameici</i> Ciflufenamid+Difenoconazolo (IBE)(CS) (9)		(CS): candidati alla sostituzione (9) Ciflufenamid + Difenoconazolo (IBE): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa fra i CS.
Batteriosi (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>fragariae</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Macrosiphus euphorbiae</i> , <i>Choetosiphon fragaefolii</i> , altri)	1	<i>Piretro</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Deltametrina (Piretroidi) (4) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (4) Acetamiprid (Neonicotinoide) Spirotetramat (2) Flupyradifurone (8)	Soglia. - In prefioritura 10 – 15% di foglioline semiaperte infestate. - Dalla fioritura in poi 25 – 30% di foglioline semiaperte infestate.	(4) Piretroidi al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Spirotetramat: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (8) Flupyradifurone: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

Segue SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
segue Fragola RIPRESA VEGETATIVA, in <u>coltura protetta</u>				
Ragno rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) Ragno giallo (<i>Eotetranychus carpini</i>)	2	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Abamectina (5) Clofentezine Exiatiazox Fenpiroximate Tebufenpirad Milbemectina (*) Etoxazole Bifenazate Pyridaben (solo serra) Spiromesifen (solo serra) (6)	Soglia. Infestazione generalizzata.	(6) Spiromesifen al max 2 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (*) solo contro ragnetto rosso
Nottue fogliari (<i>Phlogophora meticulosa</i> <i>Xestia c-nigrum</i> <i>Noctua pronuba</i> ed altre)	1	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>SpliNPV</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (Spinosine) (7) Emamectina (3) Chlorantraniliprole + abamectina (5) Spinetoram (Spinosine) (7)	Soglia: presenza	(3) Emamectina al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (5) Abamectina: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Drosophila (<i>Drosophila suzukii</i>)	1	Lambda-cialotrina (Piretroidi) Acetamiprid (1) Spinetoram (Spinosine) (7)	Soglia. Intervenire alla comparsa.	(1) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Imidacloprid): nel limite max di 1 intervento all'anno con neonicotinoidi indipendentemente dall'avversità. (7) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>)	2	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Orius laevigatus</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (Spinosine) (7) <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Spinetoram (Spinosine) (7) Terpenoid blend QRD 460 (4)	Interventi biologici: Introdurre 1-2 predatori per mq in più lanci: 2-4 lanci di <i>Orius laevigatus</i> Interventi chimici: Soglia: presenza	(7) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (4) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo colturale con un intervallo minimo di 7 giorni tra un trattamento e l'altro.
Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporarum</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Piretro</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (1) Spiromesifen (solo serra) (6) Flupyradifurone (9) Spirotetramat (2)		(1) Neonicotinoidi (Acetamiprid): nel limite max di 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Imidacloprid: distribuire solo con irrigazioni per manichetta. (6) Spiromesifen al max 2 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (9) Flupyradifurone: max 2 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Spirotetramat: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	1	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Soglia. Presenza accertata con analisi di laboratorio.	

Segue SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Fragola RIPRESA VEGETATIVA, in pieno campo				
MALATTIE FUNGINE				
Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Oidium fragariae</i>)	4	Zolfo <i>Ampelomyces quisqualis</i> Bicarbonato di potassio (11) <i>Laminarina</i> <i>Bacillus pumilus</i> Olio essenziale di arancio dolce Bupirimate (7) Penconazolo (IBE) (1) Miclobutanil (IBE) (CS) (1) Azoxystrobin (Strobilurine) (2) Boscalid (SDHI)(3)+ Piraclostrobin (Strobilurine) (2) Meptyldinocap (5) Azoxystrobin (Strobilurine) (2)+ Difeconazolo (IBE) (1) (CS) Ciflufenamid+Difenoconazolo (IBE)(CS) (9) Flutriafol (IBE) (1) Fluxapiroxad (SDHI) (3) + Difenoconazolo (IBE) (CS) (1) (10)		(1) IBE al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; con Penconazolo max 2. (2) Strobilurine al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Meptyldinocap: max 2 interventi indipendentemente dall'avversità (7) Bupirimate: max 2 interventi all'anno (CS): candidati alla sostituzione (9) Ciflufenamid + Difenoconazolo (IBE): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa fra i CS. (10) Fluxapiroxad + Difenoconazolo: in alternativa al difenoconazolo. (11) Bicarbonato di potassio: max 8 trattamenti. (3) SDHI: complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Laminarina</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 <i>Aureobasidium pullulans</i> Pyrimetanil (Anilinoipirimidine) (4) Fludioxonil+Cyprodinil (Anilinoipirimidine) (4) Fenhexamid (Idrossianilidi) (6) Boscalid (SDHI) + Piraclostrobin (Strobilurine) (2) Mepanapyryn (Anilinoipirimidine) (4) Fenpyrazamine (Amino-pirazolinone) (6) Penthiopyrad (SDHI)(8) Isofetamid (SDHI) (3)		(2) Strobilurine al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Anilinoipirimidine, Fludioxonil+Cyprodinil: complessivamente al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Pyrimetanil max 1 intervento l'anno, Mepanapyryn max 1 intervento all'anno. (6) Fenhexamid, Fenpyrazamine (gruppi con stesso meccanismo di azione): complessivamente max 1 intervento all'anno. (8)Penthiopyrad (SDHI) : max 1 intervento all'anno in alternativa agli altri SDHI; (3) SDHI: complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Vaiolatura (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)		Prodotti rameici Dodina Ciflufenamid+Difenoconazolo (IBE)(CS) (9)		(CS): candidati alla sostituzione (9) Ciflufenamid + Difenoconazolo (IBE): max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa fra i CS.
Marciume bruno del colletto (<i>Phytophthora cactorum</i>)	1	Prodotti rameici <i>Trichoderma asperellum</i> (T25) + <i>Trichoderma atroviride</i> (T11) (12) Metalaxil-M (13)		(12)Trichoderma asperellum (T25) + Trichoderma atroviride (T11): max 6 interventi con dose massima complessiva di 6 kg/ha mediante l'impianto d'irrigazione a goccia. (13) Metalaxil-M: incorporare al terreno in banda in pre-vegetazione.

Segue SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Antracnosi (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	1	Boscalid (SDHI)(3)+ Piraclostrobin (Strobilurine) (2)		(2) Strobilurine al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (3) SDHI : complessivamente max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Batteriosi (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>fragariae</i>)		Prodotti rameici		
PARASSITI ANIMALI				
Nottue fogliari (<i>Phlogophora meticolosa</i> , <i>Xestia c-nigrum</i> , <i>Noctua pronuba</i> ed altre)	2	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>SpliNPV</i> <i>Spinosad (Spinosine)</i> (1) <i>Azadiractina</i> Emamectina (3) Spinetoram (Spinosine) (1)	Soglia: presenza	(1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (3) Emamectina al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDE DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
segue Fragola RIPRESA VEGETATIVA, in pieno campo				
Afidi (<i>Macrosiphus euphorbiae</i> , <i>Choetosiphon fragaefolii</i> , altri)	1	<i>Piretro</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Fluvalinate (Piretroidi) (4) Deltametrina (Piretroidi) (4) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (4) Acetamiprid (Neonicotinoide) (2)	Soglia. Presenza generalizzata	(4) Piretroidi al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Acetamiprid (Neonicotinoide) ; nel limite max di 1 intervento all'anno con neonicoteni, indipendentemente dall'avversità.
Lumache, Limacce e Grillotalpa.		Metaldaeide esca Ortofosfato di ferro esca		
Oziorinco (<i>Otiorynchus spp.</i>)		<i>Nematodi entomopatogeni</i> <i>Metarhizium a. var aniopliae</i>	Soglia. Intervenire contro le infestazioni larvali irrorando il terreno in settembre - ottobre alla comparsa degli adulti e dei danni sulle foglie.	
Ragno rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) Ragno giallo (<i>Eotetranychus carpini</i>)	1	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Abamectina Clofentezine Exiatiazox Fenpiroximate Tebufenpirad Milbemectina Etoxazole Bifenazato	Soglia. Infestazione generalizzata.	
Drosophila (<i>Drosophila suzukii</i>)	1	Lambda-cialotrina (Piretroidi) Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) Spinetoram (Spinosine) (1)	Soglia. Intervenire alla comparsa.	(2) Acetamiprid (Neonicotinoide) ; nel limite max di 1 intervento all'anno con neonicoteni indipendentemente dall'avversità. (1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporarum</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoide) (2) <i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Piretro</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i>		(2) Acetamiprid (Neonicotinoide) ; nel limite max di 1 intervento all'anno con neonicoteni, indipendentemente dall'avversità.
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	1	<i>Orius levigatus</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Amblyseius swirskii</i> <i>Piretro</i> <i>Spinosad (Spinosine)</i> (1) <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> Acrinatrina (Piretroidi) (4) Spinetoram (Spinosine) (1)	Interventi biologici: Introdurre 1-2 predatori per mq in più lanci: 2-4 lanci di <i>Orius levigatus</i> Interventi chimici: Soglia. Presenza	(4) Piretroidi al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram) : max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.

Segue SCHEDA DIFESA N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Miridi		<i>Piretro</i>	Difesa chimica: intervenire localmente e lungo i bordi. Utilizzo di pratiche agronomiche evitando gli sfalci nella fase di bottoni fiorali.	
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)		<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Soglia. Presenza accertata.	

SCHEDA DISERBO N°1 – FRAGOLA (incluso fuori suolo) e Fragolina

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE - SEMINA E PRE TRAPIANTO INTERVENTI LOCALIZZATI NELLE INTERFILE	Graminacee e Dicotiledoni	1	Glifosate (1) Acido pelargonico (2) Con formulati al 30,4% (360g/l) dose massima di 3 l/ha	30,4 (360 g/L)	
POST TRAPIANTO	Graminacee	1	Quizalofop-etile isomero D Quizalop-p-etile	5 12	1,5 1,25

(2) Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane).

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

SCHEDA DIFESA N° 2 – LAMPONE

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Didimella (<i>Dydimella applanata</i>)		<i>Prodotti rameici</i> *	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare eccessi di vegetazione lungo la fila; - evitare sistemi di irrigazione per aspersione; - asportare i polloni colpiti e distruggerli. <u>Interventi chimici:</u> - intervenire sui tralci in fase autunnale.	* Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
Ruggine		<i>Prodotti rameici</i> *	<u>Interventi agronomici</u> - evitare eccessi di vegetazione lungo la fila - evitare sistemi di irrigazione per aspersione - asportare i poloni colpiti e distruggerli	* Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
Muffa grigia (<i>Botritis cinerea</i>)	2	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Bacillus subtilis</i> Pyraclostrobin+Boscalid (1)	<u>Interventi agronomici:</u> - razionali concimazioni azotate; - allevare un numero di tralci regolare a metro lineare (8-10 tralci per le cvs unifere); - adottare ampie distanze tra le file per favorire l'aerazione della massa fogliare; - asportare dall'appezzamento i residui della vegetazione estiva.	(1) Pyraclostrobin+Boscalid: utilizzabile solo in pieno campo, max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i>)		<i>Bicarbonato di potassio</i> (5) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Bacillus pumilus</i> <i>Olio essenziale di arancio Dolce</i>		(5) Bicarbonato di potassio: max 5 trattamenti
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Aphidula idaei</i> , <i>Amphorophora rubi</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Olio minerale</i> * Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2) Etofenprox (Piretroidi) (2) Thiacloprid (Neonicotenoide) (4) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4) Flupyradifurone (6) (solo in serra)	<u>Interventi agronomici:</u> - razionalizzare gli apporti di azoto.	(2) Piretroidi (Lambda-cialotrina, Etofenprox): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (6) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno * Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
Cecidomia della corteccia (<i>Thomasiniana theobaldi</i>)	2	<i>Spinosad (Spinosine)</i> (1)	<u>Interventi agronomici:</u> - ridurre e razionalizzare gli apporti di azoto; - asportare i residui della vegetazione.	(1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.

segue SCHEDA DIFESA N° 2 – LAMPONE

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Tripidi	1	<i>Azadiractina</i> Terpenoid blend QRD 460 (3) solo in serra	<u>Interventi agronomici:</u> - Non sfalciare durante la fioritura <u>Interventi chimici</u> Presenza	(3) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità con un intervallo minimo di 7 giorni tra un trattamento e l'altro.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Amblyseius californicus</i> <i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Olio minerale</i> * Abamectina (5) Clofentezine Terpenoid blend QRD 460 (3) solo in serra		* Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati. (5) Abamectina: non ammesso in coltura protetta. (3) Terpenoid blend QRD 460: max 2 interventi per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità con un intervallo minimo di 7 giorni tra un trattamento e l'altro.
Oziorrinco		<i>Metarhizium a. var. anisopliae</i> <i>Nematodi entomoparassiti</i>	Impiego nella preparazione del terriccio per piante in vaso	
Cicaline (<i>A. decedens</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4) Thiacloprid (Neonicotinoidi) (4)		(4) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4)		(4) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophyla suzukii</i>)	1	Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4) Spinetoram (Spinosine) (1)	<u>Interventi agronomici:</u> Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele. Nelle serre si consiglia l'utilizzo di reti per schermare tutte le aperture per impedire l'ingresso di adulti. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti	(4) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Piretroidi (Lambda-cialotrina, Etofenprox): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.

SCHEDA DIFESA N° 3 – MIRTILLO

AVVERSA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Marciume dei giovani frutticini (<i>Sclerotinia vaccinii</i>)		<i>Prodotti rameici</i> <i>Coniothyrium minitans</i> *	<u>Interventi agronomici:</u> - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto; - potature ottimali.	* Impiego sul terreno in assenza di coltura
Cancri rameali (<i>Phomopsis spp.</i>)		<i>Prodotti rameici</i>	<u>Interventi agronomici:</u> - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto. <u>Interventi chimici:</u> - interventi alla caduta delle foglie.	
Marciumi del colletto (<i>Phytophthora spp., Armillaria</i>)		<i>Prodotti rameici</i> <i>Trichoderma spp.</i>	<u>Interventi agronomici:</u> - utilizzo di suoli drenati; - razionali concimazioni.	
Muffa grigia (<i>Botritis cinerea</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 Pyraclostrobin+Boscalid (1)	<u>Interventi agronomici:</u> - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto; - potature ottimali; - utilizzo di cvs tolleranti.	(1) Pyraclostrobin+Boscalid: utilizzabile solo in pieno campo, max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
PARASSITI ANIMALI				
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophyla suzukii</i>)	1	Fosmet (Esteri fosforici) (3) Spinetoram (Spinosine) (4)	Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele. Nelle serre si consiglia l'utilizzo di reti per schermare tutte le aperture per impedire l'ingresso di adulti. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti	(3) Fosmet: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Afidi (<i>Ericaphis cammelli, ect...</i>)	1	Etifenprox (Piretroidi) (1) Thiacloprid (Neonicotenoide) (2) <i>Azadiractina</i>	Interventi agronomici: - razionalizzare gli apporti di azoto.	(1) Piretroidi (Etifenprox): max 1 intervento indipendentemente dall'avversità (2) Thiacloprid (Neonicotenoide): max 1 intervento indipendentemente dall'avversità

SCHEDA DIFESA N° 4 – MORA E ROVO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Ruggine (<i>Phragmidium spp.</i>)		<i>Prodotti rameici *</i>		* Accertarsi della registrazione dei formulati impiegati.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	2	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Bacillus subtilis</i> Pyraclostrobin+Boscalid (1)	<u>Interventi agronomici:</u> - razionali concimazioni azotate; - allevare 4-5 tralci per ceppo; - adottare ampie distanze tra le file per favorire l'aerazione della massa fogliare; - asportare dall'appezzamento i residui della vegetazione estiva.	(1) Pyraclostrobin+Boscalid: utilizzabile solo in pieno campo, max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i> = <i>Podosphaera aphanis</i>)		Zolfo * <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 <i>Bacillus pumilus</i> Olio essenziale di arancio dolce (*)	<u>Interventi agronomici:</u> - adottare razionali sestri di impianto; - utilizzare cvs resistenti e/o tolleranti; - evitare eccessi di azoto nel suolo.	* Prodotto efficace anche nei confronti degli eriofidi. (*) solo su Mora
Maculatura purpurea dei tralci (<i>Septocya ruborum</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
Septoriosi (<i>Micosphaerella rubi</i>)		<i>Prodotti rameici</i>		
PARASSITI ANIMALI				
Afidi (<i>Aphis ruborum</i> , <i>Amphorophora rubi</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4) Flupyradifurone (6) (solo in serra) <i>Beauveria bassiana</i> Olio minerale *	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare eccessi di azoto	(4) Neonicotinoidi (Acetamiprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno solo su Rovo * Accertarsi della registrazione dei formulati impiegati.
Antonomo (<i>Anthonomus rubi</i>)		<i>Piretro naturale</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4)	<u>Interventi agronomici:</u> - effettuare accurate pulizie dei fossi per contenere il parassita	(4) Neonicotinoidi (Acetamiprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Mosca dei tralci (<i>Lasioptera rubi.</i>)	2	<i>Spinosad</i> (Spinosine) (1)	<u>Interventi agronomici:</u> - asportare i tralci colpiti e distruggerli.	(1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>)	1	<i>Beauveria bassiana</i> Olio minerale * Abamectina solo pieno campo Terpenoid blend QRD 460 ** (2) solo in serra		* Accertarsi della registrazione dei formulati impiegati. ** Registrato solo su mora. (2)Terpenoid blend QRD 460: max 1 intervento per ciclo colturale.

segue SCHEDA DIFESA N° 4 – MORA E ROVO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophyla suzukii</i>)	-	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4) Spinetoram (Spinosine) (1) (*)	Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele. Nelle serre si consiglia l'utilizzo di reti per schermare tutte le aperture per impedire l'ingresso di adulti. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti	(4) Neonicotinoidi (Acetamiprid): al max 1 intervento indipendentemente dall'avversità. (1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (*) Solo su Mora
Eriofide (<i>Acalitus essigi</i>)		Zolfo bagnabile *	<u>Interventi chimici:</u> Intervenire in caso di forti attacchi verificatisi sulla coltura nell'anno precedente.	* Interventi alla ripresa vegetativa
Cicaline	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4)		(4) Neonicotinoidi (Acetamiprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Cecidomia delle galle (<i>Lasioptera rubi</i>)	1	Spinosad (Spinosine) (1)	<u>Interventi agronomici:</u> Asportare e tralci colpiti e distruggerli	(1) Spinosad (Spinosine): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Tortricidi	1	Spinosad (Spinosine) (1)		(1) Spinosad (Spinosine): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (4)		(4) Neonicotinoidi (Acetamiprid, Thiacloprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

SCHEDA DIFESA N° 5 – RIBES ROSSO E NERO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Oidio (<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)		Zolfo Bicarbonato di potassio (4) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS plantarum D747 <i>Bacillus pumilus</i> Olio essenziale di arancio dolce (*)	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare eccessi di azoto; - effettuare razionali potature delle piante; - adottare sestri di impianto razionali; - utilizzare cvs resistenti e/o tolleranti.	(4) Bicarbonato di potassio: max 5 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (*) solo su ribes nero
Antracnosi (<i>Drepanopeziza ribis</i>) Septoria (<i>Speptoria ribis</i>) Ruggine (<i>Cronartium ribicola</i> , <i>Puccinia ribis</i>)		Prodotti rameici *	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare eccessi di azoto; - effettuare razionali potature delle piante. <u>Interventi chimici:</u> - interventi autunnali.	* Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati
Marciumi del colletto Patologie del terreno (<i>Phytophthora cinnamoni</i> , <i>Armillaria mellea</i>)		<i>Trichoderma harzianum</i>	<u>Interventi agronomici:</u> - Evitare terreni asfittici - utilizzare del materiale di propagazione sano - non effettuare interventi ripetuti di fresatura nell'interfila - evitare il passaggio ripetuto di mezzi meccanici su suolo saturo di umidità - adottare l'inerbimento nell'interfila	
Muffa grigia (<i>Botritis cinerea</i>)	2	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS plantarum D747 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Bacillus subtilis</i> Pyraclostrobin+Boscalid (1)		(1) Pyraclostrobin+Boscalid: utilizzabile solo in pieno campo, max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
PARASSITI ANIMALI				
Afide giallo del ribes (<i>Cryptomyzus ribis</i>) Afide verde del ribes (<i>Aphis schneideri</i>)	1	Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2) Thiacloprid (Neonicotenoidi) (3) Olio minerale	<u>Interventi agronomici:</u> - razionalizzare gli apporti di azoto. <u>Interventi chimici:</u> Presenza	(2) Piretroidi: al max 1 intervento indipendentemente dall'avversità (3) Neonicotenoidi (Thiacloprid): al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Cocciniglie (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Comstockaspis perniciososa</i>)		Olio minerale *	<u>Interventi agronomici:</u> - raschiatura dei fusti per l'asportazione degli scudetti.	* Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati
Sesia del ribes (<i>Synanthedon tipuliformis</i>)	2	<i>Spinosad</i> (Spinosine) (1)	<u>Interventi agronomici:</u> - asportare ed eliminare in primavera i tralci colpiti. Utilizzare trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli degli adulti.	(1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.

segue SCHEDA DIFESA N° 5 – RIBES ROSSO E NERO

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Moscerino dei piccoli frutti <i>(Drosophyla suzukii)</i>	1	Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2)* Spinetoram (Spinosine) (1)	<u>Interventi agronomici:</u> Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele. Nelle serre si consiglia l'utilizzo di reti per schermare tutte le aperture per impedire l'ingresso di adulti. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti	(2) Piretroidi: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. * autorizzato su ribes nero
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	1	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Amblyseius californicus</i> Terpenoid blend QRD 460 (3) solo in serra		(3)Terpenoid blend QRD 460: max 1 intervento per ciclo colturale.

SCHEDA DIFESA N° 6 – UVA SPINA

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Oidio (<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)		Zolfo <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS plantarum D747 <i>Bacillus pumilus</i> Olio essenziale di arancio dolce	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare eccessi di azoto; - effettuare razionali potature delle piante; - adottare sestri di impianto razionali; - utilizzare cvs resistenti e/o tolleranti.	
Antracnosi (<i>Drepanopeziza ribis</i>) Septoria (<i>Speptoria ribis</i>) Ruggine (<i>Cronartium ribicola</i> , <i>Puccinia ribis</i>)		Prodotti rameici *	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare eccessi di azoto; - effettuare razionali potature delle piante. <u>Interventi chimici:</u> - interventi autunnali.	* Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati
Marciumi del colletto Patologie del terreno (<i>Phytophthora cinnamoni</i> , <i>Armillaria mellea</i>)		<i>Trichoderma harzianum</i> spp.	<u>Interventi agronomici:</u> - Evitare terreni asfittici - utilizzare del materiale di propagazione sano - non effettuare interventi ripetuti di fresatura nell'interfila - evitare il passaggio ripetuto di mezzi meccanici su suolo saturo di umidità - adottare l'inerbimento nell'interfila	
Muffa grigia (<i>Botritis cinerea</i>)	2	Pyraclostrobin+Boscalid (1) <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600		(1) Pyraclostrobin+Boscalid: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
PARASSITI ANIMALI				
Afide giallo del ribes (<i>Cryptomyzus ribis</i>) Afide verde del ribes (<i>Aphis schneideri</i>)	1	Lambda-cialotrina (Piretroide) (2) Olio minerale	<u>Interventi agronomici:</u> - razionalizzare gli apporti di azoto. <u>Interventi chimici:</u> Presenza	
Sesia del ribes (<i>Synanthedon tipuliformis</i>)	2	<i>Spinosad</i> (Spinosine) (1)	<u>Interventi agronomici:</u> - asportare ed eliminare in primavera i tralci colpiti. Utilizzare trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli degli adulti.	(1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Cocciniglie (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Comstockaspis perniciosa</i>)		Olio minerale *	<u>Interventi agronomici:</u> - raschiatura dei fusti per l'asportazione degli scudetti.	* Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati

segue SCHEDA DIFESA N° 6 – UVA SPINA

AVVERSITA'	N° TRATT: AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Moscerino dei piccoli frutti <i>(Drosophyla suzukii)</i>	1	Lambda-cialotrina (Piretroidi) (2) Spinetoram (Spinosine) (1)	<u>Interventi agronomici.</u> Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele. Nelle serre si consiglia l'utilizzo di reti per schermare tutte le aperture per impedire l'ingresso di adulti. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti	(2) Piretroidi: al max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (1) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram.
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	1	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Amblyseius californicus</i> Terpenoid blend QRD 460 (3) solo in serra		(3) Terpenoid blend QRD 460: max 1 intervento per ciclo colturale.

SCHEDA DISERBO – PICCOLI FRUTTI (LAMPONE, MIRTILLO, MORA E ROVO, RIBES ROSSO E NERO, UVA SPINA)

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	LITRI O KG/HA	LIMITAZIONI
PRE-EEMRGENZA	Dicotiledoni Graminacee	1	Glifosate (2) Acido pelargonico (3)			(2) Glifosate: autorizzato su Lampone, Ribes nero, Uva spina

GIOVANI IMPIANTI NON IN PRODUZIONE

PRE-EEMRGENZA	Dicotiledoni Graminacee	1	Isoxaben + Oryzalin (1)	10 + 37.9	5 l/ha	(1) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie da dormienza a rigonfiamento gemme; autorizzato su Ribes nero e rosso, Mirtillo, Uva spina
---------------	----------------------------	---	-------------------------	-----------	--------	--

(3) Prodotto non selettivo. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane).

(2) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

VITE ed OLIVO

Scheda

1 - Vite

2 – Olivo

SCHEDE DIFESA N° 1 VITE –

AVVERSA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	7	<p><i>Prodotti rameici</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Cerevisane</i> Fosetil-Al (7) Fosfonati di potassio (7) Fosfonato di disodio (7) Folpet (3) Dithianon (3) Mancozeb (Ditiocarbammati) (2) (3) Metiram (Ditiocarbammati) (2) (15) Iprovalicarb (CAA) (4) Dimetomorf (CAA) (4) Mandipropamide (CAA) (4) Benthiovalicarb (CAA) (4) Valifenalate (CAA) (4) + Mancozeb (Ditiocarbammati) (2) (3) Famoxadone (Strobilurine) (1) Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) Metalaxil-M (Fenilammidi) (10) Benalaxil (Fenilammidi) (10) Benalaxil-M (Fenilammidi) (10) Amisulbron (6) Cyazofamid (6) Fluopicolide (13) Cimoxanil (5) Zoxamide (9) Ametoctradina (12) Fluazinam (3) Oxathiapiprolin (17)</p>	<p>Soglie. Fino alla pre-fioritura: intervenire preventivamente sulla base della previsione delle piogge o prima dello scadere del periodo di incubazione. Dalla pre-fioritura in poi: le strategie di controllo sono in relazione alla comparsa o meno della malattia e all'andamento delle condizioni climatiche.</p>	<p>(1) Strobilurine: max 3 interventi all'anno, indipendentemente dalle avversità di cui con Famoxadone max 1 intervento all'anno. (2) Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram): la data entro al quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno. (3) Folpet, Dithianon, Mancozeb, Fluazinam: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, in alternativa fra loro. Con ognuno di essi max 3. (4) CAA: max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui con Benthiovalicarb max 2 interventi all'anno. (5) Cimoxanil: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (6) Cyazofamid, Amisulbron: complessivamente max 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Fosfonati (Fosfonato di potassio, Fosfonato di disodio, Fosetil Al): complessivamente max 10 interventi all'anno di cui max 5 con Fosfonato di potassio e max 7 con Fosfonato di disodio. (9) Zoxamide: max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (10) Fenilammidi: max 3 interventi all'anno; (12) Ametoctradina: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (13) Fluopicolide: max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (15) Metiram: max 3 interventi indipendentemente dall'avversità. (17) Oxathiapiprolin : max 2 interventi all'anno ed usare in miscela con s.a. a diverso meccanismo d'azione.</p>

Segue SCHEDE DIFESA N° 1 – VITE

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVE AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	7	<p><i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo Bicarbonato di potassio Olio essenziale di arancio dolce Laminarina Cerevisane Bacillus pumilus COS-OGA Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24</p> <p>Azoxystrobin (Strobilurine) (1) Trifloxystrobin (Strobilurine) (1) Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) Fenbuconazolo (IBE) (18) Myclobutani (IBE) (CS) (18) Penconazolo (IBE) (18) Tebuconazolo (IBE) (CS) (18) Tetraconazolo (IBE) (18) Difeconazolo (IBE) (CS) (18) Spiroxamina (5) Bupirimate (4) Meptyldinocap (7) Metrafenone (8) Boscalid (SDHI) (12) Cyflufenamide (9) Fluxapyroxad (SDHI) (12) Flutriafol (IBE) (18) Proquinazid (4) Pyriofenone (4) (8)</p>		<p>(1) Strobilurine (Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin): max 3 interventi all'anno, indipendentemente dalle avversità</p> <p>(18) IBE max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con IBE CS (Candidati sostituzione).</p> <p>(4) Bupirimate, Proquinazid, Pyriofenone (CMR): max 2 interventi complessivi all'anno.</p> <p>(5) Spiroxamina: massimo 3 interventi anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>(7) Meptyldinocap: max 2 intervento anno.</p> <p>(8) Pyriofenone (CMR), Metrafenone: max 3 interventi complessivi all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(12) SDHI (Boscalid, Fluxapyroxad, Isofetamid): complessivamente max 2 interventi anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Boscalid e max 1 con Isofetamid..</p> <p>(9) Cyflufenamide: max 2 intervento anno, indipendentemente dall'avversità.</p>

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – VITE

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVE AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	2	<i>Bacillus subtilis</i> (*) <i>Bacillus amyloliquefacis, plantarum, D747</i> <i>Aereobasidium pullulans</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 <i>Eugenolo+Geraniolo+Timolo</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZB24 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600 <i>Cerevisane</i> Pyrimethanil (Anilopirimidine) (1) (**) Cyprodinil (Anilopirimidine) (2) (**) Fludioxonil (2) (**) Boscalid (SDHI) (12) Fenhexamid (4) Fenpyrazamine (11) Fluazinam (3) Isofetamid (SDHI) (12)	I trattamenti sono effettuabili solo dalla fase fenologica di pre-chiusura grappolo in poi.	(1) Pyrimethanil (Anilopirimidine): max 1 trattamento anno. (2) Fludioxonil, Cyprodinil (Anilopirimidine): max 1 trattamento all'anno da soli in alternativa, o in miscela fra loro (4) Fenhexamid: max 1 trattamenti all'anno. (12) SDHI (Boscalid, Fluxapyroxad, Isofetamid): complessivamente max 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità di cui max 1 con Boscalid e max 1 con Isofetamid. (11) Fenpyrazamine: max 1 intervento anno, indipendentemente dall'avversità (3) Folpet, Dithianon, Mancozeb, Fluazinam: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, in alternativa fra loro. Con ognuno di essi max 3. (*) Bacillus subtilis: Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una buona bagnatura del grappolo. (**) Pyrimetanil e miscela Cyprodinil + Fludioxonil registrati anche contro Marciume acido.
Marciume acido (<i>Penicillium</i> spp., <i>Aspergillus</i> spp.)		<i>Bacillus amyloliquefaciens, plantarum D747</i> <i>Bacillus subtilis</i>		
Black-rot o Marciume nero (<i>Guignardia bidwelli</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Mancozeb (Ditiocarbammato) (2) (3) Metiram (Ditiocarbammati) (2) (15) Miclobutanil (CS) (IBE) (18) Azoxystrobin (Strobilurine) (1) Tetraconazolo (IBE) (18) Penconazolo (IBE) (18) Difenoconazolo (CS) (IBE) (18) Trifloxistrobina (Strobilurine) (1) Fenbuconazolo (IBE) (18) Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) + Metiram (Ditiocarbammati) (2) (15)	<u>Interventi agronomici</u> Raccogliere e distruggere i grappoli infetti; Asportare ed eliminare i residui di potatura; <u>Interventi chimici</u> Intervenire su vigneti e varietà a rischio; Privilegiare nella scelta dei fungicidi i prodotti efficaci anche su Black-rot;	(1) Strobilurine (Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin) e simili: max 3 interventi all'anno, indipendentemente dalle avversità (2) Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram): la data entro al quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno. (3) Folpet, Dithianon, Mancozeb, Fluazinam: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, in alternativa fra loro. Con ognuno di essi max 3. (18) IBE max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui max 1 con IBE CS (Candidati sostituzione). (15) Metiram: max 3 interventi indipendentemente dall'avversità.

segue SCHEDA DIFESA N° 1 – VITE

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVE AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	1	Mancozeb (Ditiocarbammati) (2) (3) Pyraclostrobin (Strobilurine) (1) +Metiram (Ditiocarbammati) (2) (15) Folpet (3)		(1) Strobilurine (Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin): max 3 interventi all'anno, indipendentemente dalle avversità (2) Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram): la data entro al quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno. (3) Folpet, Dithianon, Mancozeb, Fluazinam: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, in alternativa fra loro. Con ognuno di essi max 3. (15) Metiram: max 3 interventi indipendentemente dall'avversità.
Mal dell'esca, Eutipiosi (<i>Phaeoacremonium aleophilum</i> , <i>Phaeoconiella chlamydospora</i> , <i>Fomitiporia mediterranea</i>)		<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma atroviride</i> Boscalid + Pyraclostrobin (11)	Interventi agronomici <ul style="list-style-type: none"> • Disinfezione degli attrezzi di potatura con Sali quaternari di ammonio o ipoclorito di sodio; • Disinfezione dei tagli di potatura; • In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione ; • In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti colpite e allevare dal legno sano un nuovo germoglio previa disinfezione dei tagli di potatura; • Segnare in estate le piante infette e le stesse vanno potate separatamente in inverno; 	(11) Boscalid + Pyraclostrobin: trattamento al bruno sui tagli di potatura. Non entra nel cumulo di SDHI e Pyraclostrobin

Segue SCHEDE DIFESA N° 1 – VITE

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
FITOFAGI				
Tignoletta dell'uva (<i>Lobesia botrana</i>) Tignola dell'uva (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	2	<i>Confusione sessuale</i> <i>Bacillus thuringensis</i> (*) <i>Spinosad</i> (<i>Spinosine</i>) (2) Indoxacarb (4) Tebufenozide (10) Metossifenoziide (5) Emamectina (8) Chlorantraniliprole (9) Spinetoram (<i>Spinosine</i>) (2)	Non ammessi interventi chimici contro la prima generazione; sono esclusi da questa limitazione la <i>Confusione sessuale</i> e il <i>Bacillus thuringensis</i> . Obbligo trappole a feromoni. Soglia. 5% di grappoli infestati da uova e larve di 1° o 2° età.	(2) Spinosine (<i>Spinosad</i>, <i>Spinetoram</i>): complessivamente max 3 interventi indipendentemente dall'avversità, <i>Spinetoram</i> max 1 intervento anno indipendentemente dall'avversità, <i>Spinosad</i> max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Metossifenoziide: autorizzato solo su <i>Lobesia</i> . Max 2 interventi all'anno. (8) Emamectina: max 2 trattamenti anno indipendentemente dall'avversità. (9) Chlorantraniliprole: max 1 trattamento anno indipendentemente dall'avversità. (4) Indoxcarb: max 2 trattamento anno indipendentemente dall'avversità. (10) Tebufenozide: max 2 interventi all'anno. (*) <i>Bacillus thuringensis</i>: quando si interviene a fine agosto-prima settimana di settembre il trattamento ha efficacia anche contro la tignola rigata soprattutto su varietà rosse a maturazione medio tardiva o tardiva.
Nottuidi (<i>Noctua fimbriata</i> , <i>Noctua pronuba</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	1	Indoxacarb (4)	Infestazioni occasionali alla ripresa vegetative con danni a carico di gemme e germogli erbacei. In particolare con inizi di stagione caldi. Più frequente in aree collinari	(4) Indoxcarb: max 2 trattamenti anno indipendentemente dall'avversità.
Tignola rigata della vite (<i>Cryptoblabes gnidiella</i>)	1	Chlorantraniliprole (9)	Soglia: presenza Monitorare la presenza di adulti con trappole a feromoni di miscela quaternaria di aldeidi. Monitorare i grappoli da fine luglio per verificare la presenza di larve. Intervenire in presenza di catture crescenti verso fine luglio- prima settimana di Agosto. Sono più sensibili le varietà rosse a maturazione medio-tardiva.	(9) Chlorantraniliprole: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Il trattamento ha efficacia anche contro la Tignoletta della vite.

segue SCHEDA DIFESA N° 1 – VITE

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> <i>Zygina rhamni</i>)	1	<i>Piretrine</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (6) Etofenprox (Piretroidi) (7) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (7) Acrinatrina (Piretroidi) (7) Flupyradifurone (11)		(6) Neonicotinoidi (Acetamiprid): max 2 trattamenti anno indipendentemente dall'avversità. (7) Piretroidi (Tau-Fluvalinate, Acrinatrina, Etofenprox): complessivamente max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Possono influire negativamente sui fitoseidi. (11) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo contro <i>Empoasca vitis</i>
Scafoideo (<i>Scaphoideus titanus</i>)	1	<i>Piretrine</i> <i>Sali di potassio degli acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> Indoxacarb (4) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (6) Etofenprox (Piretroidi) (7) Tau-Fluvalinate (Piretroidi) (7) Acrinatrina (Piretroidi) (7) Flupyradifurone (11)	E'fortemente consigliato l'utilizzo di trappole cromotropiche di colore giallo per il monitoraggio degli adulti (2 – 3 trappole/ettaro nelle parti più fresche del vigneto). Eventuali interventi con caolino sembrano avere effetti positivi contro <i>Scaphoideus titanus</i> .	(6) Neonicotinoidi (Acetamiprid): max 2 trattamenti anno indipendentemente dall'avversità. (7) Piretroidi (Tau-Fluvalinate, Acrinatrina, Etofenprox): complessivamente max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Indoxcarb: max 2 trattamenti anno indipendentemente dall'avversità. (11) Flupyradifurone: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Zigena (<i>Theresimina ampelophaga</i>)		<i>Olio minerale</i>		

segue SCHEDA DIFESA N° 1 – VITE

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cocciniglie (<i>Targionia vitis</i> , <i>Planococcus spp.</i> <i>Parthenolecanium corni</i> , <i>Neopolvinaria innumerabilis</i> <i>Lecanium corni</i> <i>Heliococcus bohemicus</i> <i>Pseudococcus comstoki</i>)	1	<i>Olio minerale</i> Acetamiprid (Neonicotinoidi) (6) Spirotetramat (11) Pyriproxifen (3)	Soglia. Presenza estesa di cocciniglie accertate nell'anno precedente Interventi agronomici Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle zone dove inizia a manifestarsi l'infestazione. Interventi chimici Intervenire solo sui ceppi infestati. Per la <i>T. vitis</i> il periodo più idoneo è alla fuoriuscita delle neanidi (maggio-giugno nelle zone meridionali, metà giugno-metà luglio nelle zone settentrionali) Interventi di lotta biologica <i>Anagyrus vladimiri</i> distribuire l'insetto a partire da fine aprile-maggio con dosaggi stagionali di 1000 individui/ettaro in almeno 2 lanci differiti <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> distribuire l'insetto vicino ai focolai di infestazione delle cocciniglie, indicativamente 500 individui/ettaro. In caso di consistenti infestazioni, l'impiego di <i>Anagyrus</i> può essere ben abbinato a quello di <i>Cryptolaemus</i> Distanziare opportunamente gli interventi insetticidi dai lanci	(3) Pyriproxifen : max 1 trattamento anno indipendentemente dall'avversità. (6) Neonicotinoidi : max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Spirotetramat : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>) Ragnetto giallo (<i>Eotetranychus carpini</i>)	1	Clofentazine Exitiazox Fenpyrozimate Tebufenpirad Etoxazole Abamectina (1) <i>Olio minerale</i> <i>Sali di potassio degli acidi grassi</i> Verificare la possibilità di introduzione di antagonisti tramite tralci di vite con presenza significativa del predatore.	Soglia. Prima di intervenire verificare presenza antagonisti. L'intervento è ammesso solo con limitata presenza di antagonisti - inizio vegetazione 60-70% di foglie con forme mobili presenti - piena estate 30-45% di foglie con forme mobili presenti.	(1) Abamectina : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Acariosi della vite (<i>Calepitrimerus vitis</i>)	1	<i>Sali di potassio degli acidi grassi</i> <i>Olio minerale</i> <i>Zolfo</i> Abamectina (1)	Interventi chimici Intervenire solo in caso di forte attacco · all'inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza lla annata precedente · in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli	(1) Abamectina : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

segue SCHEDA DIFESA N° 1 – VITE

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Fillossera della vite (<i>Viteus vitifoliae</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (6) Spirotetramat (11)	Soglia: intervenire in pre o post fioritura con presenza delle prime galle.	(6) <u>Neonicotinoidi</u> : max 2 trattamenti anno indipendentemente dall'avversità. (11) <u>Spirotetramat</u> : max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Cervi, Daini, Caprioli, Camosci	2	Grasso di pecora		

SCHEDE DISERBO N° 1 – VITE

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	PRINCIPI ATTIVI (P.A.)	% P. ATTIVO (P.A.)	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO AMMESSI COME ERBICIDA:	LIMITAZIONI
Allevamento e produzione	Fogliare (Post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1) Acido pelargonico (5)	30.40 71.96	9 l/ha 16 l/ha	<p>(1) Glifosate: utilizzare 6 litri/ha/anno se impiegato un prodotto ad azione residuale;</p> <p>(2) Flazasulfuron: impiegabile solo ad ANNI ALTERNI. Da utilizzare in miscela con Glifosate nel periodo fine inverno-inizio primavera in alternativa al Penoxulam+Oryzalin e Isoxaben+Oryzalin.</p> <p>(3) Carfentrazone: impiegabile come diserbante (0,3 l/ha) e spollonante (0,3 litri in 100 litri di acqua; 0,8-1 litri di miscela per 10 metri lineari).</p> <p>(4) Pyraflufen-ethyle: spollonante alla dose di 0,8 l/ha.</p> <p>(5) Acido pelargonico: impiegabile come diserbante e spollonante.</p> <p>(6) Penoxsulam + Orizalin: in alternativa al Flazasulfuron, Isoxaben+Orizalin e Penoxsulam oltre il quarto anno di impianto e fino a un massimo del 40% della superficie del vigneto</p> <p>(7) Diflufenicam: solo contro le dicotiledoni; riposo vegetativo fino a un mese dal germogliamento.</p> <p>(8) Propaquizafop: max 1 intervento all'anno.</p> <p>(9) Penoxsulam: max 1 intervento all'anno; in alternativa al Penoxulam+Oryzalin; impiegabile da marzo a metà luglio.</p> <p>(10) Isoxaben + Oryzalin: max 1 intervento all'anno e fino a un massimo del 30% della superficie; in allevamento da dormienza fino allo stadio di fine fioritura; in produzione da dormienza fino a rigonfiamento gemme. In alternativa al Flazasulfuron e Penoxulam+Oryzalin.</p> <p>(11) Isoxaben: a fine inverno fino alla fioritura fino a un max del 30% della superficie.</p> <p>(12) Diflufenican+Glifosate: impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura.</p> <p>(13) Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican: max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro e utilizzabili sul 30% della superficie.</p>
		Dicotiledoni e spollonante	Carfentrazone (3)	6.45	0,3 l/ha	
		Spollonante	Pyraflufen ethyle (4)	2.5		
Non ammessi interventi chimici sull'interfila	Residuale (Pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Cicloxdim	10.8	2-4 l/ha	
			Cletodim	25.2	1,5 l/ha	
			Propaquizafop (8) Quizalofop-p-etile	9.60 5,4	0,8-2,0 l/ha 1-3 l/ha	
		Dicotiledoni e graminacee	Penoxsulam (9) Penoxsulam + Orizalin (6)	2,1 0.12 + 40.47	0,75 l/ha 5 l/ha	
Dicotiledoni e graminacee	Flazasulfuron (2) Isoxaben + Oryzalin (10)	0,67 10 +37,9	3 Kg/ha 5 l/ha			
Dicotiledoni e graminacee	Pendimetalin (13) Diflufenican (7) (13) Oxifluorfen (13)	40 42 22	3 l/ha 0,5-0,6 l/ha 2 l/ha			
Dicotiledoni	Isoxaben (11)	45,5	1,25-l/ha			

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican, pertanto le dosi indicate devono essere ridotte al 30%, esempio per il Glifosate: in 1 ettaro con formulato a 360 g/l (30,4%) il 30% di 9 l diventa 2,7 l/ha/anno = a 972 g di principio attivo/ha, se non si usano erbicidi residuali; 1,8 l/ha = 648 g/principio attivo/anno con uso di erbicidi residuali.

Per tutti gli altri principi attivi la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli più restrittivi in etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: a) vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%); b) vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m.1,5/2.

SCHEDA DIFESA N° 2 – OLIVO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE e BATTERICHE				
Occhio di pavone (<i>Spilotoaea oleagina</i>) Piombatura (<i>Mycocentrospora cladosporioides</i>)	1	<i>Prodotti rameici</i> Dodina (2) Fenbuconazolo (3) Azoxystrobin + Difenconazolo (6)	Occhio di pavone <u>Interventi agronomici</u> - impiegare varietà poco suscettibili; - adottare sedi d'impianto non troppo fitti; - favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma; - effettuare concimazioni equilibrate; Piombatura <u>Interventi agronomici</u> - mantenere un buono stato vegetativo delle piante e una buona aerazione della chioma; - evitare apporti di acqua superiori a quanto richiesto dalla coltura;	(2) Dodina: max 1 intervento anno e solo nel periodo primaverile. (3) Fenbuconazolo: ammesso solo contro occhio di pavone; max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità tra ripresa vegetativa e prefioritura. (6) Azoxystrobin + Difenconazolo : ammesso solo contro occhio di pavone; max 1 intervento all'anno da prime foglioline separate a pre-schiusura infiorescenze;
Rogna (<i>Pseudomonas syringae pv. savastanoi</i>)		<i>Prodotti rameici</i>	<u>Interventi agronomici</u> - eliminare e distruggere i rami colpiti; - eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami infetti; - evitare dove è possibile la formazione di microferite nel periodo autunnale specialmente durante le operazioni di raccolta; <u>Interventi chimici</u> Intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo sulle piante, soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in post-raccolta;	

segue SCHEDA DIFESA N° 2 – OLIVO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Antracnosi o lebbra dell'olivo (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , prima <i>Gloeosporium olivarum</i>)	2	<i>Prodotti rameici</i> Pyraclostrobin (1) Tryfloxystrobin+Tebuconazolo (3) Mancozeb (4)	Interventi agronomici - effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma; - anticipare la raccolta Interventi chimici Gli interventi vanno effettuati esclusivamente nelle aree in cui è stata riscontrata la malattia e vanno programmati in relazione all'entità della malattia stessa. Con infezioni medio alte nell'annata precedente, effettuare un intervento prima della fioritura per devitalizzare i conidi presenti sulle olive residue. Nel corso dell'annata vegetativa, gli interventi devono essere programmati dal periodo post allegazione in relazione al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni.	(1) Pyraclostrobin: max 1 intervento all'anno da grano di pepe, entro il 31 luglio. (3) Tryfloxystrobin+Tebuconazolo: max 1 intervento anno tra ripresa vegetativa e pre-fioritura, solo in caso di infestazioni medio-alte nell'annata precedente. (4) Mancozeb: max 1 trattamento all'anno nel periodo autunnale.
PARASSITI ANIMALI				
Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>)	LOTTA LARVICIDA 2 Trattamenti (Province di AR, SI, FI, PO, PT, MS) 3 Trattamenti (Province di LU, LI, PI, GR)	Phosmet (2) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (5)	Soglia. 5-10% di olive con punture fertili: uova, larve di I° e larve di II° età.	(2) Phosmet: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Si consiglia di acidificare l'acqua. (5) Acetamiprid (Neonicotinoidi): max 2 interventi all'anno contro l'avversità; complessivamente max 2 interventi all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità;
	LOTTA ADULTICIDA	<u>Dispositivi ad azione attract and kill:</u> a. Spinosad con specifica esca pronta all'uso (4); b. Acetamiprid con aggiunta di esca alimentare/attrattiva (7) c. dispositivi con attrattivi alimentari e/o feromonici, e/o avvelenati con Deltametrina. <u>Prodotti ad azione repellente:</u> Beauveria bassiana	Obbligo di installare trappole cromotropiche gialle da metà giugno. Soglia. Presenza di adulti nelle trappole cromotropiche gialle I trattamenti con prodotti rameici ammessi per le malattie fungine hanno degli effetti positivi anche nel contenere gli attacchi della mosca delle olive Eventuali trattamenti con Caolino contro le bruciature dal sole sembrano avere effetti positivi nel contenere gli attacchi della mosca delle olive.	(4) Spinosad con specifica esca pronta all'uso: max 8 applicazioni all'anno. (7) Acetamiprid (Neonicotinoidi) con aggiunta di esca attrattiva/alimentare: max 3 interventi all'anno con intervallo tra le applicazioni di 10 giorni;

segue SCHEDA DIFESA N° 2 – OLIVO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>)	1	<i>Olio minerale</i> <i>Piretrine</i> Fosmet (2)	Soglia. 5-10 neanidi vive per foglia (nel periodo estivo) Interventi agronomici - Potatura con asportazione delle parti più infestate e bruciatura delle stesse; - Limitare le concimazioni azotate; - Favorire l'insolazione all'interno della chioma con la potatura. Interventi chimici Vanno effettuati al superamento della soglia e nel momento di massima schiusura delle uova e fuoriuscita delle neanidi (orientativamente da luglio a agosto) La presenza della cocciniglia non è mai generalizzata, pertanto è preferibile limitare gli interventi alle zone più infestate dell'oliveto e prima di qualsiasi intervento chimico verificare la presenza di antagonisti naturali come il <i>Metaphichus</i> , <i>Scutellista</i> , ecc.	(2) Phosmet: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Si consiglia di acidificare l'acqua.
Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)	1	<i>Bacillus thuringiensis</i> Phosmet (2) Spinetoram (6) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (5)	Intervento ammesso solo contro la generazione carpofaga (oliva grano di pepe). Soglia. 20% di olive infestate da uova e/o larve in fase di penetrazione	(2) Fosmet: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Si consiglia di acidificare l'acqua. (6) Spinetoram: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità; (5) Acetamiprid (Neonicotinoidi): max 1 intervento all'anno contro l'avversità; complessivamente max 2 interventi all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità;
Cecidomide olivo (<i>Dasineura olea</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (5)	Soglia Monitorare la presenza; intervento larvicida in presenza di larve di 1° età; valutare la presenza di parassitizzazione.	(5) Acetamiprid (Neonicotinoidi): max 1 intervento all'anno contro l'avversità; complessivamente max 2 interventi all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità;
Sputacchina (<i>Philaenus spumarius</i>)	1	Acetamiprid (Neonicotinoidi) (5) Spinetoram (6)	Trattamenti da effettuare nelle zone delimitate contro le forme adulte del vettore di <i>Xylella fastidiosa</i> , secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale competente	(5) Acetamiprid (Neonicotinoidi): max 1 intervento all'anno contro l'avversità; complessivamente max 2 interventi all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità; (6) Spinetoram: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità;
Margaronia (<i>Palpita unionalis</i>)		<i>Olio minerale</i> <i>Piretrine</i>	Interventi chimici Intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di accertato consistente attacco sulle piante adulte.	

segue SCHEDA DIFESA N° 2 – OLIVO

AVVERSITA'	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Scolitidi Fleotribo <i>(Phloeotribus scarabaeoides)</i> Illesino <i>(Hylesinus oleiperda)</i>			<u>Interventi agronomici</u> Eliminare i rami e le branche deperiti e infestati mantenendo l'oliveto in buono stato vegetativo Subito dopo la potatura lasciare nell'oliveto "rami esca" da asportare e bruciare dopo l'ovodeposizione, quando si notano le tipiche rosure degli insetti.	

SCHEDA DISERBO N° 2 – OLIVO

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	PRINCIPI ATTIVI (P.A.)	% P. ATTIVO (P.A.)	INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI APPLICAZIONI SONO ANNUALMENTE AMMESSI COME ERBICIDA:	LIMITAZIONI
Allevamento e produzione	Fogliare (Post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1)	30.40	9 l/ha	<p>Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.</p> <p>(1) Glifosate: utilizzare 6 litri/ha/anno se impiegato un prodotto ad azione residuale; (2) Carfentrazone: impiegabile come diserbante (0,3 l/ha) e spollonante (1l/ha). (3) Flazasulfuron: max 1 intervento da utilizzare in miscela con glifosate nel periodo gennaio-marzo. (4) Pyraflufen-ethile: impiegabile come diserbante (0,8l/ha) e spollonante (0,8 l/ha). (5) Tribenuron metile: max 1 intervento all'anno in post emergenza delle infestanti a foglia larga in autunno o fine inverno-inizio primavera. (6) Florasulam + Penoxulam: max 1 intervento all'anno tra ottobre e novembre. (7) Diflufenicam: max 1 intervento all'anno nel limite del 30% della superficie e in alternativa a Oxifluorfen. (8) Fluazifop p-butile: contro graminacee annuali e biennali e sorghetto (9) Oxifluorfen.: max 1 intervento all'anno nel limite del 30% della superficie e in alternativa a Diflufenican.</p>
		Dicotiledoni e polloni	Carfentrazone (2)	6.45	0,3 l/ha	
			Pyraflufen ethyle (4)	2.5	0,8 l/ha	
		Graminacee	Fluazifop p-butile (8)	13,3	1,5-2 l/ha	
Produzione		Dicotiledoni	Tribenuron metile (5)	50	25-40 g/ha	
Allevamento e produzione	Residuale (Pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Florasulam+Penoxulam (6)	6.82+13.6	0.1 l/ha	
			Flazasulfuron (3)	25	60-80 gr/ha	
			Oxifluorfen (9)	22	2 l/ha	
			Diflufenican (7)	42	0,5-0,6 l/ha	
Allevamento fino a 3 anni			Diflufenican (7)	42	0,5-0,6 l/ha	

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie per il Glifosate e per i prodotti residuali candidati alla sostituzione Oxifluorfen, Diflufenican, pertanto le dosi indicate devono essere ridotte al 30%, esempio per il Glifosate: in 1 ettaro con formulato a 360 g/l (30,4%) il 30% di 9 l diventa 2,7 l/ha/anno = a 972 g di principio attivo/ha, se non si usano erbicidi residuali; 1,8 l/ha = 648 g/principio attivo/anno con uso di erbicidi residuali.

Per tutti gli altri principi attivi la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli più restrittivi in etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: a) vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%); b) vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m.1,5/2.

Interventi agronomici

Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

Interventi chimici

Interventi localizzati sulle file, operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.

Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

-vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

-vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici

FLORICOLE ED ORNAMENTALI

Scheda

1 – Floricole ed ornamentali

La presente scheda tecnica DIFESA e DISERBO include le seguenti schede tecniche AGRONOMICHE:

1 - Fiore e fronda recisa in serra su terreno

2 - Fiore e fronda recisa in serra su substrato (fuori suolo)

3 - Verdi in vaso in serra

4 - Vaso fiorito in serra

5 - Vaso fiorito in piena aria

6 - Fiore reciso in piena aria

7 - Fronde recise in piena aria

8 - Conifere su terreno

9 - Conifere in vaso

10 - Erbacee perenni in contenitore

11 - Latifoglie e arbusti su terreno

12 - Latifogli e arbusti in contenitore

13 - Tappeti erbosi

SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Phytophthora spp.</i> , <i>Peronospora spp.</i>)		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 (in serra) <i>Composti rameici</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> (6) Cimoxanil (13) Propamocarb Dimetomorf (12)	<u>Interventi agronomici</u> - evitare le irrigazioni sopra chioma e gli eccessi idrici; - eviare i repentini sbalzi termici; - evitare gli impianti troppo fitti; - evitare lo sgocciolamento dell'acqua di condensa (mediante impiego di sottotelo) <u>Interventi chimici</u> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	(13) Cimoxanil: autorizzato solo su rosa (12) Dimetomorf: autorizzato solo su gerbera e garofano contro <i>Phytophthora spp.</i> (6) Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride: solo su colture per fiori recisi fino a max 5 interventi
Marciumi basali e radicali (<i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>)		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 (in serra) <i>Streptomyces griseoviridis</i> * <i>Trichoderma spp</i> <i>Coniothyrium mimitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> (6) Dimetomorf (8) Fosetil alluminio (7) Metalaxil-M (Fenilammidi) (1) Propamocarb *	<u>Interventi agronomici</u> - eliminare i ristagni idrici; - in pre-impianto disinfettare il terreno con vapore o con la solarizzazione; <u>Interventi chimici</u> Intervenire in presenza di sintomi	(1) Fenilammidi al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità * Solo al terreno. (8) Dimetomorf autorizzato solo su garofano e gerbera, contro <i>Phytophthora spp.</i> (7) Fosetil alluminio autorizzato solo su ornamentali (6) Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride : solo su colture per fiori recisi fino a max 5 interventi
Marciumi (<i>Sclerotinie spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Corticium spp.</i>)		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 (in serra) <i>Trichoderma spp</i> <i>Coniothyrium mimitans</i> Tolclofos-metil (2) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> (solo contro <i>Rhizoctonia solani</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) (6) Flutolanil (14)	<u>Interventi agronomici</u> - eseguire un accurato drenaggio ed equilibrate concimazioni; - trapiantare superficialmente; - controllare l'umidità della serra; - distruggere le piante infette; - disinfettare il terreno con il vapore o con la solarizzazione. <u>Interventi chimici</u> ai primi sintomi	(2) Tolclofos metil: al massimo 1 trattamento per ciclo culturale. Autorizzato solo contro <i>Rhizoctonia</i> (6) Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride : solo su colture per fiori recisi fino a max 5 interventi (14) Flutolanil: solo su Garofano con max 1 intervento per ciclo culturale

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Fusariosi (<i>Fusarium spp</i>) Tracheoverticillosi (<i>Verticillium spp.</i>)		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 (in serra) <i>Streptomyces griseoviridis</i> <i>Trichoderma spp</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> (solo contro <i>Fusarium spp.</i>) (6)	<u>Interventi agronomici</u> - evitare le lesioni ai bulbi - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente; - adottare cultivar meno suscettibili; - distruggere le piante infette; - disinfettare il terreno con il vapore o con la solarizzazione	(6) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> : solo su colture per fiori recisi fino a max 5 interventi
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Oidium chrisanthemi</i> <i>O. tabaci</i> ecc.)		<i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo <i>Bicarbonato di potassio</i> (10) <i>Olio essenziale di arancio</i> * <i>Bacillus subtilis</i> Bupirimate* Penconazolo (IBE) (3) Difenoconazolo* (IBE) (3) Miclobutanil* (IBE) (3) Tetraconazolo* (IBE) (3) Procloraz (IBE) (3) * Trifloxystrobin* Boscalid (SDHI) + Pyraclostrobin (Strobilurine) (4) Metrafenone (solo serra) Fenprodin + Penconazolo (solo su Rosa e gerbera in serra in coltivazioni non a contatto con il suolo) (IBE) (7) Tebuconazolo (IBE) (CS) (3) Azoxyastrobin (Strobilurine) + Isopyrazam (SDHI) (solo in serra)	<u>Interventi agronomici</u> - eliminare le foglie ed i getti colpiti; - effettuare irrigazioni e concimazioni equilibrate. <u>Interventi chimici</u> alla comparsa dei primi sintomi	(3) IBE: al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (4) Boscalid (SDHI)+ Pyraclostrobin (Strobilurine), Trifloxystrobin (Strobilurine): complessivamente al massimo max 3 trattamenti per SDHI e max 3 trattamenti per Strobilurine per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (7) Fenprodin + Penconazolo (IBE): max 3 interventi per ciclo colturale e max 6 interventi all'anno suddivisi in due blocchi per Rosa e max 3 interventi all'anno per Gerbera. (10) Bicarbonato di potassio: max 8 interventi solo su rosa e colture floricole porta seme. * Autorizzazioni di etichetta limitate: Bupirimate autorizzato solo su rosa. Max 2 interventi all'anno. Miclobutanil autorizzato solo su rosa e garofano Difeconazolo autorizzato solo su rosa e garofano Tetraconazolo autorizzato solo su rosa, gladiolo, diffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera, garofano, hypericum, pelargonio Trifloxystrobin autorizzato solo su rosa Procloraz: autorizzato solo su rosa e garofano, bulbose da fiore, euforbia pulcherrima, piante ornamentali. Olio essenziale di arancio: su rosa e altre colture floreali, alberi ed arbusti ornamentali.

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ruggine (<i>Phragmidium spp.</i> , <i>Uromyces caryophyllinus</i> , ed altre)		<i>Composti rameici</i> <i>Olio essenziale di arancio*</i> Miclobutanil * (IBE –CS) (3) Penconazolo (IBE) (3) Tetraconazolo * (IBE) (3) Mancozeb (solo in pieno campo) * Metiram (13) Dithianon (solo in pieno campo) (2)	<u>Interventi agronomici</u> • riscaldamento e ventilazione adeguati della serra; • raccolta e distruzione delle foglie e dei rametti infetti; <u>Interventi chimici</u> • intervenire alla comparsa dei primi sintomi;	(3) IBE: al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (2) Dithianon: al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (13) Metiram: autorizzato in pieno campo e serra solo su garofano * autorizzazioni limitate: Miclobutanil: autorizzato solo su rosa e garofano Tetraconazolo autorizzato solo su rosa,gladiolo, diffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera,garofano, hypericum, pelargonio Mancozeb: autorizzato solo su rosa, garofano, crisantemo, garofano, rosa, giglio, iris, piante ornamentali. Olio essenziale di arancio: su crisantemo

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> SBS <i>plantarum</i> D747 (in serra) <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 (pieno campo e serra)* (7) Dithianon (solo in pieno campo) (2) Cyprodinil+Fludioxonil * (1) Pyrimethanil * Procloraz (IBE) (3) Mancozeb (solo in pieno campo) * Boscalid +Pyraclostrobin (solo in serra)(4)	Interventi agronomici <ul style="list-style-type: none"> assicurare una buona aerazione della serra; evitare le irrigazioni a pioggia; Interventi chimici <ul style="list-style-type: none"> intervenire alla comparsa dei primi sintomi; 	(1) <u>Cyprodinil+Fludioxonil</u> al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale; autorizzato solo su floricole (2) <u>Dithianon</u> al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (3) <u>IBE</u> al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (4) <u>Boscalid + Pyraclostrobin</u> al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (7) <u>Pythium oligandrum Ceppo M1</u> : max 4 interventi. * Autorizzazioni di etichetta limitate <u>Cyprodinil+Fludioxonil</u> autorizzato solo su floricole <u>Pyrimetanil</u> autorizzato solo su ciclamino <u>Procloraz</u> : autorizzato su rosa, bulbose da fiore, euforbia pulcherrima, piante ornamentali. <u>Mancozeb</u> : autorizzato solo su rosa e garofano; <u>Pythium oligandrum Ceppo M1</u> : autorizzato su ornamentali
Alternaria		Composti rameici	Interventi agronomici <ul style="list-style-type: none"> Eliminare e distruggere i residui di piante infette Interventi chimici <ul style="list-style-type: none"> Intervenire solo alla comparsa dei sintomi 	
Septoria		Composti rameici		
Cladosporiosi				
Antracnosi		Composti rameici		

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ticchiolatura (<i>Diplocarpon rosae</i> <i>Venturia spp</i> <i>Fusicladium spp.</i>)		<i>Composti rameici</i> Miclobutanil * (IBE) (3) Dithianon (solo in pieno campo) (2) Mancozeb	<u>Interventi agronomici</u> <ul style="list-style-type: none"> • abbassare l'umidità relativa al di sottodell'85%, mediante ventilazione e riscaldamento; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • scegliere cultivar resistenti; • evitare di bagnare le foglie con l'irrigazione; • distruggere, per quanto possibile, le foglie infette in autunno; <u>Interventi chimici</u> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa delle prime macchie fogliari; 	(3) IBE al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (2) Dithianon al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Miclobutanil autorizzato solo su rosa e garofano
Cancro del cipresso (<i>Seridium cardinale</i>)	3	Tiofanate metil (1)		Solo piante ornamentali in vivaio (1) Tiofanate metil al massimo 3 trattamenti anno, indipendentemente dall'avversità.
Virosi (<i>CMV, LSV, TSW</i>)			<u>Interventi agronomici</u> impiego di materiale sano ed eliminazione piante infette; <u>Interventi chimici</u> <ul style="list-style-type: none"> • lotta agli insetti vettori; 	
Batteriosi (<i>Erwinia spp.</i> <i>Pseudomonas spp.</i> <i>Altre</i>)		Composti rameici	<u>Interventi agronomici</u> effettuare accurato drenaggio del terreno; effettuare irrigazioni equilibrate; in pre-impianto disinfettare il terreno con vapore impiegare materiale di propagazione sano e certificato;	

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
FITOFAGI				
Afidi <i>(Aphis gossipy</i> <i>Macrosiphoniella</i> <i>chrysantheri</i> <i>Macrosiphum spp.</i> <i>Myzus spp.</i> <i>Rhopalosiphum padi)</i> <i>Aphis fabae**</i> <i>Phyllaphis fagi**i</i>		<i>Aphidius colemani</i> <i>Lysiphlebus testaceipes</i> <i>Olio minerale*</i> <i>Azadiractina</i> <i>Piretrine naturali</i> <i>Sali potassici di acidi grassi*</i> Alfacipermetrina * (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Cipermetrina * (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Esfenvalerate (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Pirimicarb Sulfoxaflor (10) (pieno campo e serra) Maltodestrina (11) (solo in serra) Flupyradifurone (12) (solo serra)	Soglia. Alla comparsa delle prime colonie	(1) Piretroidi : al massimo 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalerate max 1 per anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi (Acetamiprid) : al massimo 2 trattamenti per anno indipendentemente dall'avversità (10) Sulfoxaflor : max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (11) Maltodestrina : fino a un max di 20 interventi per ciclo culturale. (12) Flupyradifurone : max 1 intervento all'anno a partire dalla fase di inizio fioritura solo per bulbose da fiore. * Autorizzazioni di etichetta limitate: <u>Alfacipermetrina, Cipermetrina, Tau-Fluvalinate</u> : divieto d'impiego in serra <u>Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi</u> : verificare autorizzazioni indicate in etichetta. <u>Flupyradifurone</u> : solo su bulbose da fiore. ** utilizzabile solo Sulfoxaflor

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Tripidi (<i>Thrips spp.</i> <i>Heliethrips spp.</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>)		<i>Amblyseius swirkii</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio minerale*</i> <i>Piretrine naturali</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi*</i> <i>Spinosad (Spinosine) * (4)</i> <i>Steinema feltiae</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> Spinetoram (Spinosine) (4) Alfocipermetrina * (Piretroidi) (1) Acrinatrina (Piretroidi) * (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Cipermetrina* (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Lufenuron (5) Etofenprox (Piretroidi) (1) Abamectina (13) Cyantraniliprole (Diamidi) (**) (In serra coltivazioni non a contatto con il suolo)	Interventi agronomici <ul style="list-style-type: none"> • distruzione dei residui colturali; • eliminazione delle infestanti; Installare trappole cromotropiche di colore azzurro. Soglia Intervenire alle prime catture nelle trappole.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalerate max 1) per anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi (Acetamiprid): al massimo 2 trattamenti per anno indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosine (Spinosad, Spinetoram): max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità di cui max 2 interventi con Spinetoram. (5) Lufenuron: autorizzato solo in coltura protetta (13) Abamectina: max 2 interventi per ciclo colturale. * Autorizzazioni di etichetta limitate: <u>Alfacipermetrina, Cipermetrina, Tau-Fluvalinate, Acrinatrina</u> divieto d'impiego in serra <u>Spinosad</u> autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali <u>Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi:</u> verificare autorizzazioni indicate in etichetta. (**) Autorizzato su piante ornamentali in vaso, fiori recisi, alberi e arbusti in vaso, piante perenni in vaso.

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		<i>Encarsia spp.</i> <i>Eretmocerus eremicus</i> <i>Amblyseius swirkii</i> <i>Olio minerale*</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Piretrine naturali</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi*</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> Alfa-cipermetrina * (Piretroidi) (1) Betaciflutrin (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Buprofezin Pyriproxyfen (3) Sulfoxaflor (10) (pieno campo e serra) <i>Maltodestrina</i> (11) (solo in serra) Flupyradifurone (12) (solo in serra) Pyriproxyfen (14) (solo pieno campo)	Installare trappole cromotropiche di colore giallo. <u>Soglia</u> Intervenire alle prime catture nelle trappole	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalerate max 1) per anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi (Acetamiprid): al massimo 2 trattamenti per anno indipendentemente dall'avversità. (3) Pyriproxyfen: al massimo 1 trattamento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (10) Sulfoxaflor: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa al trattamento con neonicotenoide. (11) Maltodestrina: fino a un max di 20 interventi per ciclo colturale. (12) Flupyradifurone: max 2 intervento all'anno solo su piante ornamentali e da fiore. (14) Pyriproxyfen: max 1 intervento all'anno. * note e limitazioni: Alfa-cipermetrina: solo in pieno campo Olio essenziale di arancio: su rosa ed altre colture floreali. Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi: verificare autorizzazioni indicate in etichetta.
Cicaline (<i>Tiphocyba rosae</i>)		<i>Olio minerale*</i> <i>Azadiractina</i> <i>Piretrine naturali</i>	<u>Interventi agronomici</u> • evitare le coltivazioni in areali umidi e vicino ad una ricca vegetazione spontanea <u>Soglia.</u> • In vivaio, alla presenza; • in serra, solo su forti infestazioni.	* note o limitazioni: Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi: verificare autorizzazioni indicate in etichetta.
Cocciniglie		<i>Olio minerale*</i> <i>Sali potassici di acidi grassi*</i> Buprofezin Pyriproxyfen (3)	<u>Interventi agronomici</u> • eliminare con la potatura verde i rami maggiormente infestati <u>Soglia. Presenza</u>	(3) Pyriproxyfen: al massimo 1 trattamento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità in pieno campo; max 2 interventi in coltura protetta. * note o limitazioni: Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi: verificare autorizzazioni indicate in etichetta.

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Psille		<i>Olio minerale*</i> <i>Sali potassici di acidi grassi *</i> <i>Piretro naturale</i>	<u>Interventi agronomici</u> non eccedere nelle concimazioni azotate	* note o limitazioni: <u>Olio minerale. Sali potassici di acidi grassi:</u> verificare autorizzazioni indicate in etichetta.
Metcalfa <i>(Metcalfa pruinosa)</i>	1	<i>Olio minerale*</i> <i>Sali potassici di acidi grassi *</i> <i>Piretrine naturali</i> Etofenprox (Piretroidi) (1) Spinosad (4)	Soglia. Forti infestazioni in atto.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalarate max 1) per anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosad al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali * note o limitazioni: <u>Olio minerale. Sali potassici di acidi grassi:</u> verificare autorizzazioni indicate in etichetta.
Tortricidi e Bega del Garofano <i>(Epichoristodes acerbella</i> <i>Tortrix pronubana</i> <i>Altre)</i>		<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad (4)</i> Alfacipermetrina * (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Emamectina benzoato (6)	<u>Interventi agronomici</u> - asportare e distruggere le parti infestate; - eliminare i residui vegetali; - eliminare le erbe infestanti; - utilizzare reti antinsetto; Installare trappole a feromoni Campionamento: esaminare settimanalmente 200 germogli/1000 mq di coltura. <u>Interventi chimici</u> Intervenire dopo il picco di volo al superamento della soglia di intervento di 2-3% dei germogli infestati.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalarate max1) per anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosad al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali (6) Emamectina benzoato : ammesso solo contro <u>Epichoristodes</u> , al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate <u>Alfacipermetrina, Tau-Fluvalinate</u> divieto d'impiego in serra

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue fogliari (<i>Agrotis</i> spp. <i>Spodoptera</i> spp.) (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)		<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad</i> (4) Etofenprox (Piretroidi) (1) Cipermetrina * (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Emamectina benzoato (6) Cyantraniliprole (Diamidi) (**) (In serra coltivazioni non a contatto con il suolo)	Soglia. - Installare trappole a feromoni se reperibili in commercio ed intervenire quando si è accertato il momento di massimo sfarfallamento degli adulti. - Se le trappole non sono disponibili intervenire alla comparsa dei primi danni.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalarate max1) per anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosad al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali (6) Emamectina benzoato: non ammesso contro <i>Agrostis</i> al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Cipermetrina, Tau- Fluvalinate divieto d'impiego in serra. (**) Autorizzato contro <i>Chrysodeixis chalcites</i> e <i>Spodoptera exigua</i> e su piante ornamentali in vaso, fiori recisi, alberi e arbusti in vaso, piante perenni in vaso.
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp)		Teflutrin * Zeta-cipermetrina granulare Lambdacialotrina	Soglia. Presenza di danni sulla coltura precedente o infestazione in atto.	Applicazioni localizzate al terreno * Autorizzazioni di etichetta limitate Teflutrin solo pieno campo, trattamenti al terreno.
Maggiolini (<i>Melolontha melolontha</i>)		Teflutrin * Cipermetrina * (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Betacyflutrin (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2)	Soglia. Presenza di danni sulla coltura precedente o infestazione in atto	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalarate max 1) per anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi (Acetamiprid): al massimo 2 trattamenti per anno indipendentemente dall'avversità * Autorizzazioni di etichetta limitate Teflutrin: solo pieno campo, trattamenti al terreno. Cipermetrina: divieto d'impiego in serra
Cetonie		Deltametrina (Piretroidi) (1)	Soglia. Infestazioni in atto.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalarate max1) per anno, indipendentemente dall'avversità.

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Oziorrinco		Nematodi entomoparassiti: <i>Heterorhabditis spp.</i> <i>Metarhizium anisopliae var. anisopliae</i> Tau-Fluvalinate * (Piretroidi) (1)	<u>Interventi biologici</u> Intervenire contro le larve nel terreno in autunno o in primavera. <u>Interventi chimici</u> Intervenire solo sugli adulti nel periodo estivo alla comparsa delle prime mangiature fogliari nelle ore crepuscolari o notturne	(1) Piretroidi: max 2 trattamenti (Betacyflutrin max 2, Esfenvalerate max 1) per anno, indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Tau-Fluvalinate divieto d'impiego in serra
Tentredini		<i>Piretrine naturali</i>	<u>Interventi agronomici</u> • asportazione e distruzione delle parti di piante colpite. <u>Interventi chimici</u> Soglia. Alla comparsa dei primi danni ed eseguendo interventi, se possibile, localizzati.	
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)		Etofenprox (Piretroidi) (1)		(1)Piretroidi: complessivamente max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dalle avversità di cui con Etofenprox max 2 interventi.
Larve minatrici (<i>Liriomiza spp.</i>)		<i>Diglyphus isaea</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio minerale*</i> <i>Sali potassici di acidi grassi*</i> <i>Spinosad</i> (4) Ciromazina (solo serra) (1) Cyantraniliprole (Diamidi) (**) (In serra coltivazioni non a contatto con il suolo)	Installare trappole cromotropiche di colore giallo. <u>Interventi chimici</u> Soglia. Intervenire alle prime catture.	(1) Ciromazina : max 2 interventi a distanza di 1-2 settimane (4) Spinosad al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali *note o limitazioni: Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi: verificare autorizzazioni indicate in etichetta. (**) Autorizzato su piante ornamentali in vaso, fiori recisi, alberi e arbusti in vaso, piante perenni in vaso.

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Sciardi (<i>Lycoriella</i> spp., <i>Bradysia</i> spp., <i>Platosciaria</i> spp.)		Nematodi entomoparassiti: <i>Sternemema feltiae</i>	<u>Interventi biologici.</u> Intervenire contro le larve nel terreno. Catture massali con trappole cromotropiche gialle.	
Punteruoli (<i>Paysandisia achon</i> , <i>Rhynchophorus</i> spp.)		Nematodi entomoparassiti: <i>Sternemema</i> spp.		
Acari (<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus</i> spp. <i>Eotranychus carpini</i> altri)	4	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Amblyseius californicus</i> <u>Olio minerale*</u> <i>Beauveria bassiana</i> <u>Sali potassici di acidi grassi*</u> <u>Zolfo</u> Abamectina (6) Bifenazate Clofentezine Exitiazox Fenpiroximate Pyridaben * Etoxazole (7) Fenazaquin (9) Milbemectina (8) <i>Maltodestrina</i> (11) (solo in serra)	<u>Interventi chimici</u> <u>Soglia.</u> Infestazioni in atto.	(6) Abamectina al massimo 1 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. (7) Etoxazole: max 1 trattamento l'anno. (8) Milbemectina: solo in serra contro <i>Tetranychus urticae</i> , max 3 interventi per ciclo colturale e max 4 interventi all'anno. (9) Fenazaquin: autorizzato solo su garofano. * Autorizzazioni di etichetta limitate: Pyridaben: autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano. Olio minerale, Sali potassici di acidi grassi: verificare autorizzazioni indicate in etichetta.
Lumache, chioccioline, Limacce	Solo esche	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	<u>Interventi chimici</u> <u>Soglia.</u> Alla comparsa delle prime piante infestate.	
Patogeni tellurici (<i>Fusarium</i> spp., <i>Verticillium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., ect...)		Metam Na (1) Metam K (1) <i>Trichoderma harzianum</i> <u>Solarizzazione</u> <u>Vapore caldo</u>	<u>Interventi chimici:</u> solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti;	(1) a tenuta di gas.
Nematodi (<i>Ditylenchus dipsaci</i> , <i>Aphelenchoides fragariae</i> , <i>Pratylenchus</i> spp.)		<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Interventi agronomici • Impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato; • disinfezione con vapore e solarizzazione;	

SCHEDA DISERBO N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	LITRI O KG/HA	LIMITAZIONI
PRE-SEMINA O PRE TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee		Glifosate (1) Carfentrazone (<i>Vivai di arbusti e di arboree</i>) Clorprofam (<i>Bulbose da fiore e varie ornamentali</i>)	30.8 (360 g/L)		
PRE- EMERGENZA POST- TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee		Glifosate (1) Pendimetalin (<i>Ornamentali</i>) Isoxaben (<i>Ornamentali</i>) Oxifluorfen (<i>Vivai ornamentali - Ammesso solo dall'ultima decade di settembre alla prima decade di maggio, localizzato in bande</i>) Carfentrazone (<i>Vivai di arbusti e di arboree</i>) Clorprofam (<i>Bulbose da fiore e varie ornamentali</i>) Isoxaben + Oryzalin (<i>Alberi e arbusti in vivaio e in pieno campo, rosa in pieno campo</i>) (2)			(2) Isoxaben + Oryzalin : max 1 intervento all'anno
Ove possibile effettuare la pacciamatura del terreno.						

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio – 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.