

ALLEGATO 1

SCHEDE DISERBO N°2 – POMODORO DA INDUSTRIA

EPOCA	INFESTANTI	N°TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% di p.a.	l. o Kg / ha
PRE – SEMINA E TRAPIANTO	Preparazione del letto di semina	1	Napropamide Acido pelargonico		
PRE - EMERGENZA Localizzato sulla fila: l'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie	Dicotiledoni e Graminacee	1	Aclonifen (3) (CS)		
PRE - TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee	1	Aclonifen (3) (CS) Metribuzin (CS) Flufenacet (CS) (1) S-Metolachlor (2) Pendimetalin (CS) Pyraflufen-ethyl (1)		
POST - TRAPIANTO (**)	Dicotiledoni	3	Metribuzin (CS) Rimsulfuron Pyraflufen-ethyl (1)		
	Graminacee		Ciclofidim Propaquizafop Quizalofop etile isomero D Quizalofop p etile Cletodim		

() Per il diserbo di post-trapianto si consigliano interventi localizzati**

(1) Impiegabile massimo 1 intervento all'anno su infestanti a foglia larga

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole e Soia.

(3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su Mais, Sorgo, Pomodoro, Girasole e Patata.